

17. 참깨 地方蒐集種의 主要形質과 收量性에 關하여

(農村振興庁 作物試驗場) 金奎真, 趙俊鎬, 李正日, 咸泳秀

우리나라 各地方에서 栽培하고 있는 참깨 1401品種을 蒐集하여 이들의 主要形質과 收量性을 調査한 바 다음과 같은 結果를 얻었다.

- 1) 種皮色에 있어서는 市場性이 높은 白色種이 79% 褐色種이 21% 程度였다.
- 2) 果性과 室房數의 分布를 보면 1果性 2室4房이 75%, 3果性 2室3房이 5%, 1果性 4室8房이 20%를 차지하고 있었다.
- 3) 분지수에 있어서는 비교적 3果性으로 2室4房型 品種들이 적고 1果性 2室4房 品種들이 分枝數가 많은 傾向이었다.
- 4) 株當莢數에 있어서는 分枝型 品種群들이 많고 果性과 株當莢數와는 큰 關係가 없는 것으로 認定되었다.
- 5) 株當 種突重은 亦是 株當莢數가 많은 品種群들이 높았으나 이들 品種群들은 비교적 熟期가 늦은 便이었다.

18. 땅콩 草型別 主要 特性과 收量과의 關係

(農村振興庁 作物試驗場) 姜光熙, 吳聖根, 李正日, 咸泳秀

땅 콩

우리나라의 기후풍토에 알맞는 고탄유, 대립, 조숙다수성 땅콩