

식도 및 기도 이물의 통계적 고찰

인제의대

엄재욱 · 윤병용

1979년 6월부터 1983년 2월까지 3년 8개월간 본원 이비인후과에 내원한 이물 환자 총 105례 중 식도 및 기도의 이물 환자 76례를 대상으로 이물의 부위별 빈도, 종류, 연령 분포, 개재 부위 및 기간에 대한 통계학적 고찰을 한 결과 다음과 같은 성적을 얻었기에 보고하는 바이다.

1) 이물의 부위별 빈도를 보면 총 105례 중 식도 이물이 가장 많아 68례(64.8%)였고, 비강 이물이 13례(12.4%), 구강 및 인두 이물이 7례(6.7%)의 순이었다.

2) 종류별로 보면 식도 이물에서는 주화가 53례(77.9%)로 가장 많았으며, 그 외 부위는 다양한 이물 종류를 나타내었다.

3) 연령별 빈도를 보면 식도 이물에서는 5세 이하가 49례(72%)였으며, 기도 이물에서는 8례 모두 10세 이하였다.

4) 개재 부위는 식도에서는 제1 협착부가 61례(89.7%)로 가장 많았고, 기도에서는 좌측 기관지가 6례(75%)로 우측 기관지보다 많았다.

5) 개재 기간은 식도 이물에서는 1일 이내가 58례(85.3%)였으며, 기도 이물에서는 3~7일이 6례(75%)이었다.

기관협착증

가톨릭의대

민풍기 · 김춘환 · 조승호 · 김병우

여러 가지 원인으로 인하여 유발되는 기관협착증은 이비인후과 영역의 임상에서 아직도 심각한 문제로 남아있다.

기관협착증의 치료법에는 많은 방법들이 이용되고 있으며 각 경우에 따라 그 적용 방법이 달라질 수 있다.

저자들은 1978년 6세 여아에서 기관절개술 후 발생

한 기관 협착증에 대하여 Silicon T-tube를 사용하여 치료한 1예와, 1981년 19세 남아에서 염증성 종괴로 인한 기관 협착증에 대하여 Silicon T-tube stent with oral mucosal graft를 사용한 1예에서 좋은 결과를 얻었기에 보고하는 바이다.

咀嚼法에 의한 聲帶結節患者의 治驗

梨花醫大

文英一

성악인, 무대예술인, 교사등 음성직업인에 빈발하는 성대결절에 의한 음성장애는 공포의 대상이 될뿐 아니라 수술적제거에도 많은 신경을 쓰게 된다. 성대결절수술제거의 적응을 결정하기에 앞서 음성치료의 일환으로 咀嚼法을 시행하여 좋은 성과를 얻는 경우가 있다. 최근 성대결절 환자인 성악인 두명(남녀 각 1명)과 교사 1명에게 咀嚼法을 시행하여 좋은 효과를 얻었기에 문헌적 고찰과 아울러 보고하는 바이다.

內視鏡的聲帶鏡의 記錄觀察에 關한 臨床研究

梨花醫大

文英一

현대의 학의 발달에 따라 병인을 규명하기 위하여 세밀한 관찰과 자료획득이 가능한 각종 내시경이 대두되기에 이르렀다. 이의 일종인 내시경적 성대경으로 종래에는 보기 힘들었던 병변의 관찰은 물론 사진촬영이 동시에 이루어질 수 있어서 병변의 조기발견과 함께 귀중한 자료가 얻어질 수 있게 되었다. 과거 5년 동안 이화여자대학교 의과대학 부속병원 이비인후과 외래에서 시행한 성대경 사용경험에 따른 장단점과 사진촬영으로 얻은 자료를 중심으로 그 결과를 보고하는 바이다.

- 1) 간접후두경으로 관찰하기 힘들었던 병변을 보다 명확하게 관찰할 수 있었다.
- 2) 사진촬영 결과를 환자에게 제시할 수 있어서 치료전후의 상태를 확인시킬 수 있었다.

- 3) 확대된 聲帶像을 관찰할 수 있어서 미세한 병변의 감별이 용이하였다.
 4) 성대관찰시간이 단축되고 조작이 간편하여 의대에서 사용하기 편리하였다.

- 19 -

壓迫法으로 교정한 變聲期障礙持續症

梨花醫大
文英一

사춘기에 접어들면 제2차성정이 나타나면서 변성기로 접어들게 된다. 여자에서는 약 2반음의 성역의 저하가 있으나 남자에서는 거의 10반음의 성역의 저하가 있어 현저히 어른다운 음성을 갖게된다. 이 변성기의 음성관리가 불량하여 흥성과 두성이 교대적으로 섞여 나오는 음성장애가 지속되는 수가 있다. 또 남성인 경우에 여성다운 높고 가성에 가까운 음성이 지속되어 정신적 장애도 동반되는 경우가 있다. 최근 이 변성기장애지속증의 남자환자 두명에게 암박법을 시행하여 좋은 효과를 얻었기에 문현적 고찰과 함께 보고하는 바이다.

- 20 -

喉頭結節 및 폴립의 喉頭微細 手術에 關한 臨床研究

梨花醫大
文英一

성대결절 및 성대폴립은 성악인, 교사, 무대예술인 등 음성직업인에게 많이 발생하고 있는 것은 주지의 사실이다. 후두에 경한 염증성변화가 있을 때 목소리를 남용하면 성대결절이 호발하기 때문에 음성직업인은 감기등의 상기도염증이 있을 때는 특히 음성사용에 주의를 기우려야 한다. 성대결절과 폴립이 염증성산물이며 성대의 상피하층의 결체조직에서 기원한다는 것은 이미 알려져 있다.

성대의 전 1/3과 중 1/3의 경계부위에 주로 발생하는 것은 그 부위가 진동의 중심부가 되기 때문이다. 이화여자대학교 의과대학 부속병원 이비인후과에서 시행한 70예의 후두미세수술 환자를 대상으로 하여 다

음과 같은 임상적 고찰을 행하였기에 그 결과를 문현적 고찰과 함께 보고하는 바이다.

1) 발생초기의 성대결절은 간단한 음성치료로 치유되므로 반드시 절제수술을 시행할 필요는 없다.

2) 소아의 성대결절은 사춘기를 지남에 따라 자연히 소실되는 수가 많으므로 절제수술을 시행하지 않는 것이 좋다.

3) 진행된 성대결절이라 할지라도 음성직업인에게는 우선 3개월 동안 음성치료를 시행하는 것이 좋다.

4) 3개월 동안의 보존적 치료에도 불구하고 성대소견의 개선이 없고 음성장애가 지속되면 후두미세수술을 고려하여야 한다.

5) 수술시에 작은 기도내 삽입관을 사용하여 마취하는 것은 피열간격을 유지하면서 외전된 성대를 유지하는데 필요하다.

6) 성대결절을 제거시 결절을 후방으로 견인하고 그 전방에서부터 제거한다.

7) 어떤 경우에는 결절을 신장시킨 상태에서 감자로 잡고 미세가위나 메스로 절제한다.

8) 음성의 침목은 술후 일주일동안 시행하며 그후 일주일은 두사람이 대화할 정도의 약한 목소리를 사용하는 것은 허용해도 좋다.

- 21 -

成人의 急性喉頭蓋炎

啓明醫大
金重剛·尹錫根·金應天

急性喉頭蓋炎은 그 病變이 주로 喉頭蓋에 국한되어 심한 炎症性浮腫을 초래하며 급격히 진행하는 閉鎖性呼吸困難으로 應急治療를 필요로 한다. 本疾患은 거의 대부분이 6歲 이하의 小兒에서 볼 수 있으며 小兒의 急性上氣道閉鎖症의 중요한 原因疾患으로 주목되어 왔으나 成人에서도 그 報告例가 점차 늘어나고 있는 추세이다.

최근 著者들은 急性喉頭蓋炎의 진단하에 入院治療를 시행한 成人患者 8例를 경험하였다.

文獻考査을 통하여 小兒의 急性喉頭蓋炎과 本症例들을 比較하고 臨床經過 및 治療上의 몇 가지 差異點을 관찰하였다.

Tracheal Stenosis

Poong Ki Min, M.D., Choon Hwan Kim, M.D.,
Seung Ho Cho, M.D., Byung Woo Kim, M.D.

Catholic Medical College

Tracheal stenosis induced from the various causes has still remained as a serious problem in the otolaryngologic field. There has been used the numerous methods in the treatment of the tracheal stenosis and the each case has required the therapeutic modality.

Now, we report two cases of tracheal stenosis ; one case had been used the silicone T-tube in the tracheal stenosis after tracheostomy in 6 year-old child and the other one had been used the silicone tube stent with oral mucosa graft in the treatment of the tracheal narrowing due to inflammatory mass in 19 year-old male patient.

Three Vocal Nodule Cases Treated by Chewing Method

Young Il Moon, M.D.

Department of Otolaryngology, College of Medicine,
Ewha Womans University, Seoul, Korea

Vocal strain occur chiefly in those whose occupations professional singers, teachers, actors, and so on. Continuous vocal strain may perpetuate and aggravate the condition and lead to formation of established vocal nodules.

The nodes are at first red and soft. These fresh nodes are well responded by chewing method without surgery. Recently the author experienced three cases of singers nodule (one male professional classic singer,

one female pop singer, one male teacher) treated by chewing method.

The purpose of this paper is to discuss principles and methods of chewing method with literature review.

Clinical Study on Diagnostic Value of Endoscopic Laryngoscope

Young Il Moon, M.D.

Department of Otolaryngology, College of Medicine,
Ewha Womans University, Seoul, Korea

Viewing the larynx as a part of a thorough physical examination has been universally recommended but yet largely ignored. To see the larynx in its hidden anatomic position, it has been necessary to use an angled laryngeal mirror and an indirect light source, a technique requiring training, artistry and patience.

We explored the concept of using a suitable right angle endoscopic laryngoscope as a tool in the out patient department, to replace the unused mirror, in a series of trials during 5 years. The whole procedure takes approximately one minute. It is simple, requires no anesthesia and the larynx and its surrounding structures clearly into view.

We were able to record by Camera film and compare with before and after treatment.

So we report them with literature review.

Two Cases of Prolonged Mutation Difficulty Treated by Pressure Method

Young Il Moon, M.D.

Department of Otolaryngology, College of Medicine,
Ewha Womans University, Seoul, Korea

Mutation consisted of abrupt and uncon-