

1

**후두의 편평세포암종과 선암종으로
구성된 동부위 다발암(충돌암) 1례**

원자력병원 이비인후과
오경균 · 장경만* · 심윤상 · 이용식

소위 충돌종양이라 불리우는, 두 신생물이 상호 인접한 부위에 독립적으로 나타나는 현상은 매우 드물다. 저자들은 최근 편평세포암종과 선암종으로 구성된, 서로 밀접하지만 경계가 분명한 성분상부암 1례를 경험하였다. 환자는 61세 남자로서, 1993년 6월 우측경부의 무통성 종괴로 내원하였다. 후두의 내시경 검사상, 후두상부 거의 대부분에 걸쳐 돌출되어있는 미만성, 괴양성 종괴의 소견을 보였으며, 내시경 생검상 중등도 분화된 편평세포암종이었다. 경부의 이학적 검사상 우측에는 다발성 종괴가, 좌측에는 하나의 종괴가 촉지되었다. 후두 전적출술 및 우측에 근치적 경부곽청술을, 좌측에는 기능적 경부곽청술을 시행하였으며, 수술 소견상, 후두상부의 가성대로부터 후두개에 퍼져있는 다발성 백반양양상을 보이며, 후두실 및 갑상연골에는 침범이 없었다. 조직학적 검사상, 후두의 고유층 까지 침범된 편평세포암종과 점막하층의 선암종으로 구성된 암종이었으며, 전이된 림프절에서도 같은 소견을 보였다.

2

경부에 발생한 Castleman's Disease 1례

원자력병원 이비인후과
오경균 · 박창국* · 심윤상 · 이용식

Castleman's disease는 주로 종격동에서 발생하는

거대림프절증식증으로 경부에는 드물게 발생하는 것으로 알려져 있으며, 초자질-혈관형이 90%가량 차지하고, 나머지 10%만이 형질세포형인 것으로 보고되고 있다.

저자들은 우측 경부종물을 주소로 내원한 환자에서 경부청소술을 시행하였고, 병리조직학적으로 Castleman's disease 형질세포형으로 밝혀진 1례를 보고하는 바이다.

3

경부에 발생한 점액종 2례

원자력병원 이비인후과
심윤상 · 이원종* · 오경균 · 이용식

점액종은 비교적 드문 간엽조직성 종양으로 주로 흉곽내에 발생하고, 두경부에서는 매우 희귀한 종양으로 알려져 있다. 저자들은 최근 경부에 발생한 점액종 2례를 수술적으로 제거하고, 특별한 술후 합병증이나 국소재발없이 치료한 2례를 경험하여, 이를 보고하는 바이다.

4

상악동과 안와를 침범한 횡문근육종 1례

가톨릭의대 내과, 이비인후과, # 치료방사선과##
오용석# · 강진형 · 홍영선 · 김훈교
이경식 · 김동집 · 김민식#
조승호# · 서병도# · 윤세철##

두경부의 육종은 전체 육종의 약 10% 정도를 차지하며 골육종, 악성섬유성 조직구종, 횡문근육종, 섬유육종, 활액막육종, 혈관육종, 연골육종등이 있다.