

이용할 수 있다. 저자들은 방사선조사치료후 재발한 비인강암 환자의 수술적 접근을 위해 골성형성상 악골절개 방법을 변형하여 적용한 결과 매우 좋은 시야와 솔후 기능적, 미용적으로 만족스러운 결과를 얻었기에 보고하는 바이다.

6

비인강 점막성 악성 흑색종 2예

가톨릭대학교 의과대학 내과, 이비인후과*
한지연 · 김훈교 · 홍영선 · 이경식
김동집 · 박영학* · 김민식*
조승호* · 서병도*

두경부에서 발생하는 악성 흑색종은 전체 흑색종의 17% 이고, 이중 8%가 상부 호흡기관의 점막에서 발생한다. 발생빈도는 구강점막이 가장 높고, 비강, 인강의 순으로 비인강 점막에서 발생하는 악성 흑색종은 비교적 드문 질환이다. 예후면에서 비인강 점막 악성 흑색종은 같은 부위의 피부성 악성 흑색종에 비해서 훨씬 불량한데 그 이유는 대개 초기에는 증상이 없고 위치적으로도 육안적 발견이 어려운 부위라서 대부분이 병이 많이 진행된 후에야 발견되기 때문이다. 치료로 원발 부위의 수술적 절제가 우선적으로 시행되지만 대개는 수년내 재발하여 치료의 중요한 실패 원인이 되기 때문에 수술요법에 면역요법이나 방사선요법등의 보조적인 치료를 함께 병용하여 생존율을 높이려는 시도들이 이뤄지고 있다. 연자들은 최근에 2예의 비인강 점막성 악성 흑색종을 경험하였는데, 증례 1은 70세 남자 환자로 1993년 1월 우측 경부 종괴를 주소로 내원하여 비인강 점막 조직 검사로 악성 흑색종 진단되었고, 진단 당시 병기는 4기(T4N2M0)로 전신 상태 불량하여 수술하지 못하고 대중요법만을 시행하던 중 두통이 심해져 우측 경부에 방사선요법을 시행하였고 현재 21개월간 생존하고 있다. 증례 2는 55세 여자 환자로 1994년 8월 코 막힘을 주소로 내원하여 비인강 점막 조직검사상 악성 흑색종으로 진단되었고, 진단 당시 병기는 4기(T2N2M0)로 cisplatin 단독 항암화학요법에 tamoxifen, INF- α 를 병합하여 현재 2회의 치료를 받았으며 원발병소는 안정상태를 보이면서 생존하고 있다.

7

2회 항암화학요법후 7년간 완전관해를 보인 비인강 악성종양 1예

가톨릭대학교 의과대학 내과, 이비인후과*
한지연 · 김훈교 · 홍영선 · 이경식
김동집 · 박영학* · 김민식*
조승호* · 서병도*

비인강 악성종양의 치료는 원발병소와 양측 경부를 포함한 방사선요법이 표준치료법이다. 그러나 고용량의 방사선치료를 하더라도 병기가 높을수록 원발병소의 조절과 전이 임파선 조절이 만족스럽지 않고 예후도 불량하다. 최근 cisplatin과 5-FU를 사용한 선행항암화학요법(FP요법)을 3회 시행하고 방사선요법을 시행하여 병소 조절과 생존율을 높이려는 연구가 진행중에 있으나 아직 선행화학요법의 역할이 불분명하다. 연자들은 1987년 6월에 비인강 악성종양으로 진단되어 2회 cisplatin과 5-FU의 항암화학요법을 받았고 완전관해 상태로 그 이후 방사선치료를 않고 지내다가 7년후인 1994년 1월에 원발병소가 재발된 환자를 경험하였다. 환자는 65세 여자로 1987년 비인강 종괴 조직 검사상 편평상피암으로 진단되었고, 당시 병기는 4기(T4 N0M0)로 cisplatin 100mg/m² 1일, 5-FU 1,000mg/m² 5일간의 항암화학요법 2회 실시하였는데, 당시 치료로 인한 부작용으로 3도이상의 구역 및 구토, 그리고 심한 상복부 통증을 보여 환자 스스로 더 이상의 치료를 포기한채 경과 관찰되지 못하고 지내오다가 1994년 1월에 다시 원발 병소의 재발과 주변 임파선 비대를 동반한 제 4병기(T4N2M0)상태로 내원하여 다시 FP 항암화학요법을 3회 시행하고 부분관해를 보였다. 본 증례는 FP요법 2회로 7년간 완전관해를 보인 비인강 악성종양으로 항암화학요법의 중요한 역할에 대해 시사하는 바 크다고 사료되어 보고하는 바이다.