E323

Anthracene Catabolism Pathway and the Regulatory Role for Non-aromatic Carbon Sources by Anthracene-Degrading Bacteria

황세현*, 송민섭, 홍성갑,박용근, 이영록 고려대학교 이과대학 생물학과

This study was done to investigate the anthracene catabolism pathway and the possible regulatory role for non-aromatic carbon sources by anthracene-degrading bacteria. Acinetobacter calcoaceticus KU25 degraded anthracene to unidentified metabolite(M.W 259). The metabolite is subsequently metabolized 2-hydroxy-3-naphthoic acid to salicylate and then further decarboxylated through phenol. When this strain was cocultured with phenanthrene, the anthracene degradative rate was effected and stimulated after induction to phenanthrene for 2 days(P≤0.05). 2-Hydroxy-3-naphthoic acid and 2, 3-dihydroxynaphthalene induced the degradation of anthracene and a few intermediates of anthracene degradation. Serratia marcescens KU9 cells grown in MS media which contained anthracene and either citrate or glutamate illustrated the classical diauxic growth pattern. While anthracene degradation by S. marcescens KU9 was repressed in the presence of citrate(0.1%) and glutamate(0.05%), that by A. calcoaceticus KU25 was stimulated in the presence of glutamate(0.1%). The degradation of anthracene and phenanthrene by two strains was inhibited by the addition of SDS or sodium bicarbonate.

E324

환경스트레스에 대한 대장균의 대응기작 : ackA와 pta유전자의 역할

> 김병국^{*}, 이호근, 이호자 경희대학교 문리과대학 생물학과

대장균은 영양분 고갈 상태에서 생존하기 위해 다양한 단백질을 합성하며, 여기에는 katF와 ackApta유전자가 작용함이 밝혀졌다(Matin, 1991. Thomas, 1994). 본 실험에서 탄소원 고갈실험 결과 ackApta는 katF와 다른 양상을 나타내는 것으로보아 서로 다른 기작을 가질것으로 사료된다. Acetate activation pathway에 관여하는 ackApta유전자는 호기적 상태에서 탄소원 고갈과 혐기적 상태에서 발현이 증가되었다. ackApta가 다른 stress에 대한 생존에도 관여하는지를 알아보기 위하여 탄소원 고갈후 열(57°C)와 $H_2O_2(15mM)$ 을 처리한 결과 ackApta 돌연변이균주는 정상균주비해생존력이 감소하였다. ackA와 pta 각각의 single mutant의 실험결과 ackA mutant가 열과 과산화수소에 대해 pta mutant보다 높은 생존력을 나타내었다. 이러한 결과들로부터 영양분 고갈시 acetate activation pathway에서 축적된 acetyl-phosphate가 열과 과산화수소에 대한 저항성에서도 중요한 역할을 하는것으로 사료된다.