

급성 건봉 쇄골 관절 탈구에서 변형 Bosworth 술식 치료

울산대학교 의과대학 서울중앙병원 정형외과학교실
빈성일, 조성진

급성 건봉 쇄골 관절 탈구에 대한 치료는 비수술적 치료법 및 30여가지의 수술적 치료법이 소개되고 있으며 현재까지도 적절한 치료법에 관하여 많은 논쟁의 대상이 되고 있다.

저자들은 1992년 6월부터 1994년 6월까지 급성 건봉 쇄골 관절 탈구 14례를 변형 Bosworth 술식으로 치료한 후 그중 13명에 대해 평균 20개월을 추시하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

1. Taft 등의 분류법을 사용한 결과, 8례에서 우수, 5례에서 양호의 결과를 얻었다.
2. 현저한 견관절 운동 장애나 근력감소를 보인 예는 없었다.
3. 4례에서 합병증이 발생했으며, 건봉 쇄골 관절염 2례, 나사의 근위 운동이 2례이었다.
4. 방사선상 건봉 쇄골 관절염의 소견은 임상결과에 큰 영향을 미치지 않았다.
5. 수술 직후와 최종 추시점에서 오구 쇄골 간격은 의미 있는 차이를 보이지 않았다.