

제 목	국 문	의료서비스이용의 형평성에 관한 연구		
	영 문	Equity in the Health Care Service		
저 자 및 소 속	국 문	문옥륜 ¹⁾ , 이규식 ²⁾ , 이해중 ²⁾ , 신영전 ^{3)*} , 김창엽 ⁴⁾ , 이기호 ⁵⁾ , 조홍준 ⁶⁾ , 장동민 ⁷⁾ , 박실비아 ⁷⁾ , 김운목 ⁸⁾ 1) 서울대학교 보건대학원 2) 연세대학교 보건과학대학 3) 한양대의 예방의학교실 4) 서울대 의료관리학교실 5) 인제대 보건대학원 6) 울산의대 가정의학교실 7) 한국의료관리연구원 8) 의료보험연합회		
	영 문	Ok Ryun Moon ¹⁾ , Kyu Sik Lee ²⁾ , Hae Jong Lee ²⁾ , Young-Jeon Shin ³⁾ , Chang Yup Kim ⁴⁾ , Key Hyo Lee ⁵⁾ , Hong Jun Cho ⁶⁾ , Dong Min Chang ⁷⁾ , Sylvia Park ⁷⁾ , Woon Mook Kim ⁸⁾ 1) School of Public Health, Seoul National Univ. 2) Dept. of Health Adm., College of Health Science, Yonsei Univ. 3) Dept. of Preventive Medicine, College of Medicine, Hanyang Univ. 4) Dept. of Health Policy and Management, College of Medicine, SNU. 5) Graduate School of Public Health, Inje Univ.. 6) Dept. of Family Medicine, College of Medicine, Ulsan Univ. 7) Korea Institute of Health Service and Management 8) Korea Medical Insurance Corporation		
분 야	보건관리	발 표 자	신영전	
발표 형식	구연	발표 시간	30분	
진행 상황	연구완료 (), 연구중 (0) → 완료 예정 시기 : 95 년 10 월			
1. 연구 목적 본 연구의 목적은 지역의료보험 가입자와 지역의료보험 가입자를 대상으로 건강 및 의료서비스 이용의 형평성을 검토하는데 있다. 구체적인 연구목적은 다음과 같다. 첫째, 성별, 계급별, 지역별 건강수준의 불평등을 조사한다. 둘째, 성별, 계급별, 지역별 의료서비스 이용여부와 이용량의 불평등을 조사한다. 셋째, 의료서비스 이용의 불평등정도를 계량화하여 다른 나라의 결과들과 비교한다.				
2. 연구 방법 <input type="checkbox"/> 대상자 : 3개 직장의료보험조합 가입자 5,761명 4개 지역의료보험조합 가입자 4,687명, 합계 10,448명 <input type="checkbox"/> 조사기간 : 1994년 5월 ~ 9월 <input type="checkbox"/> 조사방법 : 상기 조사를 목적으로 훈련받은 조합직원들에 의한 면접조사 <input type="checkbox"/> 조사항목 : 1. 사회, 경제 및 인구학적 변수 2. 건강수준 : 만성질환, 지난 1개월간 이환경험, 자가평가건강수준, 노팅검건강척도 3. 의료이용실태 : 외래, 입원 경험 및 회수, 입원기관, 총족률 4. Le Grand Index 등을 이용한 의료서비스 이용의 불평등정도의 계량화				

3. 연구결과

1) 건강수준, 의료서비스 이용은 성별, 계급별, 지역별로 다양한 차이를 보였다.
 2) 의료서비스의 불평등 정도는 건강지표를 만성질환으로 하였을 때 HILG Index값이 지역 -0.078, 직장 -0.025인 것으로 나타났다. 건강지표를 자가평가 건강수준으로 하였을 때 HILG Index값은 지역 -0.036, 직장 0.031였다. 이러한 경향은 성, 연령, 건강수준의 보정 후에도 크게 변화하지 않았다.

이상의 결과는 대상집단의 의료서비스 이용의 불평등 정도가 다른 국가들에 비해 높지 않음을 의미한다(표 1).

(표 1) 여러 나라들의 의료서비스 이용의 형평성

국가	HILG		HIWVP		
	만성질환	자가평가 건강수준	만성질환	자가평가 건강수준	만성질환 자가평가 건강수준
스위스(1981)	-0.110	0.033	-0.069	-0.061	-0.043
덴마크(1982)	-0.094	0.051	-0.072	-0.099	-0.055
프랑스(1980)	-0.093	-	-0.060	-	-
한국(지역)(1994)	-0.078	-0.036	-	-	-0.069
한국(직장)(1994)	-0.025	0.031	-	-	-0.002
네덜란드(1981)	-0.010	0.066	-0.013	0.011	0.025
아일랜드(1987)	0.015	-	-0.076	-	-
이탈리아(1985)	0.029	0.119	-0.051	-0.061	-0.038
스페인(1987)	0.042	0.204	0.001	0.017	-
영국(1985)	0.052	0.228	-0.048	0.002	0.009
미국(1980)	-	0.202	-	-0.017	-

4. 고찰

* 성별, 계급별, 지역별 건강수준과 의료서비스 이용의 차이를 지속적으로 모니터링하는 것은 보건의료체계의 현실을 파악하고 장래의 계획을 수립하는데 필수적인 작업이다.

* 본 연구의 의의

- 1) 대규모의 설문조사
- 2) 의료서비스 이용의 형평성에 대한 계급적 접근 시도
- 3) 불평등의 계량화작업
- 4) 다른 나라들의 불평등 정도와의 비교

* 의료서비스 이용의 불평등 정도 계량화 작업의 의의

- 1) 불평등정도 파악용이
- 2) 불평등에 영향을 미치는 요인들과 영향의 정도 파악이 가능
- 3) 지속적인 측정을 통한 불평등정도의 변화추이 관찰가능
- 4) 다른 나라와의 비교용이