

하였으며, 전설절제술의 경우에는 설 구개 폐쇄기능을 유지하기 위하여 복직근 유리피판과같이 두터운 피판을 사용하였다. 구강저 결손의 경우에는 손목 상부에서 횡으로 작도한 전박 유리피판을 사용함으로써 공여부의 이환없이 용이하게 결손을 재건할 수 있었으며, 협부 결손시 이엽 피판으로 작도한 전박 유리피판을 이용하였다. 연구개 및 구치후삼각, 구인두벽을 재건하는 경우에는 술후 피판의 구축 방지, 유연성을 고려하여 공장 유리피판을 일차적으로 선택하여 사용하였다.

결과 : 39명의 환자 중 1예에서 혈전으로 인한 피판괴사가 있었고 1예에서 이차적 감염으로 인한 피판의 손실이 있어 다시 전박 유리피판으로 재건하였다. 환자의 구강내 결손위치와 크기를 감안하여 재건한 유리피판술로 음식물의 저작, 연하, 호흡, 발음등에 가능한 한 최적의 복원을 하였다.

결론 : 저자들은 지난 10년간 41예의 유리피판술로 구강내 재건을 시행하였다. 결손의 부위에 따라 기능적 재건을 하기 위하여 결손의 크기와 위치를 고려하여 유리피판의 공여부를 선택하였으며, 이와 같은 적절한 재건을 통하여 이들 환자들의 재활을 용이하게 하고 삶의 질을 향상시킬 수 있었다.

11

다양한 유리피판을 이용한 두개저 및 중안면부 결손의 미세수술적 재건술

민경원 · 이민구¹⁾ · 김인철*

서울대병원 성형외과, 보라매병원 성형외과¹⁾

두개저를 침범하는 종양은 병변의 정확한 위치 및 범위를 알기 어렵고, 복잡한 해부학적 구조와 수술적인 접근이 어려우며, 수술후 부비동, 비인두강과 두개강의 개통으로 감염에 따른 치명적인 합병증이 많았기에 수술적인 치료에 상당한 제한이 있었다. 또한 중안면부에 생긴 종양은 그 빈도는 낮지만, 안구나 두개저로 종양이 파급될 수 있고 종양절제 후에 저작, 발음 등의 기능장애 및 심한 안면추형을 일으킬 수 있어 성형외과의사들에게 많은 과제를 안겨주고 있다. 두개저를 재건하는

데에는 galeal or pericranial flap, 측두근피판 등의 국소피판이나 대흉근, 광배근-근피 피판 등과 같은 지역피판들을 사용할 수 있지만, 외경동맥의 절제, 방사선조사, 피판회전반경의 제한 등의 이유로 그 사용에 제한이 많은 것이 사실이다. 중안면부 결손의 경우에는 종양 절제 후에 생긴 사강의 구조가 복잡하고 피부이식과 보조기를 이용한 재건에도 많은 제약이 있다.

이에 비해 저자들은 1996년 1월부터 1998년 9월까지 3년간 두개저 또는 중안면부를 침범한 악성종양의 광범위 절제술로 결손이 생긴 15명의 환자에 대해서 복직근 유리피판술 11례, 전갑 유리피판술 2례, 광배근 유리피판술 2례를 경험하였다. 미세문합술을 이용한 유리조직 전이술로 큰 결손부위도 한차례의 수술로 재건할 수 있었고 악성종양의 근치적 치료에 좀 더 접근할 수 있었다. 또 유동성이 많은 근육조직으로 복잡한 구조의 3차원적 재건을 이를 수 있었고, 술후 상행성 감염이나 뇌척수액유루와 같은 합병증의 감소와 외모 및 기능면에서 만족스러운 결과를 얻었다.

12

두경부 유리피판재건술 후 합병증 발생에 영향을 미치는 요인들에 대한 연구

백정환 · 손영익 · 김성민*

추광철 · 하범준¹⁾ · 심영목²⁾

성균관대학교 의과대학 삼성서울병원 이비인후과학교실,
성형외과학교실¹⁾, 흉부외과학교실²⁾

배경 및 목적 : 두경부 악성종양 절제술 후 유리피판을 이용한 재건술은 미용적으로나 기능적으로 유경피판에 비해 우수한 반면 술식이 어렵고 수술시간이 길어지며 이식 조직이 생존율이 떨어지는 단점이 있다. 그러나 최근 미세혈관수술 기법의 발달에 따라 유리피판의 성공률이 높아지고 있으며 다양한 종류의 유리피판이 이용되고 있다. 유리피판재건술 후의 합병증은 피판의 생존에 직접 영향을 미칠 뿐만 아니라 환자의 생명유지에도 치명적인 영향을 줄 수 있다. 이에 저자들은 유리피판을 이용하여 재건하였던 두경부 악성종양 환

자에서 수술 후 합병증과 합병증 발생에 영향을 미치는 요인들과의 연관성을 알아보고자 하였다.

재료 및 방법 : 1995년 4월부터 1998년 8월까지 삼성서울병원 이비인후과에서 두경부 악성종양 절제술 후 유리피판을 이용하여 재건하였던 40례의 의무기록을 후향적으로 분석하였다. 합병증을 피판실패를 포함하여 외과적 합병증(surgical complication)과 내과적 합병증(medical complication)으로 구분하였으며 환자의 연령, 종양의 병기, 술전 방사선치료, 수술 병력, 경부과 청술 유무, 술전 내과적 질환 유무에 따른 합병증과 합병증의 발생 빈도를 통계적으로 분석하였다.

결과 : 대상환자 중 60세 미만이 20례, 60세 이상이 20례였으며 70세 이상도 4례가 있었다. 11례는 방사선치료의 병력이 있었으며 10례는 이전 수술 병력이 있었고 23례에서 수술 전 내과적인 문제를 가지고 있었다. 수술 후 피판실패를 포함한 외과적 합병증은 23례(52.5%), 내과적 합병증은 8례(20.0%)에서 관찰되었다. 환자의 연령이나 종양의 병기, 수술 병력, 술전 방사선 치료, 경부과 청술 유무 등을 합병증 발생에 영향을 미치지 않았으며 술전 심혈관계질환 유무가 외과적 합병증 발생에 의미 있는 차이를 보였다($p=0.032$).

결론 : 두경부 유리피판재건술에서 술후 합병증 발생을 방지하기 위해 수술 전 환자의 심혈관계질환에 대한 좀 더 적극적인 평가와 치료가 필요할 것으로 사료되었다.

13

피부암 절제후 안면재건에 있어 다양한 국소피판술

안기영 · 김태모* · 한동길 · 박대환
대구효성가톨릭 의과대학 성형외과학교실

최근 지난날 피부암에 있어 절제후 피부이식이 가장 좋은 방법이라는 견해에 대해 많은 변화가 있는데 이는 피부이식의 생착을 위한 혈관총을 보존하기 위해 제한적 절제가 피부암의 부적절한 절제를 유발하기 때문이다. 피부암의 재발을 방지하기 위해서는 무엇보다 광범위한 절제가 요구되며 따라서 절제후 피부이식술보다는 피판술을 요하는 경우가 많다. 안면재건에 있어 국소피판술은 재건후 피부색 및 질감에 있어 유사하며 그 외 피부이식에 비해 내구성이 있고 술후 치료기간을 단축시킬 수 있으며 미용적으로 보다 좋은 결과를 얻을 수 있는 장점들로 있다.

본 교실에서는 지난 1990년 3월부터 1997년 12월까지 안면부에 발생한 피부암 환자중 국소피판술을 이용한 43명의 환자들을 문헌고찰과 함께 보고하고자 한다.

- 1) 피부암중 기저세포암이 34명으로 가장 많았으며 그외 편평세포암 8명, 악성흑색종 1명이었다.
- 2) 호발부위는 상, 하안검을 포함한 안검주변부가 17명, 비부 13명, 협부 5명, 구순부 5명, 기타 3명이었다.
- 3) 재건방법으로는 extended V-Y advancement flap이 가장 많았으며, 기타 적용방법으로는 cheek advancement flap 10명, 정중 전두부 피판 3명, 기타 회전, 전위, Limberg flap이 10명, 구순부 피판 5명, 기타 Abbe, Karapandzic, stepladder 피판이 5명이었다. 이외에도 조기 술후 합병증 및 재발을 등을 조사하였다.

안면부 결손의 재건술에 있어서는 무엇보다 단순화에서도 가장 효과적인 방법을 통해 불필요한 반흔을 피하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있겠다. 하지만 이를 위해서는 피판의 정확한 작도술 및 많은 경험을 요한다. 따라서 다양한 국소피판술중 적절한 선택과 정확한 작도술만이 보다 나은 기능적, 미용적 결과를 얻을 수 있을 것으로 사료된다.

14

후두암의 레이저 수술

김광현 · 성명훈 · 박민현* · 고태용 · 권택균
서울대학교 의과대학 이비인후과학교실

조기 후두암은 CO₂레이저를 이용하여 간단하게 치료할 수 있는 경우가 많다. 조기 후두암에 대한 방사선 치료 성적이 매우 양호하기는 하나 환자는 6~7주간 통원을 하여야 하므로 경제적이 부담과 불편이 따르고 피부