

번호 02-2

제 목	국문	성인 여성의 자궁경부암 집단검진 수검행위에 관한 예측인자			
	영문	The Predictors on Cervical Cancer Screening Behavior of Adult Women			
저 자 및 소 속	국문	김영복 ¹⁾ , 이원철 ²⁾ , 노운녕 ³⁾ , 맹광호 ²⁾ , 정치경 ²⁾ 1) 서남대학교 보건학부, 2) 가톨릭대학교 의과대학 예방의학교실, 3) 신흥대학 보건행정과			
	영문	Young-bok Kim ¹⁾ , Wonchul Lee ²⁾ , Woon Nyung Ro ³⁾ , Kwang-ho Meng ²⁾ , Chee Kyung Chung ²⁾ 1) Seonam Univ. 2) The Catholic Uni. of Korea, the Medical college, Dept. of Preventive Medicine, 3) Shinheung college			
분 야	보건관리 () 역 학 (O) 환 경 ()	발 표 자	일반회원 (O) 전 공 의 ()	발표 형식	구 연 (O) 포스터 ()
진행 상황	연구완료(O), 연구중() → 완료 예정 시기 : 년 월				

1. 연구 목적

본 연구는 성인 여성의 자궁경부암 집단검진 수검경험과 관련된 요인들을 분석함으로써 자궁경부암 집단검진에 관한 기간별(life-time, 최근 2년간) 수검 예측인자를 선별하고자 시도되었다.

2. 연구 방법

연구의 대상으로 경기도 E시에 거주하고 있는 26-60세 사이의 성인 여성을 선정하였으며, 구조화된 자기기입식 설문지를 활용하여 1999년 12월 - 2000년 1월 사이에 1,613명의 자료를 수집하였다. 또한 과거(life-time) 및 최근 2년간의 자궁경부암 집단검진 수검행위에 관한 예측인자를 분석하기 위해 개인속성요인 및 증재요인, 행위근접요인을 독립변수로 하여 로지스틱 회귀분석을 시행하였다.

3. 연구 결과

연구결과는 다음과 같다.

첫째, 조사대상자중 일생동안 한 번이상 자궁경부암 집단검진을 받은 여성은 56.1%이었으며, 최근 2년동안 자궁경부암 집단검진을 받은 여성은 34.5%이었다.

둘째, 과거 자궁경부암 집단검진 수검행위에 관한 주요 예측인자는 월수입, 결혼연령, 건강증진행위, 의료인과의 친밀감, 사회적 영향, 자기효능감이었고, 최근 2년간의 수검행위에 관한 주요 예측인자는 초경연령, 임신횟수, 의료인과의 친밀감, 사회적 영향, 자기효능감이었다.

셋째, 자궁경부암 집단검진 수검행위에 관한 수검 예측인자의 중요도는 과거 수검행위의 경우 사회적 영향이 가장 높았고, 다음이 의료인과의 친밀감, 건강증진행위, 결혼연령, 자기효능감, 월수입 순이었으며, 최근 2년간의 수검행위의 경우는 의료인과의 친밀감이 가장 높았고, 다음이 사회적 영향, 자기효능감, 임신횟수, 초경연령 순이었다.

넷째, 자궁경부암 집단검진 수검행위에 관한 로짓모형의 예측력은 과거 수검행위의 경우 68.8%, 최근 2년간의 수검행위의 경우 66.6%이었다.

이상의 결과에서 자궁경부암 집단검진에 관한 과거 수검 예측인자와 최근 2년간의 수검 예측인자간에는 차이가 있음을 확인하였고, 예측인자 중 사회적 영향 및 의료인과의 친밀감이 과거 및 최근 2년간의 수검행위에 영향력이 가장 큰 변수로 나타나 수검증진을 위한 의료인의 역할을 재확인시켰다.

4. 고찰