

# 미나리좁나방(*Epermenia strictella* (Wocke, 1867))의 분류학적 정보

고민수<sup>2</sup>, 이상미<sup>1</sup>, 정태성<sup>2</sup>, 박규택<sup>1</sup>

<sup>1</sup>강원대학교 농생물학과, <sup>2</sup>강원도 농업기술원

미나리좁나방(*Epermenia strictella* (Wocke, 1867))은 집나방상과(Yponomeutoidea) 미나리좁나방과(Epermeniidae)에 속하는 종이다. 미나리좁나방과는 전세계적으로 6속 70여종이 알려져 있으며, 주로 구북구 지역에 분포 한다.

이번에 조사된 미나리좁나방은 주로 일본을 포함한 구북구 지역에서 6월부터 8월까지 발생하며, 미나리류 식물을 가해하는 것으로 알려졌으나 (Fal'kovich, 1990) 국내에서는 미나리를 가해한다는 외국자료만 인용되어 있을 뿐(朴, 1983) 그 외 조사된 자료가 전혀 없다. '99년 본 원의 당귀해충조사에서 이들의 발생이 식초가 국내에서 처음으로 확인되었기에 본 종의 유충 및 번데기의 형태적인 특징 과 발생양상을 조사하였다.