

매실의 항미생물 활성 연구

임재웅·이규봉*

<목 차>

- | | |
|----------------|----------|
| I. 서론 | IV. 요약 |
| II. 재료 및 실험 방법 | 참고문헌 |
| III. 결과 및 고찰 | Abstract |

I. 서론

매실나무(*Prunus mume* Siebold et Zuccarini)는 장미과(Rosaceae)에 속하는 낙엽소교목(落葉小喬木)으로 일본, 대만, 중국 및 우리나라 충청이남에서 생산되는 果實로 1~3월경에 꽃이 피고 열매를 맺어 6월경 青梅로서 수확된다^{1,2)}.

梅實은 熟度에 따라 10분숙으로 구분하여 果實의 핵이 硬化될 때 5분숙, 果肉에 清味가 있을 때를 6~7분숙, 果肉의 清味가 소실되고 果肉의 조직이 다소 軟化되기 시작 할 때를 8분숙, 果肉의 색이 담록색이고 果皮가 담황색으로 조직이 軟化되었을 때를 9분숙, 완전히 軟化되고 섬유질이 없는 것을 10분숙으로 구분하고 7~8분숙을 青梅라고 한다³⁾.

매실과 매실나무는 食用, 觀賞用, 藥用으로 쓰이고 漢方과 民間에서 青梅를 亂, 脚氣病, 健胃, 殺菌, 去痰, 嘔吐, 酒毒, 解熱, 鎮痛, 發汗, 疫痢에 藥材로 쓰이며^{2,4~11)} 神農本草經, 本草綱目, 東醫寶鑑등에 體驗의 藥效와 利用法이 수록되어 있다^{10~15)}. 主로 우리나라에서는 梅實酒와 梅實丸, 梅實茶로 加工하여 이용한다.

김등¹²⁾은 매실의 종자가 *E. coli*와 *B. subtilis*에 대한 抗菌力を 가지고 있다고 보고한 바 있다.

腐敗 및 病原性 微生物에 의한 피해는 여러 분야에서 직면하는 심각한 문제이다. 健康에 대한 관심도가 높아짐에 따라 人工 合成品의 忌避現狀이 사회전반에서 일어나고 있으며 안전성에 문제가 없는 天然의 抗微生物 活性物質의 개발이 절실히 요구되는 실정이다¹³⁾. 이에 食品 貯藏 中 일어나는 微生物에 의한 變質防止를 위하여 天然物에 존재하는 抗菌性 물질을 이용하고자 하는 研究는 이미 오래 전부터 수행되어 왔다¹⁴⁾.

일반적으로 사람이 오랜 동안 摄取해 왔던 天然物 그 자체 또는 이들의 抽出物에 존재하는 天然 抗菌性 물질로 蛋白質¹⁵⁾, 有機酸^{16,17)}, 탄소수가 12~18개인 脂肪酸¹⁸⁾, 香辛料¹⁹⁾, 生藥材類^{20~22)} 등이 있다. 식물 抽出物이 抗微生物 活性을 갖고 있다는 것은 오래 전부터 알려 졌고 대표적인 것으로는 우리가 예전부터 많이 사용해 왔던 香辛料를 들 수 있다.

근래에 들어와서 마늘의 allicin은 -SH group의 殉害因子로 작용하는 活性 物質이고, 양파추출물은 aflatoxin생성균인 *Aspergillus flavus*와 *Aspergillus parasiticus*의 増殖을 殉害하며²³⁾ 이외에도 많은 식물 추출물이 抗菌活性을 가지고 있음이 보고되고 있다^{12,24~33)}.

본 연구에서는 우리에게 피해를 많이 주는 食品 腐敗 微生物을 선별하여 선별된 균주들에 대한 매실의 항균활성을 확인하였다.

1) 보해중앙연구소, *경희대학교

II. 재료 및 실험방법

1. 재료

본 실험에 사용된 梅實은 전라남도 해남군 산이면 (주)보해 매원에서 재배하고 있는 품종인 '南高'의 과실을 성숙정도를 확인하여 7분숙의 매실을 97년 6월 24일(개화 후 95일) 수확하여抽出用試料로 사용하였다.


2. 실험방법

1) 기능성 성분의 추출 및 분획

梅實을 먼저 果肉만을 취하여 균질화 한 후 water extracts와 methanol extracts로 다음과 같이 분획하였다.

먼저 water extracts는 매실 果肉 500g에 증류수 1.5L를 부은 후 還流 冷却 裝置를 이용 90°C에서 3시간 동안抽出하여 거어즈로 濾過 후 원심분리(0°C, 4000 rpm, 15 min)하고 상등액을 취해 濾過紙(Whatman No.2)로 濾過하고 Rotary evaporator (YAMATO RE-51)를 사용하여 減壓濃縮하여 water extracts로 하였다. 한편 methanol extracts는 梅實 果肉 5Kg에 5배의 methanol을 부은 후 24시간 동안抽出하고 액만을 취한 후 果肉은 다시 한번 methanol로 再 抽出하였다. 抽出物은 water extracts와 같은 방법으로濃縮하였다.濃縮物의 일부를 hexane, chloroform, ethyl acetate, butanol, 물(수층)로 연속抽出하여 濾過紙(Whatman No.2)로 濾過하고 Rotary evaporator (YAMATO RE-51)를 사용하여 減壓濃縮하였다.(Fig. 1)

Fig.1. Flow sheet for extraction and fractionation of functional components in *Prunus mume*



2) 항균 활성도 측정

抗茵性 확인은 확산법(diffusion method)중 paper disc법을 이용 하였다⁽³⁴⁾.

細菌類와 酵母는 액체배지에 18시간 증식시킨후 각 균주에 맞는 agar 배지를 15ml씩 분주한 Ø 9cm petri dish에 0.3ml씩 도말하고 주 배양온도 보다 5°C낮은 온도에서 1시간 정도 예비배양한 후 일정량의 시료가 주입된 paper disc(Ø 8mm, Toyo)를 옮겨놓고 20μl의 멀균수로 확산시키고 1시간을 예비배양하고 적온에서 24시간 배양 후生育 沼止圓의 크기를 측정하였다.

곰팡이류는 멀균수 10ml에 곰팡이 포자총을 긁어내어 혼탁 시킨 후 0.1ml씩 준비된 Ø 9cm petri dish에 분주 한다. 이를 24시간 예비배양한 후 일정량의 시료가 주입된 paper disc(Ø 8mm, Toyo)를 옮겨놓고 20μl의 멀균수로 확산시키고 적온에서 24시간 배양한 후生育 沼止圓의 크기를 측정하였다.

(1) 추출물의 농도별 저해활성 측정

각 抽出物의 沼害濃度는 비탁법을 이용 하였다. 확산법을 통해 抗菌活性이 확인된 분획을 일정농도별로 액체배지에 첨가하여 적온에서 72시간 배양하면서 spectrophotometer로 660nm에서 흡광도를 측정하였다⁽³⁴⁾.

각 추출물을 membrane filter(0.2 μm)로 제균시키고 broth에 각 추출물의 soluble solid를 100ppm, 500ppm, 1000ppm씩 첨가한 후 대상 균주를 적온에서 24시간 배양한 broth에서 0.1ml를 취해 반복 배양한 후 다시 0.1ml를 추출물이 함유된 broth에 접종하여 배양했다.

微生物의 生育程度를 spectrophotometer로 측정하여 판단 하였고 抽出物을 넣은 broth를 blank로 사용하였다.

III. 결과 및 고찰

1. 매실의 용매별 각 획분의 수율

梅實의 溶媒別 抽出 收率은 Table 1과 같다. 단순히 물만으로抽出한 water ex.은 6.63%, MeOH ex.는 4.61%의 收率을 보였다. 한편, MeOH ex.로 분획한 획분들의 原梅實 對比 溶媒別 收率은 BuOH fr.과 H₂O fr. 0.1 1.46%와 2.63%로 가장 높았다. 다음으로는 EtOAc fr. > Hexane fr. > CHCl₃ fr. 순으로 나타났다. 이는 梅實을 試料로 사용했으므로 青梅를 사용했지만 葉綠素등 색소 성분의 比가 상대적으로 높지 않은 결과로 보인다.

Table 1. Yield of fractions of *Prunus mume* extracts with different solvents

Solvents	Yield(% w/w of flesh sample)
Water	6.63
MeOH	4.61
Hexane	0.13
CHCl ₃	0.11
EtOAc	0.28
BuOH	1.46
H ₂ O	2.63

2. 매실 성분의 항균 활성

梅實을 물과 MeOH로抽出한 extracts의 抗菌活性 檢索를 위하여 Gram(+)細菌과 Gram(-)細菌, 酵母, 곰팡이에抽出物 0.5mg/disc를滴下하여 檢索한 결과는 Table 2와 같다.

시험된 Gram(+)細菌에서는 특히 쌀밥의 主變敗菌이고 어류의 어육을變色시키며 두부를污染시켜 팽창을 일으키는 *Micrococcus leteus*에 대해서 water ex.과 MeOH ex. 모두 특이적으로 강한活性를 나타내었다. 녹말을 함유한 식품의 主變敗菌이면서 쌀밥에 시큼한 냄새를 주며 산성화시키는 *Bacillus cereus*, *Bacillus subtilis*와 *Staphylococcus epidrimidis*에서도 저해활성이 나타났다. 이는日本人들이 쌀밥 도시락에 梅實 가공품인 우메보시를 넣어 가지고 다니는 習慣과 관련되어 생각해 볼 수 있는 결과로 보인다.

Table 2. Antimicrobial activities of water extract and methanol extracts of *Prunus mume*

Strains	Clear zone on plate(mm)	
	Water ex.	MeOH ex.
<i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC 17802	9.2	12.0
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 29629	11.0	13.2
<i>Escherichia coli</i> ATCC 31030	11.1	10.0
<i>Staphylococcus epidrimidis</i> ATCC 12228	11.0	13.3
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 6059	14.0	10.3
<i>Micrococcus leteus</i> ATCC 21550	21.0	19.4
<i>Bacillus cereus</i> ATCC 11950	9.2	12.2
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	10.0	12.1
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	8.2	8.3
<i>Penicillium citrinum</i> IF0 6352	-	-
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC 4105	10.1	16.0
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> IF0 1950	9.1	14.2

Gram(-)細菌에서는蛋白質分解力이 강하여畜肉과鷄卵을腐敗시키며 설사 원인균인 *Proteus vulgaris*와魚貝類 등을 통해 인간에感染되면致命的인 *Vibrio parahaemolyticus*, 여름철에 많은食中毒을일으키는 *Salmonella typhimurium*, *Escherichia coli*등 시험된 모든균주에 water ex.과 MeOH ex. 모두抗茵活性을보였다.

酵母는높은산도에서도뛰어난生育을보이는균주를선택하여活性을본결과두가지抽出物모두가강한抗酵母活性을나타냈다.

그러나곰팡이에서는*Aspergillus niger*에서만이두抽出物모두약한活性을보였을뿐그외의곰팡이에서는活性을나타내지못했다.

주로生育이抑制된균주들에서MeOH ex.의活性이강하였으며, *P. vulgaris*, *M. leteus*에대해서는두抽出物間의抗茵活性정도가비슷한정도로water ex.이약간높았다.

위의결과를바탕으로MeOH ex.을용매별로分劃한分劃別沮害결과는Table 3, Table 4와같다.

Table 3. Antimicrobial activities of different solvent fractions from methanol extract of *Prunus mume* against several microorganisms(bacteria)

Strains	Clear zone on plate(mm)				
	Hexane fr.	CHCl ₃ fr.	EtOAc fr.	BuOH fr.	H ₂ O fr.
<i>Vibrio parahaemolyticus</i> ATCC 17802	8.2	8.6	18.2	15.3	9.1
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 29629	-	9.8	21.0	15.2	10.1
<i>Escherichia coli</i> ATCC 31030	9.0	8.2	11.1	10.2	11.0
<i>Staphylococcus epididymidis</i> ATCC 12228	-	10.0	21.2	11.2	10.1
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 6059	10.0	-	17.3	19.2	10.2
<i>Micrococcus leteus</i> ATCC 21550	8.7	13.0	22.1	19.2	16.0
<i>Bacillus cereus</i> ATCC 11950	9.0	9.0	12.3	15.0	10.0
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	-	8.8	17.2	15.1	12.0

Table 4. Antimicrobial activities of different solvent fractions from metanol extract of *Prunus mume* against several microorganisms(fungi, yeast)

Strains	Clear zone on plate (mm)				
	Hexane fr.	CHCl ₃ fr.	EtOAc fr.	BuOH fr.	water fr.
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	-	8.1	-	8.1	8.1
<i>Penicillium citrinum</i> IFO 6352	-	9.0	-	-	-
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> ATCC 4105	17.0	13.0	17.3	12.2	10.0
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> IFO 1950	8.3	11.0	17.0	11.3	10.1

Fig.2. Effect of ethyl acetate and butanol fraction of *Prunus mume* on the growth of *Bacillus cereus*




Fig.3. Effect of ethyl acetate and butanol fraction of *Prunus mume* on the growth of *Bacillus subtilis*




Fig.4. Effect of ethyl acetate and butanol fraction of *Pruns mume* on the growth of *Micrococcus leteus*




Fig.5 Effect of ethyl acetate and butanol fraction of *Prunus mume* on the growth of *Staphylococcus epidermidis*




Fig.6. Effect of ethyl acetate and butanol fraction of *Prunus mume* on the growth of *Escherichia coli*




Fig.7. Effect of ethyl acetate and butanol fraction of *Prunus mume* on the growth of *Salmonella typhimurium*




Fig.8. Effect of ethyl acetate and butanol fraction of *Prunus mume* on the growth of *Proteus vulgaris*




Fig.9. Effect of ethyl acetate and butanol fraction of *Prunus mume* on the growth of *Vibrio parahaemolyticus*




Fig.10. Effect of ethyl acetate and butanol fraction of *Prunus mume* on the growth of *Saccharomyces cerevisiae* IF01950





Fig.11. Effect of ethyl acetate and butanol fraction of *Prunus mume* on the growth of *Saccharomyces cerevisiae* ATCC4105



Gram(-)細菌에서는 *V. parahaemolyticus*, *S. typhimurium*, *P. vulgaris*에서 EtOAc fr.과 BuOH fr.이 강한 抗菌活性을 보였고 *E. coli*에서는 모든 희분이 비슷한 抗菌活性을 보였다.

시험된 Gram(+)細菌 모두에 대해서도 EtOAc fr.과 BuOH fr.이 강한 抗菌活性을 보였고 *M. luteus*에서는 H_2O fr.과 $CHCl_3$ fr.도 높은活性를 보였다.

酵母에 대한 抗酵母活性은 *Saccharomyces cerevisiae* ATCC 4105에서 Hexane fr.과 EtOAc fr.이 강한活性를 나타냈으며 다른 fr.들도 높은活性를 나타냈다. *Saccharomyces cerevisiae* IFO 1950에서는 EtOAc fr.가 강한活性를 보였다.

곰팡이에서는 *Aspergillus niger*에서 $CHCl_3$ fr., BuOH fr., H_2O fr.이 아주微弱한活性를 보였고 water ex.과 MeOH ex.에 滞害를 받지 않았던 *Penicillium citrinum*에서 $CHCl_3$ fr.이 약한活性를 나타내었다.

본 실험에 선택적으로 사용된 食品의 主 腐敗菌들에 대한 梅實의 抗微生物活性은 곰팡이類를 제외한 Gram(+)細菌, Gram(-)細菌, 酵母에 강한 抗微生物活性을 나타내었다. 특히, 여름철 致命的인 中毒을 일으키는 *V. parahaemolyticus*, *S. typhimurium*, *P. vulgaris*와 쌀밥의 主 變敗菌인 *M. luteus*에 강한活性를 보인것은 특이적인 결과로 볼 수 있다.

Paper disc법을 통해 얻어진 결과를 토대로 梅實抽出物에 의해 크게 滞害를 받지 않는 곰팡이류를 제외한 나머지 시험 균주를濃度別로 滞害活性 정도를 실험하였고 시험된 梅實分劃은 paper disc법에서 비교적 큰 滞害力を 보인 EtOAc fr.과 BuOH fr.로 항미생물 활성 시험을 하였다.

먼저 G(+)細菌에 대한 매실 분획의 농도별 滞害活性을 보면 *Bacillus cereus*의 경우 500ppm 이상의 EtOAc fr.이 生育을 滞止하였으나 BuOH fr.은 100ppm에서 강한 滞害活性을 보였다.(Fig.2) *Bacillus subtilis*는 100ppm의 EtOAc fr.에서 전혀 生育하지 못하였고 BuOH fr.에서는 500ppm 농도에서 강한 滞害를 받아 生育을 하지 못하였다.(Fig.3) Paper disc법에서 강한 滞害를 받았던 *Micrococcus luteus*는 Fig.4에서 보는 바와 같이 BuOH fr. 100ppm에서 전혀 生育하지 못하였고 EtOAc fr.는 500ppm에서 滞害를 받았다. *Staphylococcus epididymidis*는 BuOH fr. 100ppm에서 48시간 후 급격한 生育을 보였고 EtOAc fr. 100ppm에서도 약간 生育을 하였으나 그 이상의濃度에서는 전혀 生育을 하지 못하였다.(Fig.5)

한편 G(-)細菌은 대체적으로 G(+)細菌에 비해 매실 희분의 항균 활성이 낮았다. *Escherichia coli*는 Fig.6과 같이 시험된 모든 희분이 100ppm에서 침해를 받지 않았고 EtOAc fr. 500ppm에서는 미약한 生育을 보였으며 BuOH fr. 500ppm에서는 60시간 이후에 生育을 시작하였다. *Salmonella typhimurium*는 EtOAc fr. 500ppm에서는 약간 生育을 하나 EtOAc fr., BuOH fr. 1000ppm에서는 生育을 하지 못했다. (Fig.7) *Proteus vulgaris*는 Fig.8에서 보는 바와 같이 시험된 다른 G(-)細菌들에 비해 강한 침해를 받는 것으로 나타났다. Paper disc법에서 강한 침해를 받았던 *Vibrio parahaemolyticus*는 시험된 매실 분획 100ppm 이상에서 전혀 生育을 하지 못했다. (fig.9) 이와 같은 결과는 매실의 항균물질로의 이용 가능성을 제시해주는 결과로 보여지며 앞으로 활성물질 확인 연구가 계속되어야 할 것이다.

酵母에 대한 매실 추출물의 저해활성은 세균에 비해 낮은 것으로 나타났다. *Saccharomyces cerevisiae* IF0 1950에서 EtOAc fr. 500ppm에서 50%의 침해活性이 나왔고 BuOH fr.은 50% 저해에 500ppm 이상의濃度가 필요한 것으로 나타났다. (Fig.10) 이는 매실을 이용한 발효주의 개발 가능성을 시사해주는 결과로 해석된다.

IV. 요약

본 연구는 梅實을 天然 抗菌物質로서의 이용 可能性을 檢索하였다. 먼저 梅實을 물과 methanol로抽出한 extracts를 paper disc법으로 항균활성을 확인한 후 MeOH extract를 溶媒別로 分割한 각각의 fractions으로 paper disc법과 그 결과를 토대로 활성이 높은 fractions를 비탁법을 이용하여濃度別로 액체 배지 상에서 침해活性을 확인하였다.

變敗菌인 *M. luteus*는 매실의 EtOAc 희분과 BuOH 희분에 의해서 침해 되었고 또한 H₂O 희분과 CHCl₃ 희분도 침해活性을 보였다. 한편 침해濃度 시험에서는 BuOH 희분 100ppm 첨가 시 전혀 生育을 하지 못했다.

매실의 EtOAc 희분과 BuOH 희분은 *B. cereus*, *B. subtilis*와 *S. epididymidis*에 대해서 강한 침해活性을 보였다. 침해濃度 시험에서는 *B. cereus*는 BuOH 희분 100ppm, *B. subtilis*는 EtOAc 희분 100ppm, *S. epididymidis*는 EtOAc 희분 100ppm에서 生育을 하지 못했다.

G(-)細菌은 매실성분에 의해서 저해를 받지만 G(+)細菌에 비하여 저항성이 컸다. *E. coli*는 EtOAc 희분 500ppm에서 미약한 生育을 하였으며 *S. typhimurium*는 EtOAC 희분, BuOH 희분 모두 1,000ppm에서 生育을 전혀 하지 못했으며 *P. vulgaris*는 BuOH 희분 100ppm, *V. parahaemolyticus*는 BuOH 희분, EtOAc 희분 100ppm에서 전혀 生育을 하지 못하는 결과를 얻었다.

한편, 酵母中 *S. cerevisiae* IF01950은 EtOAc 희분 500ppm에서 50%의 침해를 받았으며 *S. cerevisiae* ATCC4105는 1,000ppm의 EtOAc fr.에서 50%의 침해를 하였다.

抗곰팡이 실험에서는 *A. niger*에서만이 아주 미약한 침해를 보였다.

참고문헌

1. 문관심 : 약초의 성분과 이용, 일월서각, 299, 1994
2. 김태정 : 한국의 자원식물, 서울대학교 출판부, II, 160~161, 1996
3. 日本果汁協會 : 果汁果實飲料事典, 朝倉書店, 315~316, 1983
4. 약품식물학회 : 약품식물학 각론, 학창사, 200~201, 1980
5. 神農本草經, 文光圖書有限公司, 193, 1971
6. 李時珍 : 圖解本草綱目, 高文社, 992~995, 1983
7. 辛民敎 : 臨床本草學, 南山堂, 581~583, 1986
8. 許浚 : 東醫寶鑑, 南山堂, 1161, 1967
9. 李文宰 : 漢方養生, 경원문화사, 133,252, 1976
10. 東醫學事典, 과학백과사전종합출판사, 290~291, 1990
11. 佐藤公一, 森英男外 三人 : 日本果樹園藝大事典, 養賢堂, 720, 1972
12. 김경숙, 이인환 : Prunus 屬 식물(종자)의 항균력과 활성물질에 관한 연구, 이화여대 석사논문, 1986
13. 신동화 : 천연 항균성 물질의 연구 현황과 식물가공에의 이용, 식품과학과 산업, 23,68~76, 1990
14. Beuchat, L.R. and Golden, D.A. : Antimicrobials occurring naturally in food, *Food Technology*, 43(1), 134~142, 1989
15. Ashton, D. H. and Busta, F.F. : Milk components inhibitory to *Bacillus stearothermophilus* by iron, calcium and magnesium, *Appl. Microbiol.*, 16, 628~633, 1968
16. Freese, E., Sheu, C.W. and Gallier, S.E. : Function of lipophilic acids as antimicrobial food additives, *Nature*, 241, 321, 1973
17. Cox, N.A., Mercuri, A.J., Juven, B.J., Thomson, J.E. and Chew, V. : Evaluation of succinic acid and heat to improve the microbiological quality of poultry meat, *J. Food. Sci.*, 39, 985~992, 1974
18. Neiman, C. : Influence of trace amounts of fatty acids on the growth of microorganism, *Bacterial. Rev.*, 18, 147~157, 1985
19. Sahika, E. A. and Mehmet, K. : Sensitivity of some common food poisoning bacteria to thyme, mint and bay leaves, *Inter. J. Food Microbiol.*, 3, 349~354, 1986
20. 이병완, 신동화 : 식품 부패 미생물의 증식을 억제하는 천연 항균성 물질의 검색, 한국식품과학회지, 23(2), 200~204, 1991
21. 이병완, 신동화 : 식품 부패 미생물에 대한 천연 항균성 물질의 농도별 및 분획별 항균특성, 한국식품과학회지, 23(2), 205~211, 1991
22. 박옥연, 장동석, 조학래 : 한약재 추출물의 항균효과 검색, 한국영양식량학회지, 21(1), 91~98, 1992
23. Briozzo, J., Nunez, L., Chirife, J., Herszage, L. and D'Aquino, M. : Antimicrobial activity of clove oil dispersed in a concentrated sugar solution, *J. Appl. Bacteriol.*, 66, 69, 1989
24. 김근영, 정동욱, 정희종 : 어성초의 화학성분 및 항미생물활성, 한국식품과학회지, 29, 400~406, 1997
25. 백수봉, 오연선 : 토양병원균 *Pythium ultimum* 방제를 위한 항균성 약용식물의 탐색, 한국균학회지, 18, 102~107, 1990
26. 강성국 : 무화과 잎중의 항미생물 물질, 전남대학교 박사 학위논문, 1994

27. 양민석, 하영래, 남상해외 2 : 국내 자생식물의 항균활성, 한국농학회지, **38**, 584~592, 1995
28. 김선재, 박근형 : 부추의 항미생물 활성물질, 한국식품과학회지, **28**, 604~608, 1996
29. 한지숙, 신동화, 윤세억, 김문숙 : *Listeria monocytogenes*의 증식을 억제하는 식용가능한 식물 추출물의 검색, 한국식품과학회지, **26**, 545~551, 1994
30. 신동화, 한지숙, 김문숙 : 방기및 감초의 애탄을 추출물이 *Listeria monocytogenes*의 증식 억제에 미치는 영향, 한국식품과학회지, **26**, 627~632, 1994
31. 조순영, 유병진, 장미화, 이수정외 2인 : 수산 미이용 자원 중에 존재하는 항균성 물질의 검색, 한국 식품과학회지, **26**, 261~268, 1994
32. 김옥경, 이은방 : 두릅나무 근피 추출물의 약물학적 연구, 생약학회지, **24**, 213~220, 1993
33. 김마정, 변명우, 장명숙 : 대나무잎의 생리활성 및 항균성 효과, 한국영양식량학회지, **25**, 135~140, 1996
34. 川岸舜朗外 十七人 : 식품중의 생체기능조절물질 연구법, 4송현문화사, 121~134, 1996

Abstract

Studies on the Antimicrobial Activities of *Prunus mume*

Jae-Woong Lim, Gyu-Bong Lee*

This study was conducted to investigate the antimicrobial activity of *Prunus mume* extracts. *Prunus mume* extracts have growth inhibitory activity to various microorganisms. Gram positive bacteria such as *Bacillus cereus*, *Bacillus subtilis*, *Micrococcus leteus*, *Staphylococcus epidermidis* were more easily inhibited than Gram negative bacteria tested *Vibrio parahaemolyticus*, *Salmonella typhimurium*, *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris* and Yeasts by *Prunus mume* extracts. Among several fractions of methanol extract, EtOAc & BuOH fractions were showed strong antibacterial activities, but those fractions were not showed on fungi.

Key word: *Prunus mume*, antimicrobial activity, *Vibrio parahaemolyticus*, *Salmonella typhimurium*, *Proteus vulgaris*