

1-14. 한국산 거저리과 (딱정벌레科)의 未記錄種과 새로운 채집지 추가 보고 (Newly recorded and Little Known Tenebrionidae (Coleoptera) from Korea)

김진일 · 김수연

성신여자대학교 생물학과

거저리과는 세계적으로 약 20,000여종이 분포하는 매우 큰 분류군 가운데 하나이다. 국내산은 Kolbe (1886)에 의한 보고 이후 현재까지 17족 104종이 기록되어 있다 (Kwon and Choi, 1986; Kim, 2000).

한국산 거저리과의 표본들을 조사한 결과 4미기록종 *Trachyscelis sabuleti* Lewis (Tribe Trachyscelini), *Phaleromela subhumeralis* (Marseul) (Tribe Phaleriini), *Parabolitophagus felix* (Lewis) (Tribe Bolitophagini), *Metaclisa atrocyanea* Lewis (Tribe Cnadaloniini)이 발견되었으며 그 동안 분포가 혼동되어 있던 3종 *Emypsera riederi* (Faldermann) (Tribe Phaleriini), *Bolitophagus reticulatus* (Linne) (Tribe Bolitophagini), *Ischnodactylus loripes* Lewis (Tribe Diaperini)의 국내 분포를 재확인하고 이들의 채집지를 추가로 보고한다. 이로서 국내 거저리과에 1족 7종을 새로 기록하고 재정리하는 바이다.