

# 호남지역 재래종 들깨의 작물학적 형질에 관한 연구

남상영\*, 김인재, 김민자, 이철희, 김태수  
충북농업기술원

## Studies on the Agronomic Characters of Local Perilla Collected in the Honam Part of Korea

Sang-Young Nam\*, In-Jae Kim, Min-Ja Kim, Cheol-Hee Lee, and Tae-Su Kim  
Chungbuk Province ARES, Cheongwon 363-880, Korea

### 연구목적

우리나라 호남지역에서 수집된 재래종 들깨의 작물학적 특성을 조사하여 들깨 유전자원의 실용적 이용가치를 평가하고, 유전자원의 활용도를 높여 우수 품종의 육성을 위한 기초자료를 제공하고자 함.

### 재료 및 방법

가. 시험작물 및 수집분석 점수 : 들깨 39점

나. 재배법

(1) 파종기 : 6월 7일 (2) 재식밀도(cm) : 휴폭 60×주간 25

(3) 시비량(kg/1,000m<sup>2</sup>) : N-P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>-K<sub>2</sub>O=4-3-2

라. 시험구배치법 : 단구제

### 결과 및 고찰

들깨 유전자원 특성평가로 품종육성의 기초자료를 얻고자 호남지역 들깨 156점을 수집 분석한 결과를 요약하면 다음과 같다.

1. 성숙일수는 104~138일로 넓게 분포하였으며, 116~130일이 92%로 대부분 이 었고, 115일 이하와 131일 이상은 각각 6%, 1% 이었다.
2. 경장은 71~157cm로 수집종 간에 차이가 많았으며, 111~140cm가 65%로 가장 많 았고, 91~110cm 17%, 80cm 미만과 151cm이상은 각각 4% 이었다
3. 5cm 이상의 화방군수는 52~291개로 수집종 간에 차이가 컸으며, 121~180개가 47%로 가 장 많았고, 100개 미만과 200개 이상은 각각 12%, 21%이었다. 화방군당 삭수는 23~56개 이었으며, 26~40개가 81%로 가장 많았다. 화방군 장은 6~20cm로 분포하였고, 9~12cm가 49.0%로 가장 많았다.

4. 천립중은 2.4~5.7g으로 차이가 컸으며, 2.8!3.6g이 69%로 가장 많았고, 3.7~3.9g은 10%였으며, 2.7g이하와 4.3g 이상은 각각 9%, 7% 이었다.




Fig. 1. Distribution on maturing period of local perilla collected in honam part of Korea




Fig. 2. Distribution on stem length of local perilla collected in honam part of Korea