



## 구순구개열 환자에서의 이차적인 비, 구순성형술

최세훈\*, 정종철, 송민석, 전창훈, 김현민

가천의과대학교 길병원 치과 구강악안면외과

구순 구개열 환자는 일차적인 처치 후에 완벽한 구조를 갖는 환자는 거의 없으며 비익저 함몰, 비중격의 부적당한 위치, 비첨부의 모호함, 비공의 비대칭 등의 결함을 갖을 수 있다. 여러 가지 방법을 이용하여 이러한 구순 및 비부의 부조화에 대하여 치료를 시행하고 있으나 수많은 술식이 나와있는 것으로도 알 수 있듯이 구순구개열 환자에서 비, 구순 부위의 결함을 치료하는 것은 도전적인 일이다. 구순 구개열 환자의 이와 같은 일차적 치료 후에 생긴 이차적인 결함을 해결하기 위해서는 비소주 연장술, 비중격 절제술, 비용비술, pyriform margin과 비저, 치조 주위의 골이식술 등이 이용될 수 있다.

이에 본과에서는 이차적인 비, 구순 성형술을 이용한 구순 구개열 환자의 치험례를 보고한다.

---

## Secondary RhinoCheiloplasty In Cleft Lip And Palate Patient

Se-hoon Choi\*, Jong-Cheol Jeong, Min-Soek Song, Chang-Hun Jun,  
Hyeon-Min Kim

Dept. of oral and maxillofacial surgery, Gil medical center, Gachon medical school

Correction of the cleft labionasal deformity remains challenging aspects of cleft surgical care, as evidenced by the number of techniques advocated for this problem. Seems No patient got complete esthetic, functional result after primary treatment.

Deformities such as alar base depression, inadequate positioning of the caudal septum, lack of tip definition, nostril asymmetry Etc remain and require some invasive procedure including columellar lengthening, submucous resection of the nasal septum with repositioning of the caudal strut, nasal dorsal augmentation, bone grafting of alveolus.

We got experienced about secondary rhinocheiloplasty on cleft lip and palate patients and we note it.