

테인의 평균 섭취수준은 18.5 mg, 다이드제인은 13.9 mg이었다. 그러나 조사대상자의 50백분위수에 해당하는 이소플라본의 섭취수준은 22.2 mg이었으며, 조사대상자의 10%는 하루 68 mg 이상의 이소플라본을 섭취하며, 10%는 하루 5 mg 이하로 섭취하는 것으로 나타났다. 생태학적변인에 따른 평균 이소플라본 섭취 수준의 차이를 검증한 결과, 거주지역과 경제수준에 따라 이소플라본 섭취수준에 차이가 있는 것으로 나타났다. 즉, 인천·경기지역에 거주하는 중·고등학생이 서울에 거주하는 학생에 비해 이소플라본의 섭취수준이 유의적으로 높은 것으로 나타났으며, 경제수준이 가장 높은 경우 다른 집단에 비해 이소플라본의 섭취수준이 유의적으로 높은 것으로 나타났다.

【P1-4】

전주시의 일부 초등학생들의 비만실태 및 식이섭취조사

정수진[†] · 조상운 · 차연수

전북대학교 생활과학대학 식품영양학과

최근 들어 점차 증가하고 있는 어린이 비만은 유전적인 요인이 강하게 미치고 있는 반면, 어린이 비만 발생에 영향을 미치는 환경요인으로 식이섭취의 습관 및 운동 등 생활습관이 중요한 요인으로 대두되고 있으며 또한 성장기 어린이비만은 육체적, 정신적인 위험이 내재되어 있다. 특히, 이시기의 소아비만의 약 80%가 성인기 비만으로 이환되며 최근 그 수요도 증가하고 있는 것으로 알려져 있다. 그러나 비만판정법으로 대부분이 신장이나 체중으로 판정하는 경우가 많고 아동의 비만을 적절하게 측정하는 지표에 대한 연구는 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 전주시의 초등학교 6개교를 선정하여 3, 4, 5, 6학년 남녀 학생 860명(남자 468명, 여자 392명)을 대상으로 비만실태 조사, 식생활 태도 및 식이섭취 상태를 조사한 결과는 다음과 같다. 비만판정지표로는 BMI법, Rohrer지수, Broca변형법, 체지방율(%) 및 WHR을 사용하였다. BMI 방법(소아과협회 기준에 따른 성별 연령의 BMI의 백분위치이용)에 의한 비만율은 전체적으로 21.8%(여학생 22.9%, 남학생 20.9%)로 조사되었으며, Broca 변법(한국인 신장별 표준체중치)을 이용한 비만율은 전체적으로 23.02%(여학생 21.4, 남학생 24.4)가 과체중 및 비만으로 조사되었다. 체지방량을 기준하여 비만을 판정법에는 생체 임피던스법(Inbody 3.0, Biospace)을 이용한 비만율은 전체적으로 36.1%(여학생 29.3, 남학생 41.7)가 정상이상의 체지방량을 보여 과체중 및 비만으로 판정되었다. WHR에 따른 비만판정은 전체의 80.6%가 표준범위에 속했으며 19.42%가 표준이상 이었다. 성별에 따른 분포는 남학생의 경우 81.41%가 표준범위였으며 18.59%가 표준범위 이상이었고, 여학생의 경우 79.59%가 표준범위, 20.41%가 표준범위이상이었다. 식생활 태도 조사에서는 아침 결식자가 43%로 나타났고, 과체중 및 비만군의 학생들(46.2%)이 아침 결식을 많이 하는 것으로 조사되었으며, 전체 학생의 65.5%가 식사 때 과식을 한다고 응답하였다. 이중 과체중 및 비만 학생들이 약 70%이며, 과식하는 식사는 51.6%가 저녁식사를 과식한다고 응답하였다. 24시간 회상법을 이용한 1일 식이섭취 실태 조사 결과는 모든 영양소의 섭취가 한국인 영양권장량(7차개정, 2000 남 2200 kcal, 여자 2000 kcal)에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 이는 초등학생들의 아침결식에 기인한 것으로 사료된다. 3대영양소의 에너지비도 탄수화물 : 단백질 : 지질이 각각 63.2 : 14.6 : 22.2로서 권장수치 65 : 15 : 20과 유사하게 섭취하고 있는 것으로 조사되었다. 성장기 어린이 비만이 향후 성인 비만과 각종 성인병으로 이어질 가능성이 높으므로 어렸을 때부터 올바른 식습관을 가지도록 지도해야 할 것이며, 앞으로 심도 있는 식이섭취실태조사를 위하여 3~7일간의 평상시 식이섭취 실태조사가 이루어져야 할 것으로 사료된다.

【P1-5】

한국 성인의 이소플라본의 섭취수준 및 이와 관련된 변인 분석

이민준[†] · 민성희 · 이양자 · 윤 선

연세대학교 식품영양과학연구소, 세명대학교 한방식품영양학과, 연세대학교 식품영양학과

최근 대두섭취가 극히 제한되어 있는 서구사회에서 전립선암, 유방암, 골다공증과 같은 호르몬 관련 질환과 심혈관질환의 유병률이 大豆食文化圈에 있는 아시아인에 비해 현저히 높음이 몇몇 역학연구에서 보고 되고, 대두에 함유된 이소플라본의 생리적 활성이 밝혀지면서 대두 및 이소플라본 섭취에 대한 관심이 세계적으로 높아지고 있다. 그러나 한국인