

# 급성 괴사성 궤양성 치은염 (Acute Necrotizing Ulcerative Gingivitis, ANUG)의 치험례

손고운\*, 정종혁, 허익, 박준봉, 권영혁  
경희대학교 치과대학 치주과학교실

## 연구배경

빈센트 감염 또는 빈센트 구내염이라고 불리는 급성 괴사성 궤양성 치은염은 소모성 질환이나 급성 상기도 감염 혹은 생활환경의 급작스러운 변화나 지속적인 정신적 스트레스와 관련하여 발병하며, 극도로 민감한 격통과 전신적 무기력증, 악취, 치은의 분화구양 파괴, 출혈, 궤양, 위막 형성, 임파선 병변을 동반한다. 아직까지 원인은 명확하게 밝혀지지 않았으며, 세균이 원인일 것이라는 가설은 증명되지 않아 세균도말이나 생검은 진단에 필수적 요소는 아니다. 진단은 임상적 소견에 의거하며, 진단 시 원발성 포진성 치은구내염 및 기타 구강 점막 질환과의 감별진단이 필요하다. 급성 괴사성 궤양성 치은염 환자의 치료 시 초기에는 급성 증상의 완화와 치은연상세마에 초점을 두고, 급성 증상 소실 후 치은연하 치석제거 및 치은소파술을 시행한다.

## 연구방법 및 재료

임상적으로 급성 괴사성 궤양성 치은염과 지치주위염으로 진단한 환자를 구강세정 및 치석제거술과 치은연하 소파술을 포함한 국소적 치료와 항생제 및 비타민 복용을 포함한 전신적 치료를 하고 판개절제술과 지치발거를 병행하였다.

## 연구결과

4주 동안 9회의 치주 치료 및 지치 발치를 시행한 결과, 증상과 징후가 완전히 해소되었다.

## 결론

급성 괴사성 궤양성 치은염 환자에서 국소적 치료와 전신적 치료를 병행하여 우수한 치료결과를 얻을 수 있었다.