

아동기 성학대 발생과 배경요인에 관한 전국조사

한 인 영(이화여자대학교 교수), 이 용 우(건국대학교 조교수)
유 서 구(송실대학교 전임강사), 김 경 희(이화여자대학교 BK사업단)

I. 서론

2000년 개정아동복지법 시행 이후 한국사회에서도 아동학대 문제에 대한 보다 많은 관심이 모아지고 있으며, 이러한 사회적 관심 속에서 학대아동에 대한 보호와 개입을 위한 다양한 노력이 시도되고 있다. 아동학대는 피해자가 성장기의 아동이라는 점에서 다른 가정폭력보다 더욱 심각한 문제이며, 아동기의 피학대 경험은 아동의 성장 및 발달에 있어서 장기적으로 부정적인 영향을 미친다(최학봉, 2004). 이와 같은 아동학대 유형 중 특히 아동에 대한 성학대의 경우 우울, 분노, 슬픔, 고독 등의 자아개념의 손상뿐 아니라 나이에 맞지 않는 무분별한 성적 행동, 자살충동, 행동장애, 섭식장애, 공황장애 등의 장기적이고 심각한 행동변화를 나타내는 등 성장과정의 아동에게 다양한 심각한 후유증을 유발하는 것으로 나타났다.

이에 서구의 선진국들은 80년대부터 아동기 성학대 발생빈도와 배경요인에 대한 활발한 조사 및 연구를 진행하고 있으며, 이를 바탕으로 효과적인 국가정책이나 서비스를 계획하고 실행해 오고 있다. 반면 우리나라의 경우 중앙아동보호전문기관의 전국아동학대현황보고서(2006)에 따르면, 2005년 한 해 동안 신고된 아동학대는 8000여건이었고, 그 중 실제 아동학대로 판정된 사례는 4633사례였다. 이중 성학대는 206건으로 전체의 4.4%를 차지하였으며 성학대사례는 매년 증가하고 있는 것으로 보고되고 있다. 그러나 우리나라의 경우 문제의 심각성에도 불구하고 아동 성학대 관련연구는 전국적인 조사가 없는 상황에서 소수의 단편적인 연구만이 진행되어 왔을 뿐 매우 부족한 현실이다. 홍금자(1997)는 K지역 16세 이상의 여성 2000명을 대상으로 성폭력 경험 실태에 관해 연구한 결과, 성폭력을 경험한 최초 연령은 16-19세가 약 35%로 가장 높은 비율을 차지하

였다. 서정열(2006)의 중소도시에서 발생한 성폭력 환자 실태에 관한 연구에서도 성폭력 환자 중 10세 미만이 9%, 11-20세가 43.8%를 차지하여 20세 미만의 아동·청소년기에 성폭력을 경험하는 비율이 높음을 알 수 있다. 하지만 이와 같은 연구들은 조사대상자가 매우 한정되어있고, 연구방법상의 한계 등으로 인해 한국의 아동 성 학대의 정확한 실태를 설명하는데 무리가 있으며, 이와 같은 이유로 1993년에 17개국 비교연구가 진행되었을 때에도 우리나라는 기초자료의 미비로 인해 포함되지 못하였다.

이에 본 연구는 아동 성학대 문제에 대한 효율적인 국가정책이나 서비스 개발 등 사회적 개입을 계획·실행하는데 있어서 기초자료를 제공하기 위하여, 전국의 19세 이상 성인 남녀를 대상으로 그들의 아동기 성학대 경험을 조사하여 최근 급증하고 있는 아동기 성학대 발생의 실태를 체계적으로 파악하고, 이와 관련된 다양한 위험요인을 분석하는 것을 그 목적으로 한다.

II. 연구방법

전국적 규모의 아동기 성학대의 발생현황과 관련요인을 파악하고자, 본 연구는 전국의 19세 이상 성인 남녀 2,037명을 대상으로 18세 이전의 성학대 경험유무 및 관련변인들을 구조화된 조사표를 이용하여 2006년 3월부터 약 2개월간 설문조사하였다. 전국 시도별 2005년 주민등록인구현황 자료를 근거로 지역, 성, 연령별 인구구성비에 따른 비례 할당 추출을 사용하여 전국의 19세 이상 성인남녀를 대표할 수 있는 표본을 구성하였으며, 실제조사는 사회조사 전문기관(한국리서치)에 의뢰하였다.

아동기 성학대 경험조사와 관련하여, 아동을 대상으로 성학대 경험여부를 직접적으로 조사하는 것이 보다 효과적이라는 의견이 제시될 수도 있으나, 아동 성학대에 대한 신고 및 발견이 거의 이루어지고 있지 않은 한국적 상황에서는 아동을 조사대상자로 확보하는 것은 현실적으로 불가능하다고 판단되었다. 따라서 본 연구는 성인을 대상으로 그들의 아동기 성학대 경험을 조사하는 연구(retrospective study)의 방식을 취하였다.

또한 자료 분석을 위해서는 기술통계와 이항회귀분석이 사용되었다. 기술통계에서는 아동기 성학대 경험실태와 관련하여 유형별 경험여부, 발생시기, 지속기간, 대응방법 등을 분석하였으며, 이항회귀분석에서는 아동의 개인적 요인, 부모요인, 가구요인, 지역사회요인을 포함시켜 아동기 성학대 발생과 관련된 요인을 파악하였다.

Ⅲ. 연구결과

1. 연구대상자의 인구사회학적 특성

조사대상의 성별을 살펴보면, 남자가 전체의 51.2%로서 여자(48.8%)보다 다소 높게 나타나고 있다. 결혼상태는 기혼이 65.1%로 가장 많고, 미혼이 32.5%이며, 나머지 유형들이 2.4%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 최종학력은 고등학교 졸업자가 전체의 37.4%로 가장 많았으며, 다음으로 대학이상의 학력을 가진 사람이 36%로 나타났다. 거주지역의 경우, 서울(21.8%)과 경기지역(22.4%)에 거주하는 사람들이 전체의 약 45%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 건강상태의 경우 전체의 약 3/4가량이 건강하거나 매우 건강한 것을 보고하였으며, 경제적 수준에 있어서는 76.7%의 응답자가 중이상의 수준이라고 응답하였다.

2. 성학대 발생 현황

먼저 아동기 성학대 경험실태를 살펴보면, <표-1>과 같다. <표-1>은 아동기 성학대의 경험유무를 파악한 것으로 유형별 중복응답을 허용하였다. 조사결과에 의하면, 전체 응답자의 79.2%는 어떤 종류의 성학대도 경험하지 않은 것으로 나타났다. 다시 말하면, 전체 응답자의 20.8%는 적어도 한 가지 이상의 성학대를 경험한 것으로 한국사회에서도 아동기 성학대의 발생빈도가 매우 높음을 보여주는 것이라 할 수 있다. 또한 이를 성별로 나누어 보았을 때, 여성은 전체의 28.4%가 적어도 한 가지 이상의 아동기 성학대를 경험한 반면, 남성의 경우 13.5%가 적어도 한 가지 유형이상의 아동기 성학대를 경험한 것으로 나타났다. 즉, 여성의 경우 남성에 비하여 아동기 성학대를 경험한 비율이 두 배 이상 높은 것으로 나타났으며, 이는 기존의 연구결과와 일치하는 것으로 볼 수 있다. 또한 남성의 경우도 약 7.4명 당 한명은 적어도 한 가지 이상의 아동기 성학대를 경험한 것으로 밝혀져 적지 않은 남성들이 아동기 성학대를 경험했음을 보고하고 있다.

<표-1> 성학대 유형별 경험 유무

성학대의 유형	빈도(%)		
	전체	남성	여성
말로 성적인 농담/희롱을 하거나, 음란물을 보게 함	157(7.7)	73(7.0)	84(8.5)
은밀한 부위를 보려고 하거나, 자신의 은밀한 부위를 억지로 보게 함	120(5.9)	39(3.7)	81(8.1)
강제로 입을 맞추거나 키스를 함	100(4.9)	3(2.2)	77(7.7)
성기나 은밀한 부위를 만졌거나, 만져달라고 함	123(6.0)	28(2.7)	95(9.6)
강제로 성관계를 시도하려다 실패함	46(2.3)	4(0.4)	42(4.2)
혀나 입으로 자신의 성기를 자극하게 하거나, 본인의 성기를 자극함	9(0.4)	5(0.5)	4(0.4)
강제로 성관계(성교, 실제삽입)를 가짐	23(1.1)	2(0.2)	21(2.1)
19세 이상의 성인과 합의하에 성관계(성교, 실제삽입)를 가짐	29(1.4)	18(1.7)	11(1.1)
기타	5(0.2)	5(0.5)	
한 종류라도 성학대를 경험함	423 (20.8)	141(13.5)	282(28.4)

다음으로 아동기 성학대를 유형별로 살펴보면, “말로 성적인 농담/희롱을 하거나, 음란물을 보게 함”을 가장 많이 경험한 것으로 전체 응답자의 7.7%(157명)이 경험하였고, 그 다음으로는 “성기나 은밀한 부위를 만졌거나, 만져달라고 함”, “은밀한 부위를 보려고 하거나, 자신의 은밀한 부위를 억지로 보게 함”이 각각 전체 응답자의 6.0%, 5.9%로 높게 나타났다. 반면 강제로 성관계를 가지거나, 혀나 입을 사용한 성학대의 경우는 각각 1.1%와 0.4%로 비교적 낮은 비율을 보이고 있다. 즉, 전체적으로 심각성의 정도가 높은 유형일수록 적게 경험했던 것으로 나타나고 있다. 또한 유형에 따른 경험을 성별로 나누어 보면, 여성이 거의 모든 유형에서 남성보다 높은 경험률을 보이고 있는 것을 알 수 있다. 다만, “성인과 합의하에 성관계를 가짐”의 경우 남성이 여성보다 약간 높은 비율을 나타내고 있는 것으로 나타났다.

또한 <표-1>의 아동기 성학대 경험여부는 중복응답을 포함한 것으로 전체 응답자의 28.1%는 두 가지 유형 이상을 중복 경험한 것으로 나타났으며, 중복경험에 있어서도 여성(31.2%)이 남성(22.1%)과 비하여 높은 비율을 보이고 있는 것으로 조사되었다.

아동기 성학대의 유형별 지속여부에 있어서는 “성인과 합의하에 성관계를 가짐”과 “기타”를 제외하고는 모두 일회발생의 비율이 높은 것으로 나타났다. 기타의 경우는 5사례가 모두 미성년의 이성 친구 또는 선배와 합의하에 성관계를 가진 것으로 파악되어, 합의하에 성관계를 갖는 두 경우를 제외하고는 모두 일회발생의 비율이 높은 것으로 나타났다.

성학대를 처음 경험했을 당시의 평균연령은 합의에 의한 경우를 제외하면, 13세 후반

에서 15세 중반에 이르는 것으로 나타났다. 특히, “강제로 성기나 은밀한 부위를 만졌거나, 만져달라고 함”의 경우 가장 빠른 나이에 경험하는 것(13.7세)으로 나타났으며, 합의 하에 성관계를 가진 경우는 모두 17세 이상에 처음 경험했던 것으로 조사되었다. 또한 성학대를 경험한 연령을 성별로 나누어 분석한 결과, 여성의 경우 남성보다 거의 모든 유형에 걸쳐 더 어린 나이에 경험하는 것으로 나타났다.

마지막으로 아동기 성학대에 대한 대응방법을 살펴보면, 모든 유형에서 “아무에게도 알리지 않고 도움도 받지 않음”이 가장 높게 나타나고 있으며, 도움을 받는 경우도 사법 기관·법률서비스, 심리치료·상담서비스 등과 같은 전문적인 기관보다는 부모, 가족, 친척, 친구 등과 같은 비전문적인 도움에 의존하는 것으로 나타나 아동기 성학대에 대한 보다 체계적인 보호시스템의 구축이 절실한 것으로 조사되었다.

3. 성학대 발생 요인

아동기 성학대 발생과 관련된 요인을 파악하고자 아동의 개인적 요인, 부모요인, 가구 요인, 지역사회요인을 독립변수로 삼아 이항회귀분석을 실시하였다. 종속변수는 아동기 성학대 경험여부로서, 아동기 성학대의 유형에 관계없이 한 종류라도 경험한 경우를 1, 어떤 종류도 경험하지 않은 경우를 0으로 이분하였다.

<표-2>는 이항회귀분석의 결과를 보여주는데, 아동의 개인적 요인 중 아동의 성별과 잦은 비행 가담, 부모요인 중 자녀의 수, 가구요인 중 가구의 낮은 경제적 지위, 지역사회요인 중 잦은 범죄발생 지역 거주 등이 아동기 성학대 발생과 통계적으로 유의미한 관계를 갖는 것으로 나타났다. 즉, 아동이 여아인 경우, 잦은 비행에 가담할수록, 가구의 경제적 지위가 낮을수록, 범죄발생이 잦은 지역에 거주할수록 아동기 성학대를 경험할 가능성이 높은 것으로 분석되었다. 반면, 형제·자매의 수가 많을수록 아동기 성학대를 경험할 가능성은 낮은 것으로 조사되었다. 또한 이와 같은 이항회귀분석을 남성과 여성을 대상으로 각각 분석한 결과, 남성과 여성의 경우 아동기 성학대 발생과 관련된 요인이 다른 것으로 조사되었다. 남성의 경우, 잦은 비행 가담과 대도시 거주가 유의미한 요인으로 밝혀진 반면, 여성의 경우 형제·자매의 수와 가구의 낮은 경제적 지위만이 유의미한 요인으로 나타났다.

<표-2> 아동기 성학대 발생요인에 대한 이항회귀분석

아동기 성학대 발생 요인	B	Wald	OR
아동의 개인적 요인			
여자 아동	1.091	70.770***	2.978
신체적/정서적 장애	.159	.162	1.172
짚은 비행 가담	.419	3.864*	1.520
원만치 않은 교우관계	.072	.056	1.075
아동의 부모 요인			
한부모 가구	.084	.142	1.088
부모가 신체적/정신적	-.239	.258	.788
양육, 돌봄 시간의 부족	.085	.344	1.089
아동의 수	-.141	12.143***	.868
가구의 사회경제적 요인			
낮은(하) 경제적 수준	.454	12.672***	1.574
낮은(초등학교 이하) 학력	-.033	.058	.968
지역사회 요인			
범죄발생이 잦은 지역	.501	3.826*	1.651
이웃 간의 교류가 별로 없는 지역	-.147	.265	.863
대도시(서울 및 광역도시)	-.215	2.890	.807
-2LL		1793.971	
Model X2		100.869***	
Nagelkerke R2		.082	
분류정확도(%)		79.7	

IV. 결론

전국의 19세 이상 성인남녀를 대표할 수 있는 표본을 처음으로 사용하여 아동기 성학대 발생 실태와 그 관련요인을 분석한 본 연구에 의하면, 전체 응답자의 20.8%가 적어도 한 가지 유형 이상의 아동기 성학대를 경험한 것으로 조사되었다. 이는 한국사회에서도 아동기 성학대의 문제가 심각한 수준임을 보여주는 실증적인 자료라고 볼 수 있다. 또한 발생요인과 관련해서는 아동의 성별, 비행가담 여부, 형제·자매의 수, 가구의 낮은 경제적 지위, 잦은 범죄발생 지역 거주 등이 아동기 성학대 발생과 통계적으로 유의미

한 관계를 갖는 것으로 조사되었다.

본 연구는 아동 성학대에 대한 전국적 조사를 통해 한국사회에서 아동 성학대 문제에 대한 관심을 환기시키고, 나아가 아동 성학대에 대한 효과적이고 전문적인 개입프로그램과 정책의 개발 및 실행을 위한 중요한 함의를 제공할 것으로 보인다.