

**척골 신경 탈구와 동반된 발음성 삼두근 증후군
- 동적 초음파 검사의 유용성 -**

**Snapping Triceps Syndrome with Dislocation of the Ulnar Nerve
- Usefulness of Dynamic Ultrasonography -**

고려대학교 의과대학 정형외과학교실

정웅교 · 박상원 · 송동익 · 이순혁

발음성 삼두근 증후군은 주관절을 굴곡하거나 신전할 때 삼두근 말단부 일부와 척골 신경이 내상과 전방으로 탈구되는 드문 질환이다. 이학적 검사 만으로는 다른 질환으로 오진되는 경우가 많아 정확한 진단이 필수적이며 확진을 위하여는 척골 신경 및 삼두근의 비정상적인 움직임을 관찰할 수 있는 영상 검사가 필요하다. 초음파 검사는 자기 공명 영상 촬영 등 다른 검사에 비해 간편하고 효과적으로 연부 조직의 동적 검사를 시행할 수 있는 장점이 있다. 저자들은 발음성 삼두근 증후군 환자를 동적 초음파 검사를 사용하여 진단하고 척골 신경 전방 전위술 및 삼두근 내두의 이전술을 시행하여 치유하였기에 문헌 고찰과 함께 초음파 검사의 유용성을 보고하고자 한다.

색인 단어: 주관절, 발음성 삼두근 증후군, 동적 초음파 검사