

# 애견(愛犬)의 건강을 도모(圖謀)하려면 (The health of your dog)

李 丙 祥

weimaraner 견종(犬種)은 아름다운 개이다 골격(骨格)은 완강(頑強)하고 눈동자는 깨끗하고 눈 정기(精氣)가 있고 피부(皮膚)는 광택(光澤)이 있어야 한다 개가 건강(健康)하지 못할 때에는 보기에 아름답지 못할 뿐만 아니라 애견가(愛犬家)의 『벗』이나 애정(愛情)의 대상물(對象物)이 될수가 없는 것이다 그러므로 weimaraner 를 건강(健康)하게 기르는데는 다른 견종(犬種)을 기를때와 같은 일반적(一般的)인 원칙(原則)이 있고 그밖에 알아 두어야 할 몇가지 사항(事項)이 있다.

### 강아지 때의 여러가지 문제(問題) (puppy problems)

건강(健康)한 강아지(puppy)는 건강(健康)하고 행복(幸福)한 성견(成犬)이 되는 첫째 조건(條件)이다.

그러므로 다음의 여러가지 법칙(法則)은 weimaraner puppy의 선택(選擇)과 사육관리(飼育管理)의 지침(指針)이 될것이다.

(1) 반드시 청결(清潔)하고 건강(健康)한 환경(環境)을 가진 번식장(蕃殖場)에서 강아지를 구입(購入)할것.

(2) 구입후(購入後)에는 수의사(Veterinarian)의 진찰(診察)을 받게 할것과 Distemper, Hepatitis, Rabies, 등의 예방주사(豫防注射)를 계속(繼續)할것과 정기적(定期的)으로 기생충증(寄生虫症)을 검사(檢査)할것, 또 수의사(Veterinarian)와 상의하(相議下)에 Vitamin 과 광물성 영양소(礦物性 榮養素) 그리고 사료(飼料)의 종류(種類)와, 분량(分量)을 결정(決定)할것.

(3) 밤 낮 으로 따스하고 건조(乾燥)한 장소(場所)에서 기를것 강아지는 낮에도 잠을 자야 함으로 강아지를 차거나(寒冷) 습기(濕氣)있는 장소에 매어두는 것은 무지(無知)하고 위험(危險)한 일이다. 털이 깊은 개는 영하(零下) 이하(以下)의 기온(氣溫)에서도 무방(無妨)하지마는 Weimaraner같이 피부(皮膚)가 얇은 종류는 그렇지 못하다. 서울지방(地方)같이 추운 겨울 Weimaraner에 성견(成犬)이라고 할지라도 밖에 있는 [개집]에서 밤을 지나게 함은 적당하다고 할수없다.

Weimaraner 종(種)은 저온(低溫)에도 밖에서 운동(運動)할수 있는 완강(頑強)한 체질(體質)을 가지고 있다. 그러나 운동(運動)을 하고 있지 않는 경우에는 저온(低溫)은 견디기 어려운 조건(條件)이다.

(4) 충분(充分)한 운동(運動)을 시킬것. Weimaraner 견종(犬種)은 체격(體格)이 크고 원래(原來)는 수렵(狩獵)에 사용(使用)되어 오던 견종(犬種)인 것이다. 근육(筋肉)을 적절(適切)하게 발육(發育)시키려면 상당(相當)한 면적(面積)의 운동장(運動場)에서 일정(一定)한 운동(運動)을 시켜주어야 한다.

(5) 끝으로 지켜야 할 금기사항(禁忌事項 Don't) 목욕(沐浴)을 시키지 말것. 목욕(沐浴)은 거의 필요 없고 자주시키면 도리어 해(害)가 된다. 자주 솔질(Brush)한 해 주면 피부(皮膚)는 청결(清潔)할것이고 적당한 사료(飼料)는 피부(皮膚)를 광택(光澤)있고 건강하게 할것이다. 목욕(沐浴)은 단지 피부(皮膚)를 건조(乾燥)케하여 피부염증(皮膚炎症)의 원인(原因)이 될뿐이다.

### 각종 질병에 대하여 Ailments and diseases

우리가 흔히 볼수 있는 개의 각종(各種) 질환(疾患)을 설명 하기로 한다.

물론 이 제목(題目)한장(One chapter) 으로서 전부 상세(詳細)히 적을수는 없는 터이므로 중요(重要)한것만을 약술(略述)하기로 한다.

”디스템퍼“—Distemper는 Virus 성감염(性感炎)으로 강아지 때(仔犬期)와 (成犬前期 Puppies and young dog)에 특히 감염(感染)되기 쉬운 병(病)이다. 증상(症狀)은 식욕부진(食慾不進), 원기부족(元氣不足) ”눈“ 과 ”코“에서 분비물(分泌物)이 나오고 고열(高熱)과 때로는 설사(Diarrhea)를 주증상(主症狀)으로 하는 것이다. 이 병(病)을 막는 유일한 방법(方法)은 예방접종(豫防接種)인 것이다. 강아지때(仔犬期)에 임시(臨時)로 혈청주사(血清注射)를 생후(生後) 3개월까지 마치고 그 후에 비로서 영구면역(永久免疫) Vaccine 을 놓아 주게 된다.

개 간염(犬肝炎) Canine hepatitis는 전염성(傳染性) 성감염(性感炎) Virus 으로서 이것도 강아지 때

(仔犬과 未成犬 Young dog)에 흔히 걸린다. 빨리 치료(治療)하지 않으면 죽는률(率)이 많다.

이 질병(疾病)은 이 병을 경과(經過)한 개의 "오줌"을 매개(媒介)로하여 전파(傳播)되며 증상(症狀)은 갑자기 개가 불안(不安), 고열(高熱)때로는 설사(Diarrhea)를 일으키게 된다. 이 병(病)에서 보호법(保護法)은 임시(臨時) 또는 영구성(永久性)ワク진주사(注射)이다. "광견병" (狂犬病 Rabies)는 감염견(感染犬)에게 물려서 전파(傳播)되는 Virus 성질환(性疾患)이다. 이 병(病)은 개에게서 사람으로 전파(傳播)될수있는 약간의 질병중(症病中)에 하나이다. 광견병에는 "발현성" (發現性) "잠복성" (潛伏性) 두형(二型)이 있고, 발현성(發現性)에 그 특증(特徵)은 기질(氣質)이 전혀 달라지고 무엇이던 움직이는 것에 대하여 달려들어 물어 뜯으려고 연하곤란(燕下困難)이 오고 "침" 을 흘리고 더듬을 내고 전신(全身)의 마비(痲痺)가 오게 되고 파친내는 죽는다 애견(愛犬)을 이 무서운 질병에서 보호(保護)하려면 예방주사(預防注射)를 마쳐야 되고 또 예방주사를 실시(實施)하여야 한다. 현재(現在) 광견병(狂犬病)이 없는 나라는 오스트라리아와 영국 뿐이다.

**사고(事故)로 인한 외상(外傷 Accidents)**

여러가지 사고(事故 Accidents)가 많지만 몇가지를 들면 철조망(鐵條網)에 걸려서 일어나는 절창(切創) "쌈"에서 오는 교상(咬傷) 교통사고(交通事致) 찰과상(擦過創) 타박상(打撲傷) 족부창상(足部創傷)등이다. 창상은 소독수(消毒水)로 잘 씻어내고 깨끗하게 두면 된다. 큰 상처(傷處)는 수의사(獸醫)에게 치료(治療)를 받아야 한다.

특히 발에 창상(創傷)은 겨울(冬節)에는 붕대를 하고 양말을 신겨서 보호(保護)하여야 한다. 교통사고(交通事致)나 심한 타박상(打撲傷)을 입었을때는 안정(安靜)시키고 보온(保溫)에 유의(留意)하며 즉시 전문의(專門醫)로 하여금 내부손상(內部損傷)이나 쇼크(Shock)의 유무(有無)를 진단(診察)케 하여야 한다.

예창(銳創)을 입었을 때에는 수의사(獸醫)에게 치료(治療)를 받도록 하여야한다. 또 동맥(動脈)이 손상(損傷)되어 출혈(出血)이 심할 때에는 손상(損傷)부위(部位)보다 상부(上部)에 결박(結縛 tourniquet)을 해주어야 한다. 이 결박(結縛)은 15분마다 약 1분 2간분 풀어 노아 주어야하며 전문가(專門家)가 도박되기를 기다려야한다. 심한 창상(創傷)을 받았을 때는 언제나 가능한 한(限) 따뜻하고 조용하게 하여 주어야 하고 입마개 (muzzle)를 하는 것이 좋다. 등통(疼痛)이 심

한 개는 더 물어 뜯기 쉬움으로 주의하여야 한다. 그러므로 수의사(獸醫)가 진찰(診察)하여 풀때까지 입마개를 채워주는 것이 가장 좋은 예방이 된다.

**"피부질환" (皮膚疾患) Skin disease**

Weimaraner 견종(犬種)이 가장 걸리기 쉬운 피부병(皮膚病)은 mange이다.

이병은 두가지 종류(種類)가 있는데 하나는 보통 두부(頭部)에 호발(好發)하고 적은 탈모부(脫毛部)가 때로는 림피상(鱗皮狀)으로 눈 주위(眼部周邊)에 나타난다.

둘째 종류(種類)는 개몸(犬體)에 어느 곳이나 나타날수 있으나 흔히 다리(脚部)옆에 나타난다.

이것은 여드름 같이 보이며 불쾌(不快)한 냄새(臭氣)가 있다. 이병은 수의사(獸醫)에게 약품(藥品)과 처방(處方)을 의뢰(依賴)할 것이다.

유견(Puppy)이나 미성견(未成犬)은 도장병(Ringworm) 즉 곰팡이(Fungus)에 의한 피부병(皮膚病)에 걸리는 수가 있다. 이것은 큰 문제가 되는 것은 아니고 수의사(獸醫)에게 맡기면 쉽사리 치료(治療)할수 있는 병이다. Weimaraner는 단모(短毛)입으로 습진(濕疹 eczema)이나 마란(糜爛)에 고생하는 일은 적지만 그 반면에 "파리" "모기" 그 밖에 곤충을 막아내는 데는 결점(缺點)이 있다. 그러므로 항상(恒常) 이런 상처(傷處)를 초태(招來)시키지 않도록 주의하여야 한다. 수의사(獸醫)에게 가면 여름에 사용(使用)하는 벼룩약(Flea powder)을 얻을 수 있다.

**"기침" 및 호흡기계질환(呼吸器疾疾患)**

**Coughs and respiratory disease**

기침(Coughs)은 여러가지 원인(原因)에 의하여 일어날수가 있다. "개 기침"(Kennel cough)이라고 알려진 병(病)은 상당이 어려운 질환(疾患)으로서 이것은 공중 전염(空氣傳染)이나 직접접촉(直接接觸)으로 전염(傳染)되고 나이(年令)에 관계 없이 걸린(罹患)다 증상(症狀)은 마른 "기침"(Dry,hach cough)이 갑자기 (突然)이러난다.

이것을 방치(放置)해두면 만성 "기침"이나 폐염(肺炎)으로 발전(發展)할 우려(憂慮)가 있으므로 수의사(獸醫) 진찰(診察)은 받아야 한다.

폐염(肺炎)에 걸리면 급겨(急激)하고 심한 호흡곤란(呼吸困難)과 발열(發熱) 증상(症狀)이 나타난다. 이때에는 곧 치료(治療)를 받아야 한다.

**기생충질환 (寄生蟲疾患 Parasites)**

개(犬種)에게 가장 흔한 기생충(寄生蟲)으로서는 회충(roundworms),12지장(hook worms),조충(Ta-

peworm s), 심장충(heart-worms), 편충(Whipworms), 콕시디아(Coccidia)등이다.

강아지 때(仔犬期)의 12지장충(12指腸虫)은 특히 위험(危險)하다. 모든 기생충(寄生虫)은 검변(檢便)에 의하여 발견(發見)할수 있고 검변(檢便)은 생후(生後) 6주에 강아지의 똥(大便)을 검변(檢便)해야하고 그 후 8주 마다 검변(檢便)하여야 한다.

암개(牝犬)는 종부전(種付前)에 반드시 구충을 해야한다. 기생충(寄生虫)에 감염되면 때로는 개가 불안상태(不安狀態)에 빠지고 또 마르고 설사를 하는 수가 있다. 이러한 증상(症狀)은 항상 나타나는 것이 아니므로 때때로 검변(檢便)을 실시(實施)해야 한다. 수의사(獸醫師)에게 부탁하던가 또는 필요한 약을 구하여 먹이도록 하는것이 안전하다.

**항문선(肛門腺~Anal glands)**

항문선이란 직장(直腸)으로 통하는 한쌍의 분비선(分泌腺)인데 이것이 막히면 개에게 불쾌감(不快感)을 주게 된다. 전항문(全肛門)주위(周圍)가 동통(痠痛)을 이르고 염증(炎症)이 생기며 때로는 농양(膿瘍)이 생긴다. 이때에 볼수있는 증상(症狀)으로는 개가 항문주위(肛門部圍)를 자주 핥게 되고 또 항문부위(肛門部圍)를 땅에 부벼대게 되고 따라서 변비증(便秘症)이 생기게 된다. 이러한 증상(症狀)은 운동부족(運動不足)인 개에게 더욱 많다. 수의사(獸醫師)에게 속히 치료(治療)를 받아야 한다.

**"설사" (下痢 Diarrhea)**

그 원인(原因)은 여러가지 있으나, 첫째로 음식(食品)을 바꾸었을 때와 물이나 환경(環境)을 바꾸었을 때 또 기생충증(寄生虫症) 세균감염(細菌感染) 그 밖에 질환(疾患)의 증상(症狀)으로도 나타날수가 있다. 설사를 할때에 물과 음식을 감소(減少)시켜도 쉽게 먹지 않으면 수의사(獸醫師)의 진찰(診察)을 받도록하는것이 좋다.

**구토(嘔吐 Vomiting)**

대개 개는 이유(理由)없이 구토(嘔吐)하지 않는다. 그러나 때로는 "먹이"를 다른 종류(種類)로 바꾸었을 때 풀을 먹었을 때 과로(過勞), 과식(過食)으로 인하여 일시적(一時的)으로 토(吐)할 때도 있는것이다. 한 두번 토(吐)하고 먹는다면 염려할 필요는 없으나 계속적으로 토(吐)할 때에는 중(重)한 병(病)에 기인(起因)하는 것인지도 모른다. 즉 상(傷)한 음식(飲食), 독성물질(毒性物質), 이물연하(異物燕下), 기생충(寄生虫) 또는 다른 질환(疾患)의 시초(始初)로 나타나는 증상(症狀)일런지도 모른다. 이러한 경우에는 수의사(獸醫師)에게 진찰(診察)을 받을 때까지 음식(食品)을 먹여서는 아니된다.

**변비(便秘 Constipation)**

Weimaraner 성견(成犬)은 하루 한번 내지 두번(一日一回乃至二回)의 통변(通便)이 있다. 이를 이상(二日以上) 똥을 못 누거나 또는 똥 할때에 몹시 어려워할 때에는 변비(便秘)가 있는 것이다. 변비(便秘)의 원인(原因)의 하나로서는 뼈(骨)를 너무 많이 주는 때에도 있다. 운동(運動)을 무제한(無制限)으로 하는 개를 제외(除外)하고는 뼈(骨)를 소화(消化)시키는 것은 어려운 것이다. 그러나 변비(便秘)의 원인(原因)이 장내(腸內)에 종양(腫瘍)이나 이물(異物)로서 장(腸)이 막혔기 때문에 오는수도 있을 것이다. 변비(便秘)가 있을 때에는 아침에 소금물(1%)을 몇 Ounce 정도 하라 이것으로서 똥을 못눌 때에는 수의사(獸醫師)의 진찰(診察)을 받도록 하라.

**눈, 귀 질환(眼, 耳 疾患 Ear and ailments)**

Ear mite는 청도내(聽道內)에 기생(寄生)하는 진디기(小蟲)의 일종(一種)이다. 머리를 몹시 흔들고 몹시 끌고 할때는 이병(病)을 생각해야 될것이다. 귀(耳)내면(內面)이 검고 점질을 벗고하는 것이 상례(常例)이고 조속히 치료(治療)하지 않으면 더욱 심한 질환으로 진전(進展)하기가 쉽다. Weimaraner의 귀(耳)는 수렵시(狩獵時)에 이물(異物)이 귀(耳)에 들어가기 쉬우므로 자주 검사(檢査)하여 주어야 한다.

수렵(狩獵)에 사용(使用)하는 개에게는 굶허우거나 이물(異物)이 들어가거나 먼지가 들어가기 쉬우므로 「눈병」(眼疾)이 나기가 쉽다. 「눈」을 시크려면 봉산수(硼酸水)를 사용하고 그러나 일과(日課)가 되어서는 않된다. 또 Penicillin 안고(眼膏)는 경련 안부염증(眼部炎症)에 사용할 수 있으나 염증(炎症)이 장기간(長期間) 계속(繼續)되면 수의사(獸醫師)에게 보여야 한다.

**경련(痙攣 Convulsions)**

여기에는 단순한 Tremor(震擧 戰慄)에서부터 전신(全身)의 경련(痙攣)에 이르기 까지의 여러가지의 근육(筋肉)의 경련상태(痙攣狀態)를 말하는 것으로 원인(原因)에는 여러가지가 있을수 있다. 기생충(寄生虫症) 감염(感染) 신경계질환(神經系疾患) 이물(異物)이나 중독성물질(中毒性物質)의 연하(燕下)등이다. 경련(痙攣)은 중(重)한 증상(症狀)으로 위험(危險)한 상태(狀態)이니 즉시 수의사(獸醫師)에게 보여야 한다. 진찰(診察)을 받을 때까지는 Barbiturate같은 진정제(鎮精劑)를 먹이고 안정(安靜)과 보온(保溫)에 류의(留意)하여야 한다.

**중독(中毒 Poisonings)**

여러가지 중독성 물질(中毒性物質)이 집안에는 많

다. 즉 취약 연성도료(鉛性塗料) 살충제(殺虫劑) 등등이다. 개가 이런것을 먹었을 때에는 무엇을 얼마나 먹었는지 알아 내도록 노력(勞力)하여야 한다. 우선 구토(嘔吐)를 시키도록 하여 즉시로 수의사(獸醫師)의 치료(治療)를 받아야 한다.

**각종 구강질환(各種 口腔疾患 Mouth disorders)**

주석(酒石 tartar)이 치아(齒牙)에 축적(蓄積)되면 불쾌(不快)한 냄새가 날 뿐만 아니라 치근(齒根)을 자극(刺戟)하게 된다. 가끔 큰 뼈(骨)를 주거나 깨밀수 있는 작난감을 주면 이것을 어느정도 방지(防止)할 수 있다. 또 주석(酒石)을 긁어 버릴수도 있다. 개가 늙어지면 때때로 이(齒牙)를 빼어 버려야 하는경우도있다.

이상 간단히 말한바는 개에게 흔히 있는 질병(疾病) 몇가지를 소개(紹介)하였으나 항상 기억할 것은 의심(疑心)이 날때는 언제나 수의사(獸醫師)에게 문의(問議)하라는 것이다.

**수렵견(狩獵犬)에 관한 몇가지 문제**

Some problems pertaining to hunting dogs weimaraner는 수렵능력(狩獵能力)이 우수(優秀)한 견종(犬種)으로 널리 알려진 견종(犬種)이다.

의학적(醫學的)으로 이야기 할때 수렵견(狩獵犬)보다 여러가지 다른 문제(問題)가 있다. 즉 수렵견(狩獵犬)은 추고(寒冷) 습기(濕氣)있는 기후(氣候)에 저항력(抵抗力)이 있어야 한다. 텃장(獵場)은 내개 지형(地形)이 험악(險惡)한 것이 보통임으로 수렵견(狩獵犬)은 완강(頑強)한 체력(體力)을 가져야 한다. 또한 장시간(長時間)을 차(車)를 타고 가는등 여러가지 문제(問題)가 생기는 관계로 텃장(獵犬)을 기르는데 필요(必要)한 몇가지 주의(注意)를 하려고 한다.

(1) 수렵기전(狩獵期前)에 건강진단(健康診察)을 받을 것.

(2) 수렵기(狩獵期)가 시작하기 수개월전(數個月前)부터 규칙적(規則的)인 운동(運動)을 시켜야 한다. 운동(運動)이 부족(不足)한 개는 수렵시(狩獵時)에 속히 피로(疲勞)함으로 병든 개 같이 되기가 쉽다.

(3) 매일 진디기(ticks), 이물(異物) 가지(刺針) 절창(切創) 찰과창(擦過創)등을 검사(檢査)할 것.


(4) 장거리(長距離) 수렵전(狩獵前)에 단거리(短距離) 수렵(狩獵)부터 시작하도록 할것. 차(車)멀미가 심하면 수의사(獸醫師)에게 부탁하여 진정제(鎮定劑)를 가지고 갈것.

(5) 수렵기간중(狩獵期間中)에는 영양(榮養)에 특별히 주의(注意)할것. 수렵시(狩獵時)의 energy 소모(消耗)는 막심(莫甚)함으로 단백질(蛋白質)이 많은 음식을 먹어야 할 것이다.

(6) 밤(夜間)에는 따뜻한 잠자리(warm place)를 마련해 주어야 한다. 냉기중(冷氣中)에서 습기(濕氣)에 쓰이고 피곤(疲困)한 개는 병에 걸리기 쉽다.

(7) 여행중(旅行中) 개를 차(車) 위에 있는 곳간(짐 싣는 곳)같은 곳에 넣지 말것 이렇 같은 곳은 공기(空氣)가 부족(不足)할 뿐 아니라 불완전 연소가스(不完全 燃燒 瓦斯)때문에 위험(危險)하다. 또한 여기에는 Spring이 없기 때문에 환기(換氣)가 나쁠 뿐만 아니라 충격(衝擊)을 받기가 쉽다.

이와같이 애견(愛犬)을 질환(疾患)에서 부터 보호(保護)하기 위하여 쓰는 경비(經費)는 건강(健康)하고 행복(幸福)한 Weimaraner를 기르는 기쁨으로서 보상(報償)을 받게될것이다. 당신이 기르는 애견(愛犬)은 평소(平素)와 달리 보이거던 언제든지 지체달고 수의사(獸醫師)에게 보이도록 하라 조기진단(早期診察)은 조기회복(早期恢復)을 의미(意味)하는 것이다.



피부질환 기생충증과 구루병 (생후 60일 필자촬영) (생후 4개월 필자촬영)