

# 嬰幼兒保健에 關한 研究

~1,200명의 어린이대상으로~

<이화의대간호학과장> 손 경 춘

本 嬰幼兒 保健에 關한 調査는 梨花女子大學校 母子保健所에 登錄된 1,200名 어린이 中 出産時부터 滿 5個年까지 繼續 健康管理를 받은 男兒 62名, 女兒 48名을 對象으로 1個月에 1回씩 生日을 擇하여 體格을 測定하고 이 測定值로서 體格指數를 計算하였으며 아울러 出産場所, 介助者, 混食時期, 豫防接種關係 等を 調査하여 이들의 成長을 追求한 것이며 韓國人 兒童의 標準値와 比較 檢討하여 多少라도 斯界에 이바지 하고자 한 것이다.

1. 本調査值를 韓國小兒標準値와 比較하면 胸圍에는 別差가 없고 身長, 體重, 頭圍에서 優位를 나타낸다.

2. 日本標準値와 比較해 보면 身長, 體重에 있어 嬰幼兒期까지 本成績이 優位에 있으나 그 後는 劣勢에 있다.

3. 美國標準値와 比較하면 身長, 體重, 頭圍에서 全發育期를 通해 本成績이 劣勢를 보이니 母乳로 營養이 充分한 6個月까지는 큰 差가 없고 年齡과 더불어 差異가 甚하여진다.

4. 適當치 않은 離乳食은 6個月前에 주는 것보다는 母乳만으로 養育하는 것이 發育成長에 좋은 것으로 보아 離乳食의 改善과 어머니들에 對한 育兒知識이 切實히 要望된다.

5. 身長을 基準으로 한 體格指數에 있어 比體重은 9個月까지 거의 直線增大를 보이며 男兒가 優位를 나타내고 比胸位는 年齡과 더불어 減少하고 男兒가 큰 値를 나타내며 Rohren 指數는 年齡이 적을수록 充實하고 男女는 大同少異하다. Kaup 指數는 年齡, 性別과 關係없이 一定한 指數를 나타낸다.

6. 出産場所는 자기집이 78%로 가장 많으며 病院은 10.9%에 不過하다.

7. 出産時의 介助者는 家族中의 女子가 36.4%로 가장 많고 다음이 이웃집 女子 25.4%, 醫師 14.5%, 助産員 10.9%의 順이었고 自己自身이 7.3%, 家族中 男子가 3.6%나 차지한다.

8. 豫防注射는 소아마비 78.2%, D. P. T. 76.4%, 天然痘 60.9%, 順이었다.