

## “어린이를 충치(虫齒)로 부터 보호

## 건강한 치아(齒牙), 건강한 어린이”

# 어린이 충치예방제 포피 POPY

튼튼한 이는 건강한 어린이로 만듭니다.

정상적으로 발육하는 어린이의 이는 약 7개월 부터 나기 시작하여 3~4세가 되면 20개의 이가 나게 되며 이것을 유치라고 합니다.

유치는 6세부터 갈기 시작하여 11세 정도되면 영구치로 바뀌어 집니다.

유치에서 영구치로 바뀌는 시기에 충치의 발생 율은 높게 나타납니다.

우리나라 어린이의 약 80~90%가 충치를 앓고 있으며 충치는 어린이들이 즐겨먹는 사탕등 당분이 치석 또는 충치부위에 침투되어 이곳에 있는 세균 및 효소와 작용하여 유산이라는 산성물질을 만듭니다.

이 유산이 이를 구성하고 있는 칼슘을 용해시키며 세균이 자라는 것을 도와주어 이가 붕해, 부패되는 현상을 충치라 합니다.

충치가 발생하면 어린이는 편식을 하게 되고 위장병, 영양불량 증상이 나타나며 신경질적으로 자라게 됩니다.

그러므로 선진국에서는 어린이의 충치예방을 위하여 상수도에 충치 예방약을 넣어 공급하고 있습니다.

포피는 어린이의 충치를 예방하고, 충치에 대한 저항력을 높여주며 동시에 이의 골격형성을 촉진시켜 치아를 튼튼하게 자라도록 하는 약입니다.

정상적으로 자라나는 태아의 치아(이)는 임신 6주 부터 형성됩니다.

임신부가 포피를 복용하면 불소이온(F ion)이 태아의 이로 흡수되어 태아의 치아가 충치에 대한 저항력을 갖게 되므로 충치를 예방할수 있습니다.



### 성분 · 함량

100ml중 : Sodium Fluoride(U. S. P. 19)

.....110mg(F ion 50mg)

### 작용 및 특징

- 포피는 복용시 위장에서 신속히 흡수되어 저 이와 뼈에 모여 칼슘과 작용하므로써 산성물질에 용해되지 않는 튼튼한 이를 만들어 줍니다.
- 포피는 이를 튼튼하게 만드는 촉매작용과 발육촉진 작용을 하며 동시에 충치에 대한 저항력을 높여 줍니다.
- 포피는 충치를 발생시키는 세균을 죽이고, 효소작용을 억제합니다.
- 특히 임신부의 경우 포피를 복용하면 태아의 치아가 튼튼해지고 충치에 대한 저항력을 갖게 됩니다.

- 포피는 소량으로 충분한 예방효과를 나타내도록 만들었습니다.
- 포피는 1ml 눈금이 표시된 스포이드가 달린 안전캡을 부착시켰으므로 사용에 편리합니다.
- 포피는 맛이 좋아 어린이가 즐겨 먹습니다.

**효능·효과**

치아우식의 예방(어린이 충치의 예방, 튼튼한 치아로의 촉매작용)

**용법·용량**

유아-3세 : 1일 1회, 1세 1ml

3세 이상 : 1일 1회, 1회 2ml

유아부터 14세까지 장기간 계속 복용하면 할수록 좋습니다.

부착되어 있는 스포이드(표시눈금 : 1ml)를 사용하여 복용하십시오.

사용하실 맨 특수장치로 제조된 안전 캡 양쪽의 화살표(▲) 부분을 누르고 돌리십시오.

**주 의 :** 1. 만성으로 용량을 초과하면 치아의 에나멜에 반점과 골결의 변형이 나타남

니다.

2. 만성용량 초과시에는 타액의 항진, 위장장애가 나타납니다.
3. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
4. 눈에는 사용하지 말며 주사제로 사용을 금합니다.
5. 용법용량을 지키십시오.

**금 기 :** 음료수에 불소이온이 0.7ppm이상일 경우에는 사용을 금합니다. (외국에서는 충치예방을 위하여 상수도에 불소이온을 넣어 공급하고 있습니다만 우리나라는 아직 불소이온을 넣지 않고 있습니다.)

포장단위 : 50ml



제조발매원

**상아제약주식회사**

서울특별시 강서구 등촌동 144-2

= 各種齒科材料一切 =

**大宇齒科材料商社**

崔壯祚·崔南祚

서울 特別市 中區 봉래동 1가 65의 10 (유하빌딩 202호)

電話 (28) 4 5 7 9