

미성숙 영구치를 중심으로
TREATMENT OF COMPLICATED CROWN
FRACTURES

I. Immediate Treatment

Pulp가 exposure된 경우의 treatment는 pulp capping, pulpotomy 또는 Pulpectomy가 있다.

Pulp Capping


목적 : 치수를 보존하고 새로운 dentin을 형성 시킴.

Indication for Pulp Capping


- Small pulp exposure
- Exposure가 수시간이상 경과되지 않은 것.
- 다른 injur가 없는 경우.
- Post retention이 필요없는 경우.

Procedure of Pulp Capping

1. Cotton rolls, Saliva ejector 또는 rubber dam 등으로 치아를 격리 시킨다.
2. 치아를 Saline으로 닦아준다.
3. Capping medium을 바른다.
4. Temporary crown을 맞추어 본다.
5. Z.O.E. Cement로 Temporary Crown을 Setting한다.
6. Radiogreph와 vitality test로 치아를 Check
7. 2개월 후에 Temporary Crown을 제거하고 노출부분의 Closure 여부를 Check한다. Closed된 경우는 Semi-Permanent restoration을 하여준다



■ calcium hydroxide
 ▤ Z.O.E.



서울市 認定 第68号

여러 院長님의 平素의 厚意에 報答하고저 다음 場所에 齒科技工所를 開設하였읍니다. 倍前에 声援과 끊임없으신 指導鞭撻을 바라마지 않읍니다.

새로나 齒科技工所

代表 金 原 同

서울 中區南大門路 5街 12의 1
 (태영빌딩 601호)
 ☎ (28) 7997