



벼농사

1. 보온못자리 관리

○ 보온못자리는 의기온도가 20°C 이상되면 비닐갓을 열어 통풍시켜 준다.

○ 5월초에 날씨가 따뜻해 진다고 일찍 비닐갓을 열어주면 냉해를 받을 우려가 있으니 주의한다.

○ 비닐을 벗긴 후는 1~2일 동안은 물을 깊게 데어서 몸살을 막아준 후 1~2cm로 물을 낮추어 튼튼한 모로 키운다.

6일은 立夏, 21일은 小滿——.

- ◆…… 이제 본격적인 영……◆
- ◆…… 농「시즌」에 접어들면……◆
- ◆…… 서 농촌의 일손은 점……◆
- ◆…… 점 바빠지게 된다. 5……◆
- ◆…… 월을 「계절의 여왕」……◆
- ◆……이라고 부르는 것처럼……◆
- ◆…… 농사에 있어 서는 가……◆
- ◆…… 장 중요한 달이기도……◆
- ◆…… 하다. 모내기를 비롯……◆
- ◆…… 한 콩, 고구마 심기, ……◆
- ◆…… 각종 병충해 방제에 철……◆
- ◆…… 저를 기해야 되겠다. ……◆
- ◆…… 우리 모두 웃으면……◆
- ◆…… 서 가을을 맞을 수……◆
- ◆…… 있도록 만반의 준비……◆
- ◆…… 태세와 최대의 노력……◆
- ◆…… 을 기울이자. ……◆

2. 모내기

○ 모는 적기에 규격못줄을 사용하여 심는다.

모내기 적기

구 분	중북부지방	남부지방
1모작논	5. 20~6. 5	5. 20~6. 10
2모작논	6. 10~6. 20	6. 10~6. 25

○ 모는 2~3cm정도로 얕게 심는다.

3. 기음약 사용

○ 김매는 노력을 절감하기 위하

여기 기음약을 사용하여 김매기(제초)
작업을 한다.

4. 병충해 방제

○ 모도열병, 모찰록병, 흰빛잎
마름병, 애멸구, 끝동매미충, 벼잎
벌레등을 뜻자리에서부터 수확기까
지 철저히 청제를 하여 피해를 줄
인다.

밭농사

1. 밀·보리밭 관리

○ 붉은곰팡이병에 걸리면 밀보리
는 감수가 크므로 밭병이 우려될 때
에는 1주일 간격으로 2회정도 약제
를 살포하고 진딧물도 발생이 점차
늘어나고 있으므로 동시에 약제를
살포한다.

○ 출수기를 전후하여 비가 자주
올 때에는 습해를 받지 않도록 배수
를 해주고 가뭄이 들 때는 관수(물주
기)를 해준다.

2. 여름 밭작물 심기

○ 콩, 고구마, 옥수수 등 여름 밭
작물을 심기 위해서 땅을 비워 두었
던 포장에는 파종이 늦을 수록 감수가
크게 되니 서둘러서 파종을 끝내
므로 보내기와 노력 중복을 피하여
경제적인 영농이 되도록 한다.

파수

○ 이 달은 각종 파수의 개화결실
의 달이며 산소와 빛이 왕성하게 자
라는 계절이다. 또한 파수이외의 각
종 농작업도 바빠 노동력도 부족하
기 쉬운 때이므로 파원 관리작업을
뒤로 미루는 경우가 많아 실패하는
농가를 간혹 볼 수 있는데, 파원관
리에는 매우 중요한 시기이니, 열매
솎기, 거름주기, 병충해방제 등을 철
저히 하여 좋은 결실을 가져오도록
파원농가는 노력할 해야 한다.

채소

1. 채소 일찍 가꾸기

○ 이 달은 각종 채소의 일찍 가꾸
기용 모를 아주 심기 할 시기이니 고
추, 토마토, 오이 등을 분포에 옮겨
심어 관리를 잘한다.

참의는 순자르기를 하여 주며, 수
박은 순자르기를 하지 않아도 무방
하나 좋은 과실을 얻기 위해서는
가지고르기 열매솎기 작업을 해준
다.

즉, 어미덩굴을 포함하여 충실한
3~4줄기를 남기고 모두 제거하여
1분당 1~2개의 수박을 착과시키는
것을 원칙으로 한다.

2. 마늘 양파밭 관리

○ 마늘, 양파밭에 물주기를 하여 수분부족으로 인한 마늘, 양파의 통이 잘 들지 않는 일이 없도록 하고, 고자리파리의 피해도 많은 시기이나 약제를 뿐만 방제한다.

특히 마늘은 남부지방에서는 이 달상순 중부지방에서는 중하순에 마늘쫑이 나오게 되므로 가급적 마늘쫑을 일찍 뽑아 주어야 통이 잘 된다.

특 작

1. 참깨 파종

○ 참깨는 5월 상순~5월 중순에 종자소독을 실시한 후 파종한다.

2. 들깨 파종

○ 단작인 경우 충부지방은 5월 상순에 파종하고 이식재배인 경우에는 5월 중순 남부지방은 5월 하순에 파종한다.

3. 아주까리

○ 싹이 나와 자라는대로 김매기를 5월 하순~6월 중순 사이에 2~3회 하는데 동시에 북을 주어 바람에 쓰러지지 않게 한다.

4. 목화

○ 파종후 발아가 고르지 못한 것

은 추파를 한다. 또한 김매기와 속아주기도 하는데 목화는 어린식물이 더디 자라고 병해를 비롯한 재해를 받기 쉬우므로 일시에 속아내지 말고 3~4차례에 걸쳐 속아주는 것이 좋다.

축 산

1. 소의 기종저 예방

○ 기종저와 탄저병은 소와 양에게 가장 큰 피해를 주는 전염성이 강한 법정전염병이므로 예방을 철저히 한다.

2. 돼지 일본뇌염 예방

○ 예방을 위해서는 작은 빨간집 모기가 돼지에 접근하지 못하게 하거나 일본뇌염백신을 빨간집모기가 옮기기 전인 5~6월에 접종시킨다.

3. 닭의 계두 예방

○ 계두병은 연중 발생하나 모기가 나오기 시작하는 5월부터 발생하여 여름철에 더욱 많이 발생하니 모기가 발생하기 전에 예방접종을 시킨다. 특히 부화후 6~8주경의 병아리에 많이 생기게 되니 6주 이상된 것은 반드시 접종한다.

<농진청 공보담당관실>

李 基 善