



성인병 예방 협회보에 실린 사진은 여성들이 건강을 위해 노력하는 모습을 보여줍니다. 이는 현대 사회에서 여성들이 직면하는 다양한 건강 문제를 예방하고 관리하는 데 중요한 역할을 합니다.

새로운 時代의 醫學으로서 成人病問題는 그 比重이 대단히 크며, 成人病中에서도 女性에 있어서는 更年期障害은 빼놓을수 없는 것이다. 특히 이에 대한 治療法의 選定은 現代婦人科醫로서의 臨床 技術의 바로미터가 된다고 한다. 最近의 更年期障害 특히 그의 治療에 대한 研究경향을 살펴보면 本症의 內分泌面을 중요시하는 경우에서는 호르몬療法을, 그리고 本症患者에서 불수있는 神經精神症狀에 특히 重點을 두는 경우에는 각종 神經安定劑요법을 力說하고 있다. 그러나 어느쪽이 더욱 効果的이며 우선 무엇부터 할 것인가 당설이게 된다. 更年期障害는 그 概念도 아직 막연하고 그 發生機轉도 대단히 複雜함으로 호르몬療法이나 기타 藥物療法도 또 精神安定劑의 投與도 필요하며 동시에 精神요법도 重要한 것이다 本症은 자칫하면 更年期障害라고 간단히 取扱하여 환자에게 內내를 主張하는 경우도 있고 患者도 역시 更年期이니까하고 자기마음대로 自己의 症狀를 풀이하는 경우도 있다. 更年期의 婦人에는 月經異常, 閉經, 更年期出血, 老人性腔炎, 骨疎鬆症, 疲勞感등의 內分泌障害가 直接原因이 되는 증상, 肥滿, 更年期糖尿等의 代謝異常이 원인이 되는 症狀 自律神經中樞障害症狀, 心因性症狀등의 不定愁訴症狀, 그리고 更年期精神病등의 증상이 나타난다. 그러나 大部分의 症狀, 또는 疾病에는 고유의 名稱이 붙어 있음으로 更年期에 나타나는 不定愁訴症狀에만 특정한 名稱이 없다. 따라서 「更年期에 나타나는 不定愁訴를 주로 하는 症候群을 更年期障害」라고 고도 할수있다. 이와같이 更年期障害의 定義도 사람에 따라서 다르므로 治療法도 일정하지 않은것이 當然하다.

여성更年期障害


診斷과 治療대책

自律神經調整 療法

이것은 自律神經의 失調가 原因이 되어서 나타나는 內分泌性 更年期障害의 效果가 있다.

一般藥物

① 프로카인 하이드로 크로라이드 0.5% 프로카인 하이드로 크로라이드 5/10cc를 普通靜脈注射의 약 5배정도의 시간간격을 띠서 대략 4~5회 정도 정맥주사한다. 1일 1회씩 5~6회씩 1코스로 한다. 이療法은 호르몬작용



榮 建 榮 大 醫 生 婦 人 科 專 門 醫 師

更年期障害는 中年期 이후 女性을 괴롭히는 重要한 成人病

그러나 心因性인것은 全更年期障害의 12.6%에 불과하다. 따라서 更年期障害라고 간단히 內分泌性 更年期障害로 생각하고 자율신경조정 요법을 시행하는것이 좋다. 그러나 心因性인것은 이러한 治療法으로 효과가 없다. 心因性更年期障害의 對한 藥物療法은 주로 精神安定劑를 위시하고 向精神藥의 사용이나 이러한 藥物을 간단히 기계적으로 투여하는 것만으로는 거의 效果가 없다. 이 경우는 一時的인 心因性인 浮動性인 早期에 對한 治療法을 併用하는 것이 좋다. 心身兩面의 治療法으로서 心身醫學의 治療法의 效果가 기대된다.

不定愁訴주요하는 症候群으로 各種障害일어켜

月經異常과 閉經·出血·老人性腔炎으로 疲勞感 심해 治療는 症狀 따라 호르몬製劑·神經安定劑 등 藥物療法

이 전연없으나 에스트로겐은 精神의 效果가 있다. 특히 腰痛이나 下腹痛에는 3% 프로카인 하이드로크로라이드 1~2cc를 靜脈注射의 投與시키는 方法이 효과적이다. 自律神經調整劑=Tetraethylammonium Bromide가 많이 사용되는데 1일 1회 100mg씩 日間 投與한다. 이 이외에 外國에서는 비타민을 투여하기도 사용된다. <호르몬제> Estrogen-Estradiol. 2mg를 1회 주사하되 5~6회를 1 course라 한다. 結合型 estrogen premarin 0.9mg 2.5mg를 1日量으로 하여 2~3주간 내복시킨다. Estriol hemisuccinate

心身醫學的 療法

患者를 心身兩面에서 治療하는 것을 心身醫學的 療法이라고 부른다. 우선 적절한 向精神藥을 사용하여 患者의 精神을 안정시키고, 心身醫學的 療法의 效果를 높인다. 그러나 心身醫學的 療法의 效果는 治療法에 따라 다르다. 向精神藥은 精神安定劑, 精神興奮劑, 精神調整劑 등으로 나뉘는데, 각각의 藥의 作用을 잘 이해하고, 患者의 精神 상태를 잘 관찰하여 적절한 藥을 사용하여야 한다. 向精神藥의 投與는 精神安定劑, 精神興奮劑, 精神調整劑 등으로 나뉘는데, 각각의 藥의 作用을 잘 이해하고, 患者의 精神 상태를 잘 관찰하여 적절한 藥을 사용하여야 한다.

뇌순환장애 및 뇌졸중 예방·치료제 - 사미온 정·주사

사미온(Nicergoline)은 Farmitalia Carlo Erba사가 개발한 뇌혈행·대사개선펙제로서 뇌혈전, 뇌색전, 뇌동맥경화증에 의한 뇌순환장애 및 뇌졸중으로 인한 두통, 현훈, 반신불수, 이명, 언어장애(눌어짐), 시력장애, 집중력감퇴, 기억력상실, 운동장애 등 제증상에 탁월한 효과를 발휘합니다. <약리작용> □ 혈형개선작용 사미온은 일반 혈관확장제와는 달리 아드레날린의 수용체차단, 혈관대사 촉진에 의한 혈관의 탄력성증가, 혈류의 저항을 감소시킴으로써 뇌 및 말초혈행을 원활하게 합니다. 특히 허혈(虛血) 부위의 혈행을 현저히 증가시킵니다. □ 뇌대사촉진작용 사미온은 뇌혈관 및 뇌세포 내의 O₂ 및 glucose의 이용을 증가시켜 호기성(好氣性) 뇌대사를 원활하게 함으로써 뇌의 정상기능을 회복·유지시킵니다. □ 항혈전작용 사미온은 혈관내의 혈소판응집을 저해합니다. 따라서 뇌혈관내 혈소판응집에 의한 뇌혈전, 뇌색전 등 뇌졸중



중(中風) 증상이나 일과성 허혈(虛血) 등 각종 뇌혈관질환과 노인병을 예방치료할 수 있습니다. <효능> ○ 급·만성뇌혈관 및 말초혈관대사성질환(뇌혈전증, 뇌색전증, 각종 형태로 나타나는 뇌동맥경화증에 기인한 질환). ○ 사지의 폐색성동맥질환, 레이노드씨증후군, 기타 말초혈관에 기인한 제증후군. ○ 노인성동맥경화성두통. ○ 동맥성고혈압의 보조요법. <포장> ○ 정제 30정 : 표시가 13,000원. 100정 : 표시가 32,000원. ○ 주사(완제수입품) 4바이알 : 표시가 9,900원. <일동제약주식회사>