

### 病變이 얼굴등 몸전체로 퍼지면 보기 흉하고, 가을·겨울에 惡化

# 乾癬

## 診斷과治療



許 沅

가톨릭醫科大學 皮膚科과장·醫博

건선은 은백색의 비늘 (鱗屑)로 덮여있는 흉반성... 구반 (汗斑·타지)이 다량... 한 크기로 머리, 팔꿈치, 무릎 등에 주로 나타나는데... 부질환이다. 병의 진행은 가을·겨울에 악화되고 봄이 되면 호전된다. 병의 진행은 가을·겨울에 악화되고 봄이 되면 호전된다. 병의 진행은 가을·겨울에 악화되고 봄이 되면 호전된다.

과 각종 환경의 자극 및 세균감염 등이 이질환을 발생케 하고 악화시킨다는 것은 잘 알려져 있다. 세균감염과 관련된 기관... 건선은 보통 연쇄상구균에 의한 편도선염 및 기관지염을 앓고 난 후 볼방울 모양의 흉반성 구균이 전신에 나... 탁담으로 瀰狀건선이라 하며 이는 소아와 청년기에 흔히 나... 란다. 건선은 합병증이 없는 한 생명에는 큰 영향을 주지 않... 고 또한 남에게 전염시키지도 않는다. 환부가 몸 전체에 퍼... 지고 있으면 보기 흉한 것 뿐이다. 이질환은 계절적으로 여... 료의 좋아지고 가을·겨울에는 악화되는 것이 보통이다.

豫防 肥滿한體重중이 고沐浴時 자극 주어皮膚에傷處나지 않도록

건선의 구조적 변화는 표피가 과각화된 결과로 볼 수 있다. 건선의 병변은 주로 손바닥과 발바닥에 나타나는데... 건선의 병변은 주로 손바닥과 발바닥에 나타나는데... 건선의 병변은 주로 손바닥과 발바닥에 나타나는데...

건선의 병변은 주로 손바닥과 발바닥에 나타나는데... 건선의 병변은 주로 손바닥과 발바닥에 나타나는데... 건선의 병변은 주로 손바닥과 발바닥에 나타나는데...




1. 부신피질 호르몬 (스테로이드) 제제의 사용  
이들의 약제인 염화코르티솔은 전신 투여로 효과를 보지 않는 한 입시제로 투여하는 것이 좋다. 부신 호르몬을 투여할 때는 부작용을 주의하여 지켜야 하며, 고혈압, 당뇨병, 위궤양 등의 질환이 있을 때 사용해서는 안 된다.

2. 국소용 스테로이드 제제  
발진 부위가 전체 피부면적의 30% 이하일 때 사용된다. 그러나 30% 이상일 때는 전체 피부면적에 걸쳐 광범위하게 사용할 경우 부작용을 일으킬 수 있으므로 주의해야 한다.

3. 항암제  
Methotrexate와 같은 항암제를 사용하는 것은 치료 효과가 높지만, 소화기 장애, 식욕 부진, 구토 등의 부작용이 있을 수 있으므로 주의해야 한다.

4. 자외선 조사법  
과제에 tar를 병변의 바로 위에 조사하는 UVB를 조사하는 방법으로서 효과가 높고, tar를 병변에 바르는 방법보다 안전하고 부작용이 적다. 자외선 조사 (UVA)를 조사하는 방법도 있으나, UVB가 더 효과적이다.

副腎皮質 호르몬製劑 再發·肥滿症등副作用 우려, 특수病巢경우만 投與 스테로이드 製劑경우  
病變部位가全體皮膚면적의 30%이하일 때만使用  
紫外線조사 광범위한病變·스테로이드製劑로治療안될때效果 抗癩劑경우  
肝機能·血液·소변검사身體異常과약후 使用해야



- 적용중: 건선, 접촉성피부염, 신경성피부염, 편평태선, 습진, 습진성피부염, 지루성피부염, 일광피부염, 할문·성기 및 노인성 소양증
- 가격: 5g: 800원, 15g: 2000원, 250g: 25000 원은 약사에게 진료는 의사에게

