



농 시

□ 물관리

○벼는 이삭이 팬후 30일경까지 물을 필요로 하므로 완전물떼기는 이삭팬후 30~35일경에 한다.

○완전물떼배까지는 계속 물걸터 대기를 하여 벼뿌리의 활력을 도와 주도록 하고 찬물이 썩는 논은 논 뒷갈개를 잘 만들어 찬물이 직접 논에 들어가지 않도록 한다.

○9월중에는 간혹 태풍으로 큰 피해를 입게되는 일이 있으므로 이때에는 물을 깊게 대어 쓰러짐을 막고 기상이 회복되면 배수하여 정상적인 물관리를 한다.

□ 채종답 관리

채종단지는 물론 각 농가에서 종자를 받을 논은 한포기의 피나 형질이 다른 잡이삭이나 또는 다른 품종의 포기가 없도록 철저히 뽑아내어 순도높은 종자를 채종한다.

□ 병해충 방제

○남부지역은 이달 초순까지 만생중의 이삭이 나오므로 반드시 도열병약을 살포하여 이삭도열병을 막는다.

○벼멸구와 흑명나방도 계속 예찰을 철저히 하여 방제에 힘쓰도록 한다.

밭 농사

□ 밀·보리

○종자는 정부보종종자 또는 시범단지산 신품종으로 미리 준비하도록 한다.

○종자가 준비되는 대로 종자전염을 예방하기 위한 종자소독을 실시한다.

○중북부지방의 밀과종 적기는 9월 15일부터, 보리는 9월 20일부터 시작되므로 적기에 파종하고, 특히 산간지에서는 월동전에 적정일수 5~6매를 확보하여 월동에 지장이 없도록 적기에 파종한다.

□ 옥수수 수확

○옥수수는 암술이 나온후 50~55일경 껍질이 누렇게 변하고 알이 단단하게 익었을 때 수확한다.

○알은 건조대에서 잘 말려 탈곡하고 옥수수대는 엔시레지나 퇴비를 만든다.

□ 콩 병해충방제와 수확

○콩에 가장 큰 피해를 주는 해충은 콩나방등으로 9월 상순에 방제하지 않을 때는 많은 수량감소를 초래하게 되므로 예찰을 철저히하여 방

제에 임한다.

○콩수확은 콩잎이 누렇게 변하여 떨어지고 꼬투리와 콩알이 80%정도 변하면 더이상 여물지 않고 수분만 마르므로 이때에 일찍 수확하도록 한다.

□ 고구마 수확

○수확시기는 지역에 따라 다르나 중북부지방은 9월하순~10월상순, 남부지방은 10월상·중순경이나 첫 서리가 내리기 전에 수확을 끝마친다.

○수확은 되도록 상처가 나지 않게 해야하며 수확한 고구마는 본저장에 들어가기전 10~15일정도 바람이 잘 통하고 햇볕이 들지않는 그늘진곳에 저장했다가 본저장하도록 한다.

채 소

□ 가을무우·배추

○무우는 남부지방에서 9월 상순까지 파종을 완료하고 파종기를 놓쳤을 때는 조생종을 선택하여 파종한다.

○육묘재배한 배추는 본잎이 6~7매일때 정식하도록 한다.

○포트육묘의 경우 심기 2~3시간 전에 충분히 물을 주어 모를 옮길때

흙이 부서지지 않게하고 상처가 없도록 한다.

○웃거름은 아주심기(또는 파종) 후 15일간격으로 3회가량 나누어 준다.

□ 고추밭 관리

○배수로를 철저히 설치하여 비올 때 습해가 없도록하고 영양이 부족할.포장이나 습해를 받은 밭은 요소 0.2~0.5%액을 엽면시비하여 세력을 돕는다.

○서리오기 2주전에는 에스펠 8백 배액을 3백평당 90~100ℓ 정도 살포하여 붉은고추의 수량을 높인다.

□ 마늘파종

씨마늘은 반드시 소독하여 파종하고 약제소독 방법은 종자소독약 수화제 2호 200배액에 30~60분간 담근후 꺼내어 맑은 물로 씻는다.



□ 봉지벗기기

봉지를 씌운 과실은 봉지를 벗겨 주어 착색이 잘 되도록 한다. 봉지를 벗기는 시기(사과)의 육·फल떨리시는 수확 10~15일전, 홍옥·딜리셔스계·인도는 수확 20~30일전

에 실시한다.

□ 거름주기

가을거름은 양분의 쌓임을 좋게하여 겨울동안 동해에 견디는 힘을 길러주고 다음해 초기생육과 꽃피어 열매맺음을 좋게한다.

시비량은 조생종 사과는 수확직후에 연간 거름량의 질소 10~20%를 주고 배 단생종은 수확직후에 연간 시비량의 질소 10~15%, 칼리 20%를 주도록 하며 부숭아는 수확후연간 거름량의 질소 20%를 준다.

□ 병해충 방제

○사과 : 부란병, 반점낙엽병, 갈반병, 심식충, 응애류 등

○배 : 흑성병, 흑반병, 깍지벌레류, 심식충 등

○부숭아 : 세균성구멍병, 부숭아유리나방, 응애류 등

○포도 : 만부병, 흑두병, 갈반병, 유리나방 등



□ 들깨수확

○9월하순~10월상순에 들기와 앞이 누렇게 되고 그루를 건드리면 종자가 떨어질때 수확한다.