



6월의 농사메모

1. 벼 농 사

가. 모내기

1모작 논은 중북부지방은 6월5일·남부지방은 9월10일까지, 2모작 논은 중북부지방은 9월20일, 남부지방은 6월 25일 안에 마친다.

6월상·중순에 모낼 때는 한포기당 모수를 4본 정도로 3.3m²당 80~85주로 심고 모를 낼 때에는 논을 잘고 른후 물을 1~2cm 정도로 낮게 대고 모끝을 맞춰서 2~3cm 정도 얇게 심는다. 모낸 후에는 약 1주일동안 논물을 모키의 절반정도까지 깊게 대어서 모일이 시드는 것을 막고 뿌리

내림을 촉진시켜준다.

나. 거름주기

산흙을 개토한는, 경지정리할때 생 땅이 나온는, 간척논 등은 질소질비료를 기준보다 20~30% 더 주고 걸찬는, 가뭄으로 봄기간 동안 논바닥이 바싹 마른 논등은 덜 주도록 한다.

새끼칠거름은 1모작논에만 주고 2모작논은 새끼칠거름양을 밑거름에 포함시켜 주고 새끼칠거름은 주지 않도록 한다.

다. 병해충 방제

잎도열병·흰빛잎마름병·애멸구·벼잎벌레·이화명충 1화기등 방제에

철저를 기한다.

2. 밭 농 사

가. 밀·보리수확

보리는 출수후 35일, 밀은 40일경이 수확적기이다. 특히 이달은 밀보리수확과 벼이앙등이 겹치게되니 적기수확을 하도록 한다.

논보리의 경우는 대부분 조생종을 재배하므로 출수후 30일경에 수확해도 소출이 크게 떨어지지 않으므로 조기수확 하도록 한다.

나. 맥후작 고구마심기

고구마도 싹을 늦게 심으면 소출이 떨어지니 서둘러 심고 거름주는는 퇴비와 가리질거름을 많이 주는 것이 좋다.

다. 옥수수 웃거름주기

옥수수 웃거름은 2회로 나누어 1차는 본잎이 6~7장 나왔을때 주고 2차는 본잎이 9~10장 나왔을 때 주는 것이 적기로서 6월중하순에 심은 옥수수는 6월중에 웃거름주는 시기이므로 제때에 주도록 하며 6월하순에는 조명나방 1회기 방제에 힘쓴다.

3. 축 산

가. 젖 소

젖소가 적응하는 기온의 폭은 넓

어서 건강하고 영양이 좋을 경우 적당한 온도는 10~20°C이며 26°C이상이면 젖량이 적어지게 된다.

젖소에 피부손질은 하루에 1~2회씩 10~20분간 쇠솔·털솔등으로 빗겨주어 피부와 털에 붙어있는 오물을 제거하고 혈액순환을 좋게하여 준다.

나. 한 우

살찌우는 소에게 생물을 먹이면 식욕이 촉진되고 요결석증을 예방할 수 있으나 너무 많이 먹이면 살이 잘 안찌고 고기의 질도 나빠지므로 하루에 5kg 정도만 준다.

다. 닭

더위로 인하여 산란율이 떨어지는 것에 대비하여 제사내가 시원하도록 창문등을 열어주고 시원한 물을 마음대로 먹을 수 있도록 한다.

더위때문에 사료섭취량이 점차 감소되므로 질이 좋고 기호성에 맞는 사료를 먹인다.

4. 채 소

가. 고추밭관리

아주심기(정식)한후 20일 간격으로 웃거름을 주며 비닐을 멀칭재배한 밭은 비닐에 구멍을 뚫거나 걸어 올려 비료를 준다. 그리고 담배나방 방제에 철저를 기한다.

나. 오이관리

토양수분이 건조되지 않도록 물주기를 한다. 물대주기는 토성에 따라 다르나 사질토는 가뭄이 잘 타므로 특히 물을 자주 대주어야 하며 짙이나 퇴비등을 갈아주면 효과적이다.

오이·참외·수박 등 병해충이 본격적으로 발생하게 되니 예방에 힘쓰도록 한다. 오이류의 노균병은 비료분이 부족할 때에 발병하기 쉬우므로 비료분이 떨어지지 않도록 알맞게 웃거름을 준다.

다. 마늘수확

마늘의 수확적기는 대체로 남부 지방에서 재배하는 난지형마늘이 6월중순이고 내륙지방의 한지형은 6월 하순경이다.

5. 과 수

가. 사과

사과의 잎과 과일을 침해하는 탄저병·반점낙엽병·갈반병·응애류 잎말이나방·심식충류등 사과에 치명적인 피해를 주는 병해충들이 본격적으로 발생하니 약제살포를 철저히 하도록 한다.

나. 배

배나무 여름전정은 반드시 필요

하지 앞이나 뺨(뺨뺨한)가지는 슈아서 통풍과 채광을 좋게 하기 위하여 웃자람가지를 미리 제거하거나 유인하여 결과지로 이용한다.

흑반병·흑성병·배명나방·각지벌레·진딧물등의 발생이 많게되니 피해를 받기전에 살균제와 살충제를 자주 살포하도록 한다.

다. 복숭아

생리적으로 낙과를 유발하기 쉬운 때이므로 중생종, 만생종은 질소와 칼리질비료를 이달 상순까지 주고 열매숙기를 아직 끝내지 않은 곳은 속히 끝낸다.

라. 포도

흑두병·탄저병·갈반병·쌍점매미충·포도유리나방등이 발생하는 시기이니 약제살포를 철저히 한다.

6. 특 작

들깨의 심는 거리는 이랑나비 60cm, 포기 사이 20cm되게 두줄로 심는다.

본밭에 이식한지 2~3일 지나면 결주를 보식하고 2주일후, 중경제초를 한다. 유채의 수확시기는 개화후 60일, 꽃이 떨어진 후 30일로서 이달 상순이다.