



9월의 농가 메모

농 사

◇ 물관리

○벼는 이삭이 팼후 30일경까지 물을 필요로 함으로 완전물떼기는 이삭이 팼후 30~35일경에 한다.

○너무 늦게 물을 빼면 벼베기작업이나 벼 뒷구루작물 파종작업에 지장이 있으므로 실제로는 논에 따라 물빠짐이 나쁜 고온은 기준보다 조금 일찍 물을 빼고 물이 잘 빠지는 시루논은 조금 늦게 빼도록 한다

○완전물떼때까지는 계속 물결러 대기를 하여 벼뿌리의 활력을 도와 주도록하고 찬물이 썸썸하는 논은 논 뒷갈개를 잘 만들어 찬물이 직접 논에 들어가지 않도록 한다.

○9월중에는 간혹 태풍으로 큰 피해를 입게되는 일이 있으므로 이때에는 물을 깊게 대어 쓰러짐을 막고 기상이 회복되면 배수하여 정상적인 물관리를 한다.

◇ 벼베기와 말리기

○벼는 출수후 적산온도가 섭씨 9백50도가 되는 때가 완숙기로 외관

상으로 보아 벼알의 90% 이상이 누렇게 변하고 10% 정도가 약간 푸른색을 띠고 있는 때가 수확적이다. 신품종은 이삭이 푸른 잎속에 속여 있어 판단이 어려우므로 이삭팬일수를 기준으로 조생종은 40일전후, 중생종은 45일전후, 만생종은 50~55일에 수확한다.

○베베는 15~16포기를 한단으로 작게 묶어 제자리 또는 논둑에 세워 말린다.

○벼를 논바닥에 깔아 말리는 농가가 많은데 논바닥에 습기가 있거나 비가 오는 경우 급간 쌀이 많아져서 손해가 크므로 반드시 세워 말린다.

○벼를 베어서 세워놓고 즉시 비닐을 씌우는 경우도 많은데 이 방법은 미질도 나쁘고 더디 마르므로 4~5일간 말린 후에 비가 올 염려가 있을 때만 덮어주도록 한다.

◇ 병해충 방제

○남부지역은 만생종이 이달 초순까지 이삭이 나오므로 반드시 도열병약을 살포하여 이삭도열병을 막는다.

○벼멸구와 흑명나방도 계속 철저히 예찰하여 방제하도록 한다.

발 농 사

◇ 밀·보리파종

○종자준비 : 종자는 정부보증종자 또는 시범단지산 신품종으로 미리 준비해둔다.

○종자소독 : 종자가 준비되면 종자로 옮겨지는 병을 막기위한 종자소독을 실시하는데 종자소독약으로는 카보람분제(비타지람)가 있다.

◇파종 : 중북부 지방의 파종 적기가 밀은 9월15일부터 보리는 9월20일부터 시작되므로 적기에 파종하고 특히 산간지에서는 월동전에 적정인수 5~6매를 확보하여 월동에 지장이 없도록 적기에 파종한다.

◇ 옥수수 수확

○옥수수는 암술이 나온후 50~55일경 껍질이 누렇게 변하고 알이 단단하게 익었을 때 수확한다.

알은 건조대에서 잘말려 탈곡하고 옥수수매는 엔시페지나 퇴비를 만든다.

◇ 콩·병충해방제와 수확

○콩에 가장 큰 피해를 주는 해충

은 콩나방등으로 9월 상순에 방제하지 않을 때는 많은 수량감수를 가져오게 되니 예찰을 철저히하여 방제토록 한다.

○콩수확은 콩잎이 누렇게 변하여 떨어지고 꼬투리와 콩알이 80%정도 변하면 더이상 여물지 않고 수분만 마르므로 이때에 일찍 수확을 하고 밀·보리 파종을 한다.

◇ 고구마 수확

○수확시기는 지역에 따라 다르나 중북부 지방은 9월하순~10월상순, 남부지방은 10월 상·중순경이나 첫서리가 내리기 전에 수확을 끝 마친다.

○수확은 되도록 상처가 나지 않게 해야하며 수확한 고구마는 본 저장에 들어가기전 10~11일정도 바람이 잘 통하고 햇볕이 들지않는 그늘진 곳에서 가져장을 한후 본 저장을 한다.

채 소

◇ 가을무우·배추재배

○무우는 남부지방에서 9월상순까지 파종을 완료하고 파종기를 놓쳤을 때는 조생종을 선택 파종한다.

○육묘재배한 배추는 본잎이 6~7매 되면 정식한다.

○포트육묘의 경우 심기 2~3시간 전에 충분히 물을 주어 옮길때 흙이 부서지지 않도록 하고 상처를 없도록 한다.

○웃거름은 아주심기(또는 파종) 후 15일간격으로 3회가량 나눠준다.

◇ 고추밭 관리

○배수로를 철저히 설치하여 비올 때 습해가 없도록하고 영양이 부족한 포장이나 습해를 받은 밭은 요소 0.2~0.5%액을 엽면시비한다.

○서리오기 2주전에는 에스텔 8배액을 3백평당 90~100%정도 살포하여 붉은 고추의 수량을 높인다.

과 수

◇ 봉지벗기기

○봉지를 씌운 과실은 봉지를 벗겨주어 착색이 잘 되도록 한다.

○봉지벗기는 시기는 사과와 육딜리셔스는 수확 10~15일전, 홍육딜리셔스계 인도는 수확 20~30일전에 한다.