

出血 腦


氣道막혀 窒息死하는 경우 가장 많아 應急處置 강구
腦浮腫동반하면 腦壓높아져 出血量 많아 腦壓防止도
出血量 많을 때 血腫除去術 신속施行해야

뇌출혈의 원인은 뇌혈관벽의 약화나 혈압의 상승에 있다. 뇌혈관벽의 약화는 고혈압, 당뇨병, 동맥경화, 흡연, 과음, 노령 등에 의해 발생한다. 뇌출혈의 증상은 갑자기 나타나는 편측성 마비, 감각 장애, 언어 장애, 안구 돌출, 두통, 구토, 의식 장애 등이다. 뇌출혈의 진단은 CT나 MRI를 이용하여 정확히 진단할 수 있다. 치료는 뇌압을 낮추고, 출혈을 멈추고, 뇌손상을 줄이는 데 중점을 둔다.

뇌출혈의 응급처치법
 뇌출혈이 의심되면 즉시 병원으로 이송해야 한다. 응급처치로는 머리를 고정시키고, 구토를 방지하며, 호흡을 유지하는 것이 중요하다. 의사는 뇌압을 낮추고, 출혈을 멈추고, 뇌손상을 줄이는 데 중점을 둔다.

뇌출혈의 응급처치법
 뇌출혈이 의심되면 즉시 병원으로 이송해야 한다. 응급처치로는 머리를 고정시키고, 구토를 방지하며, 호흡을 유지하는 것이 중요하다. 의사는 뇌압을 낮추고, 출혈을 멈추고, 뇌손상을 줄이는 데 중점을 둔다.

뇌출혈의 응급처치법
 뇌출혈이 의심되면 즉시 병원으로 이송해야 한다. 응급처치로는 머리를 고정시키고, 구토를 방지하며, 호흡을 유지하는 것이 중요하다. 의사는 뇌압을 낮추고, 출혈을 멈추고, 뇌손상을 줄이는 데 중점을 둔다.




뇌출혈의 응급처치법
 뇌출혈이 의심되면 즉시 병원으로 이송해야 한다. 응급처치로는 머리를 고정시키고, 구토를 방지하며, 호흡을 유지하는 것이 중요하다. 의사는 뇌압을 낮추고, 출혈을 멈추고, 뇌손상을 줄이는 데 중점을 둔다.

뇌출혈의 응급처치법
 뇌출혈이 의심되면 즉시 병원으로 이송해야 한다. 응급처치로는 머리를 고정시키고, 구토를 방지하며, 호흡을 유지하는 것이 중요하다. 의사는 뇌압을 낮추고, 출혈을 멈추고, 뇌손상을 줄이는 데 중점을 둔다.

뇌출혈의 응급처치법
 뇌출혈이 의심되면 즉시 병원으로 이송해야 한다. 응급처치로는 머리를 고정시키고, 구토를 방지하며, 호흡을 유지하는 것이 중요하다. 의사는 뇌압을 낮추고, 출혈을 멈추고, 뇌손상을 줄이는 데 중점을 둔다.

뇌출혈의 응급처치법
 뇌출혈이 의심되면 즉시 병원으로 이송해야 한다. 응급처치로는 머리를 고정시키고, 구토를 방지하며, 호흡을 유지하는 것이 중요하다. 의사는 뇌압을 낮추고, 출혈을 멈추고, 뇌손상을 줄이는 데 중점을 둔다.



沈 輔 星
 (서울醫大神經外科 교수·醫博)

成人病중 死亡率가장 높다. 그 予防과 外科的治療對策은...

腦動脈瘤破裂 확인되면 外科的治療 신속히施行
死亡率 높아 再破裂방지하는 豫防對策도

血栓除去術 腦動脈과側頭 喉頭동맥吻合術 효과
커다란 血管의 塞栓은 顯微鏡이용하여 除去해야

뇌출혈의 응급처치법
 뇌출혈이 의심되면 즉시 병원으로 이송해야 한다. 응급처치로는 머리를 고정시키고, 구토를 방지하며, 호흡을 유지하는 것이 중요하다. 의사는 뇌압을 낮추고, 출혈을 멈추고, 뇌손상을 줄이는 데 중점을 둔다.

뇌순환장애 및 뇌졸중 예방·치료제—사미온 정·주사

사미온(Nicergoline)은 Farmitalia Carlo Erba사가 개발한 뇌혈행·대사개선훈합제로서 뇌졸중, 뇌색전, 뇌동맥경화증에 의한 뇌순환장애 및 뇌졸중으로 인한 두통, 현훈, 반신불수, 이명, 언어장애(눌어줌), 시력장애, 집중력감퇴, 기억력상실, 운동장애 등 제증상에 탁월한 효과를 발휘합니다.

약리작용
 □ 혈형개선작용
 사미온은 일반 혈관확장제와는 달리 아드레날린의 수용체 차단, 혈관대사 촉진에 의한 혈관의 탄력성 증가, 혈류의 저항을 감소시킴으로써 뇌 및 말초혈행을 원활하게 합니다. 특히 허혈(虛血) 부위의 혈류를 현저히 증가시킵니다.
 □ 뇌대사촉진작용
 사미온은 뇌혈관 및 뇌세포 내의 O₂ 및 glucose의 이용을 증가시켜 호기성(好氣性) 뇌대사를 원활하게 함으로써 뇌의 정상기능을 회복·유지시킵니다.
 □ 항혈전작용
 사미온은 혈관내의 혈소판응집을 저해합니다. 따라서 뇌혈관내 혈소판응집에 의한 뇌졸중, 뇌색전 등 뇌졸



중(中風)증상이나 일과성 허혈(虛血) 등 각종 뇌혈관질환과 노인병을 예방·치료할 수 있습니다.

효능
 ○ 급·만성뇌혈관 및 말초혈관대사성질환(뇌졸중, 뇌색전, 각종 형태로 나타나는 뇌동맥경화증에 기인한 질환).
 ○ 사지의 폐색성동맥질환, 레이노드씨증후군, 기타 말초혈행에 기인한 제증후군.
 ○ 노인성동맥경화성두통.
 ○ 동맥성고혈압의 보조요법.

포장
 ○ 정제 42정 : 표시가 15,000 원
 100정 : 표시가 32,000 원.
 ○ 주사 (완제수입품)
 4바이알 : 표시가 9,900 원.

