

DISKING을 이용한 유치의 치아우식증 처치

유치의 치아우식증을 치료하는 한 방법으로 disking이 있다.

이 disking은 유치에 한해서 사용되며 너무 과도한 삭제는 피해야 한다. 과도한 삭제를 하면 치수 손상, 식편압입, chronic gingival irritation, arch space loss등이 야기될 수 있다.

이렇게 disking을 해주는 목적은 치아우식증이 없는 self-cleansing surface를 만들어 주고, 노출된 상아세관의 폐쇄를 향상시키기 위함이다.

유치열에서 disking으로 치아우식증을 치료할수 있는 경우는 다음과 같다.

- 1) 유치가 곧 탈락할 때.
- 2) 유전치의 인접면 우식증으로 인해 절단면 부위가 상실되었거나, undermining된 경우.

- 3) 아주 어리거나, 협조를 얻기 힘든 아동의 광범위한 앞은 우식증.
- 4) 제 2 유구치가 조기상실 되어 있고, 제 1 유구치의 원심면에 우식증이 있을때.
- 5) 수복물의 유지를 얻기 힘든 경우.

disking시 चा아를 flat하게 하는 것이 아니라 corncornical or flame-shaped diamond를 사용해서 협설측으로 round하게 grinding해 줌으로서 자정효과를 높여주어야 한다(그림).

노출된 표면은 2% sodium fluoride용액을 도포하여 타액의 calcium염 침착에 의한 rapid remineralization을 도모한다.

disking을 한 치아는 sensitivity의 변화가 있는지를 검사해 보아야 하며, 불소도포를 반복해 준다.




그림 : 유치의 disking은 self-cleansing area를 만들어 주는데 그 목적이 있다. 결국 치아는 proximo-buccal & proximo-lingual angle이 round하게 된다.

각종 CAVITRON수리 전문


- HELIOMAT
- HALOGEN LIGHT
- DURA FILL
- 교정용 WELDER
- PORCELAIN FURNACE

수리 전문  
(업자수리환영)

럭 키 電 子

朴 東 鎮

서울 · 중구 남대문로 5가 63-15 ☎ 778-8054



◇ 中古高價買入 ◇

