

상아질 과민증의 처치

4) Cavity Varnish(Copalite)

노출된 dentin tubule을 폐쇄시키는 임시방편으로 박리되면 효과를 상실하며, oral examination시 편 의상 이용한다.

5) Periodontal pack

동통이 심하여 food, fluid의 섭취가 곤란하여 심 신상의 문제를 야기할 경우 급성통증을 경감시키고 확실한 진단을 위해 이용한다.

*자가처치법은

주로 지각과민둔화제를 active ingredient로 포함 하는 toothpaste를 이용하여 내원치료를 받기전에 잠정적으로, 또는 확실한 진단이 이루어진후 사용 된다.

내원처치와 자가처치를 병행할때 효과를 증진시킬 수 있으므로 일반적인 경우, 다음의 처치순서가 추천된다.

① 내원시

Fluoride-containing prophylaxis paste를 이용한 oral prophylaxis를 행한후 33% NaF paste를 도포 연마해 준다.

② 자가처치로는

dcsensitization toothpaste를 해당부위에 도포한 후 방치해두고, 매일 0.05% NaF수용액으로 양치 를 하게한다.

또한 dental plaque은 지각과민증의 chemical stimulus의 역할을 하므로 철저한 oral hygiene이 계속 되어야 한다.

상 품 명	active ingredient	작 용 기 적
① Thermodent	1.4% Formaldehyde	dentin proteim의 침적
② Sensodyne	10% Strontium chloride	석회화 증진 및 filler에 의한 dentin tubule 폐쇄
③ Denquel	5% Potassium nitrate	dentin neurosensory unit에의 효과로 추측
④ Protect	2% dibasic sodium citrate +pluronic gel.	salivary, dentinal.protein의 침적 및 tubulc 폐쇄

서울특별시 인정 제12호

아세아치과기공소

ASIA DENTAL LABORATORY

대표 이 흥 규

서울 종로구 종로 5 가 115번지

☎ (763) 8559 · 7518