

第6章 外國의 社會改革運動

動의 內容

그리고 아래에서 살 사회改革運動의 성격과 내용에서이...

관과 협조하여 「正人心」 「厚風俗」의 활동을 전개하고 매년 정기적으로 「善人善行表彰大會」를 개최하여 「除濁揚清」의 효과를 거두고 있다.

이 위원회는 또한 전 체 국민의 생활개선운동에 모토로 내지 선동하는 동시에 국민생활의 합리화와 현대화를 위하여 활동하고 있다.

단기적인 民權講習을 해 민주주의의 기초를 확립함으로써 민주주의 사상을 함양케 한다.

다. 推進方法의 主要特徵 以上에서 소개한 바와 같은 中國의 社會改革運動을 효과적으로 추진하기 위하여 다음 과 같은 特徵的인 方法을 활용하고 있다.

法的으로 연구발전시킬 수 있도록 한다. 1. 國民生活須知와 決議에 의하여 民間人으로서 하여금 각종 업무와 社會의 主要한 社會運動을 전개하는 데에 社會運動을 주도하는 社會운동의 精神을 함양하도록 한다.

가 1. 性狀 山과 들의 그늘지고 습한 곳에 자생하는 여러해살이 풀이다. 겨울에는 잎이 다 소멸된다. 7월경 30cm 내외의 꽃대가 생기는 總狀花序로서 보라색의 향기로운 꽃이 핀다.

2. 栽培法 1. 栽培適地 氣候 土質을 가리지 않고 잘 자라며 이 작물의 自生 狀態를 보면 西北向의 陰濕地 또는 나무 그늘 밑에서 생육한다. 그러나 地上部만 무성하게 생육하며 藥用 部의 塊根이 많이 생기는 塊根이 많은 塊根을 수확하여 藥用으로 쓰인다.

3. 定植 定植 시기는 地方에 따라 다르겠으나 南部地方에서는 3월 중 下旬에서 4월 초에 정지한다. 해동 직후에 정지할 때는 비온 직후가 좋으나 기온이 10°C 이상일 때 정지하는 것이 좋다. 移植時 期에는 적당한 濕氣가 있는 시기이므로 定植 후 着根에 별 지장이 없다. 만약에 砂質 土에서 定植 후 1주일 후 이 지장이 있으면 砂土를 덧씌워 준다.

4. 一般管理 定植 후 수시로 중 경 除草을 해주되 작물 생육이 잘 되면 塊根의 크기에 영향을 준다.

5. 病蟲害 病蟲害는 별로 심하지 않으나 밀가루로 만든 배를 먹여 번식을 촉진하면 곰팡이가 생겨 뿌리를 해친다. 겨울에는 해마 시를 쳐서 해충을 예방한다.

3. 收穫調製 正植한 후 1년만에 수확하는 것이 보통이지만 3년만에 수확하는 것도 있다. 그러나 3년째 수확하는 것은 고령의 작물이므로 수확량이 적다. 收穫後 砂質土에서는 塊根이 잘 썩지 않고 있지만 粘土가 섞여 있으면 塊根이 썩어 버린다. 收穫後 1주일 동안 乾燥시켜서 10°C 이하의 온도에서 30일 정도 건조시킨다.

淨化特輯

社會淨化운동의 理念과 方向

○... 「續」 이상에서 언급한 바와 같이 중... ○... 國의 사회운동의 이념은 바로 倫理... ○... 民主, 科學에 근거하고 있으며, 이는... ○... 곧 三民主義의 본질이기도 하다.

있도록 되어 있다. 위원은 각급 研究所에서 理論的인 研究를 하며 行政的인 政策을 추진하는 데에 積極的인 役割을 담당한다. 또한 각종 國民運動을 추진함에 있어서 推進行委員會가 積極的인 役割을 담당한다.

1. 栽培適地 氣候 土質을 가리지 않고 잘 자라며 이 작물의 自生 狀態를 보면 西北向의 陰濕地 또는 나무 그늘 밑에서 생육한다. 그러나 地上部만 무성하게 생육하며 藥用 部의 塊根이 많이 생기는 塊根이 많은 塊根을 수확하여 藥用으로 쓰인다.

2. 栽培法 1. 栽培適地 氣候 土質을 가리지 않고 잘 자라며 이 작물의 自生 狀態를 보면 西北向의 陰濕地 또는 나무 그늘 밑에서 생육한다. 그러나 地上部만 무성하게 생육하며 藥用 部의 塊根이 많이 생기는 塊根이 많은 塊根을 수확하여 藥用으로 쓰인다.

3. 定植 定植 시기는 地方에 따라 다르겠으나 南部地方에서는 3월 중 下旬에서 4월 초에 정지한다. 해동 직후에 정지할 때는 비온 직후가 좋으나 기온이 10°C 이상일 때 정지하는 것이 좋다. 移植時 期에는 적당한 濕氣가 있는 시기이므로 定植 후 着根에 별 지장이 없다. 만약에 砂質 土에서 定植 후 1주일 후 이 지장이 있으면 砂土를 덧씌워 준다.

4. 一般管理 定植 후 수시로 중 경 除草을 해주되 작물 생육이 잘 되면 塊根의 크기에 영향을 준다.

5. 病蟲害 病蟲害는 별로 심하지 않으나 밀가루로 만든 배를 먹여 번식을 촉진하면 곰팡이가 생겨 뿌리를 해친다. 겨울에는 해마 시를 쳐서 해충을 예방한다.

3. 收穫調製 正植한 후 1년만에 수확하는 것이 보통이지만 3년만에 수확하는 것도 있다. 그러나 3년째 수확하는 것은 고령의 작물이므로 수확량이 적다. 收穫後 砂質土에서는 塊根이 잘 썩지 않고 있지만 粘土가 섞여 있으면 塊根이 썩어 버린다. 收穫後 1주일 동안 乾燥시켜서 10°C 이하의 온도에서 30일 정도 건조시킨다.



麥門冬

1. 栽培適地 氣候 土質을 가리지 않고 잘 자라며 이 작물의 自生 狀態를 보면 西北向의 陰濕地 또는 나무 그늘 밑에서 생육한다. 그러나 地上部만 무성하게 생육하며 藥用 部의 塊根이 많이 생기는 塊根이 많은 塊根을 수확하여 藥用으로 쓰인다.

Table with 4 columns: 肥料種類, 前, 量, 畝別. Rows include 800kg, 200, 200, 600.

1. 栽培適地 氣候 土質을 가리지 않고 잘 자라며 이 작물의 自生 狀態를 보면 西北向의 陰濕地 또는 나무 그늘 밑에서 생육한다. 그러나 地上部만 무성하게 생육하며 藥用 部의 塊根이 많이 생기는 塊根이 많은 塊根을 수확하여 藥用으로 쓰인다.

2. 栽培法 1. 栽培適地 氣候 土質을 가리지 않고 잘 자라며 이 작물의 自生 狀態를 보면 西北向의 陰濕地 또는 나무 그늘 밑에서 생육한다. 그러나 地上部만 무성하게 생육하며 藥用 部의 塊根이 많이 생기는 塊根이 많은 塊根을 수확하여 藥用으로 쓰인다.

獨活 (獨活)

1. 栽培適地 氣候 土質을 가리지 않고 잘 자라며 이 작물의 自生 狀態를 보면 西北向의 陰濕地 또는 나무 그늘 밑에서 생육한다. 그러나 地上部만 무성하게 생육하며 藥用 部의 塊根이 많이 생기는 塊根이 많은 塊根을 수확하여 藥用으로 쓰인다.

自然生採取 (蔓蓼)

1. 栽培適地 氣候 土質을 가리지 않고 잘 자라며 이 작물의 自生 狀態를 보면 西北向의 陰濕地 또는 나무 그늘 밑에서 생육한다. 그러나 地上部만 무성하게 생육하며 藥用 部의 塊根이 많이 생기는 塊根이 많은 塊根을 수확하여 藥用으로 쓰인다.