

醫宗說約方解

孟 華 變*

抱龍丸(醫宗說約方)

- 小兒의 急驚癇癇, 痰涎壅盛 胎驚內甲 咳嗽喘急 搐搦驚悸 等症을 治한다.
- 天竺黃五戈 辰砂二戈 牛膽南星一兩 明雄黃一戈 麝香一分半 以上藥을 極細末하고 別途로 麻黃 款冬花 甘草 各五戈을 濃煎하여 去渣하고 慢火로 熬成膏하여, 以上 末藥을 入하여 爲丸하되 芡實大로 하여 每服一丸式 薄荷湯에 化下한다.
- 示吉은 曰 鎮驚精痰하고 安神閉竅함은 製抱龍之旨也나 然이나 恐·病輕藥重하면 朱研雄黃은 則過於墜鎮하고 而麝香은 更有引驚入竅之弊하니 故로 古人이 有·不可輕用之說이나 今·此方之妙는 佐之以芡의 麝香이 得·麻黃之辛散하여 竅內之驚이 蓋出하고 雄黃朱砂가 得·甘草之和緩하여 墜鎮之性을 和平케 하며 膽星天竺·而 佐款冬으로 清痰潤肺하나니 肺潤則氣降하고, 氣降則痰下하며 痰下則驚平하여 咳嗽痰喘은 不治而悉愈니라.
- 此方은 若與古人으로 同이나 則 其効는 勝于古人으로 遠矣니 非得岐黃之秘者면 斷不知此니라. 此方은 爲欽元讓家秘로 活人이 無算이라. 予求之數年에 妙得同志者하니 勿易觀之하라.
- ### 通神散(醫宗說約方)
- 外成風寒 內傷飲食 頭疼發熱, 咳嗽痰喘 鼻

塞聲電, 驚悸 口乾煩渴 胞滿不食으로 凡有表症者를 主治한다. 癰痢邪起者도 亦宜니라.

○ 薄荷 羌活 葛根 黃蓮 牛膽南星 板榔 陳皮 各一兩 枳實款炒 厚朴薑炒 神麴炒 麥芽炒 各七戈 川芎 甘草 各三戈 共爲細末한다. 黑糖拌하여 濃煎生薑湯으로 送下한다.

週歲內者는 五分, 週歲外者는 七分, 二週者는 一戈. 量兒大小하여 酌用한다. 痢에는 薑細茶 各二戈煎湯으로 送下한다.

沈香末子(醫宗說約方)

乳食傷脾胃 以致嘔吐瀉泄 痢疾 瘧疾 心腹疼痛 大便下血 寒熱不止 凡燕 胸腹脹滿 噯氣作酸 惡心 惡聞食氣 及 不思食 下拽臭屁 上症不必客具, 凡見一二, 定爲傷食, 此方主之

○ 香附鹽水拌炒 厚朴薑炒 陳皮炒 各四兩 枳實炒 青皮炒 山楂肉 麥芽炒 神麴炒 萊菔子炒 白芍藥炒 各二兩, 柴胡 桔梗 川芎 各一兩二戈 白朮土炒 乾薑炮 沈香 木香 各一兩 共爲細末 每服 週歲七分 二三週者一戈, 糖拌空心, 生薑湯送下, 便血米湯送下, 小兒下血, 多因飲食傷脾, 脾不攝血, 若用止血之劑, 及 溫補升提之法, 無益也, 予製此方, 以消食爲主, 消食則脾氣自復, 而不治而自愈

* 서울. 孟華變韓醫院長