

열대풍도병에 관하여

열대지방 여행시 조심해야 할 질병 제 7 회

구충증

- 열대, 아열대 또는 온대지방에 널리 분포되어 있으며 피부염 및 유충이 폐에 들어가면 기침, 가래증상을 나타낸다.
- 사람에 기생하는 구충은 십이지장충과 아메리카 구충이 있어서 성충은 모두 사람의 소장에 기생하며 1마리가 하루 0.2~0.5 ml 흡혈하므로 빈혈증상을 나타낸다.
- 치료는 시중 구충제로 치료가 가능하다.



요우스

- 동남아시아, 아프리카북부, 중미, 남미, 호주 및 태평양의 여러 섬들에 분포되어 있으며 트레포네마팔리덤 변종 페데뉴감염에 의한 접촉성으로 감염되지만 상처를 통해서만 감염된다. 특히 성교중 감염되는 경우가 많다. 잠복기는 3~6주이며, 트레포네마 침입부에 홍반, 구진, 궤양 등이 나타난다.
- 치료 및 예방은 페니실린 120만단위 씩 3일간격으로 2회 근육주사하며 특히 어린이에 있어서 보건교육을 철저히 해야 한다.

핀타

- 멕시코, 온두라스, 폐루, 브라질 등에 분포하며 트레포네마팔리덤 변종 카라데움 감염에 의하여 피부질환을 일으키며 접촉에 의하여 감염되나 파리에 의한 기계적전파도 가능하다. 증세는 피하에 육아성병변을 일으키며 그 부위의 피부는 위축, 탈색소 현상 및 구진이 생긴다.

● 치료 및 예방은 폐니실린을 적용하며 환자와의 접촉을 피한다.

● 소위 국제도시라고 하는 대도시(항도 포함)에서는 특히 감염 위험이 높다. 시골에도 적지 않으며 성병을 앓고 있는 사람과 성관계를 가지면 전염되는 접촉성 전염병으로서 사회적 질병이며 망국병이다.

● 성병은 임질, 매독, 연성하감, 비 임균성요도염 및 서혜임파육아종, 성병성육아종, AIDS(후천성면역결핍증) 등 10여 가지다.

성병

임 질

성관계후 2~5일쯤 지난후부터 남자는 소변시에 국부가 화끈화끈 따가움을 느끼고 황색의 고름이 나온다.

여자는 이러한 증세가 거의 나타나지 않으나 황백색의 냉(대하)이 많이 나오며 간혹 허리가 아프기도 한다.

매 독

성관계후 10일~10주후에 질내부나 성기에 아프지 않는 상처가 나타나며 치료하지 않아도 몇일 후 없어지는 경우도 있으며 증상이 다양하다.

치료 받지 않고 그대로 방치하면 온몸에 붉은 점이 나타나기도 하고 머리카락이 듬성듬성 빠지기도 한다.

성병예방

불결한 성관계를 갖지 않는 것이 가장 분명하고 간단한 예방법이다. 콘돔을 사용하는 방법은 비교적 안전하나 성관계후 즉시 성기 및 그 주위를 비눗물로 깨끗이 씻는 것도 약간의 도움이 되나 보장은 될 수 없다.

치 료

반드시 병(의)원 또는 보건소, 성병관리소, 성병진료소, 대용성병진료소에 가서 검사후 치료를 받아야하며 완전히 완쾌가 될 때까지 치료를 받아야 한다.

