

# 鼻淵의 外用藥에 關한 研究

吳 秀 逸\*

## I. 緒 論

鼻淵은 一名 腦漏<sup>8)</sup> 라고 하는데 西醫學上으로 副鼻洞疾患으로서 單一性 副鼻洞炎 合併性 副鼻洞炎 汎發性副鼻洞炎에 해당하고 또 良性이나 드물게는 惡性副鼻洞腫瘍인 경우도 있다.<sup>8)</sup>

또한 鼻淵은 症狀 및 原因이 多樣하여 鼻塞 鼻不聞香臭 鼻衄 鼻齧 鼻痔 等の 病症과 함께 發生하거나 臨床의으로 구분이 困難한 경우가 많다. 그래서 대부분의 歷代 文獻에서도 특히 外用藥에 있어서는 엄격히 구분되어 있지 않은 경우가 많았고 處方의 內容 또한 너무 多樣하여 臨床에 使用하기에 어려운 점이 있었다.

이에 이들 歷代 文獻에 나타난 鼻病의 外用藥 內容中 鼻淵을 中心으로 調査하여 정리한 結果를 報告하는 바이다.

## II. 資料 및 方法

### 1. 資 料

鼻病에 關하여 收錄되어 있는 文獻中 52種의 書籍을 拔萃하고 그 中 鼻淵의 外科的 治療에 應用된 處方의 藥劑에 關한 內容을 引用하였다.

### 2. 方 法

ㄱ. 2種 以上の 書籍에서 重複되는 處方은 그 하나만을 取扱하였다.

ㄴ. 處方의 構成藥物은 같으나 配合비가 다른 경우는 모두 收錄하였다.

ㄷ. 單方도 하나의 成方으로 取扱하였다.

ㄹ. 이상 調査된 각 處方의 構成藥物의 頻度를 조사하여 表를 작성하였다.

## III. 本 論

### 1. 鼻淵의 治療에 쓰이는 外用藥

處方名 혹은 出處	構成藥物	參考文獻
①瓜 簪 散	瓜蒂 枯白礬 螺殼灰 草烏 甘遂	5)23)41) 49)
②瓜 丁 散	瓜蒂 細辛	3)15)49) 50)
③鷄 鳴 錄	白礬 蓬砂	14)33)47)
④ "	白礬 白梅肉 射香 蓖麻仁	33)
⑤ "	漆酥 白鴿翅 水片	33)
⑥絳 麩 撮 要	麝香	35)
⑦古今醫按選	艾煙	34)
⑧魯 府 集 方	白礬	12)40)
⑨丹 溪 心 法	狗頭骨灰 礪砂	45)
⑩礪 砂 散	礪砂 輕粉 雄黃 水片	15)29)44) 52)
⑪文 堂 集 驗 方	長尾五穀蟲	50)
⑫ "	江魚	50)
⑬ "	菖蒲 皂角	6)13)49) 50)
⑭ "	通草 細辛 附子 蜜	50)
⑮ "	藕節	16)19)49) 50)
⑯本 草 經 目	枯礬 豬脂	33)39)
⑰ "	雄黃	9)13)39)
⑱ "	瓜蒂	2)27)39)

處方名	出處	構成藥物	參考文獻
19	本草綱目	胡菜	39)
20	"	瓜蒂 細辛 狗膽汁	39)
21	白飛震方	礪砂	38)
22	普濟方	鐵鎖磨石上末 猪脂	26)
23	白礬散	白礬 噉脂	28)
24	扶壽精方	冰片	23)30)38)
			49)
25	本草綱目	乾姜 蜜	39)
26	"	辛夷 葱	39)
27	"	皂角	39)49)
28	白芷膏	白芷 通草 蕤核 蕪草 羊髓 當歸 酒	37)
29	辛夷散	細辛 川椒 乾姜 川芎 吳茱萸 辛夷 附子 皂角 桂心 猪油	47)
30	細辛膏	細辛 川芎 川椒 黑附子 乾姜 吳茱萸 桂心 皂角 猪油	3)7)24)5)
31	聖濟方	藜蘆 雄黃 蜜	26)
32	聖濟總錄	青蒿灰 石灰	43)
33	聖惠方	丁香	27)36)
34	"	細辛	27)
35	"	新馬屎汁	27)
36	"	螻蛄 射香	27)
37	"	瓜蒂 白礬 猪脂 梔子	27)
38	"	瓜蒂 雄黃 射香	27)
39	"	地膽	27)
40	"	細辛 白芷 地膽	27)32)
41	四象金匱秘方	葡萄	9)
42	"	白礬 蓖麻仁 射香 杏仁	9)
43	"	細辛 百草霜	9)
44	"	黃栢	9)
45	"	梁上塵	9)
46	細辛散	細辛 瓜蒂	28)
47	類聚方	狗頭灰 丁香	38)

處方名	出處	構成藥物	參考文獻
48	外科方外奇方	蟾酥 龍骨 石首魚腦 辛夷 冰片	17)
49	"	琥珀 藿香	17)
50	"	白油脂	17)
51	"	朱砂 漆 白鴿子 冰片	17)
52	外治壽世方	鵝不食草	23)46)49)
53	"	瓜蒂 白礬	49)
54	"	猪脂 梔子	49)
55	"	白礬 礪砂	3)19)49)
56	"	梅 蓖麻仁 白礬	49)
57	"	輕粉 杏仁 白礬	14)23)49)
58	"	麻鞋 燒灰	49)
59	"	辛夷 芭蕉 射香 葱白	49)
60	"	杏仁 白芷 細辛 全蟲 麻油	49)
61	疑難急症療方	白干露 黃魚頭中石	14)
62	"	漆	14)
63	"	石首魚腦	14)
64	"	絲綿	14)
65	"	蒜貼足底心	13)14)
66	"	大黃 細辛 瓜蒂 白礬 綠礬 射香	14)
67	"	瓜蒂 甘遂 白礬 松香 香油	14)
68	喻選古方試驗	蓖麻仁 大棗	36)
69	錢乙小兒科	蘭香葉 銅青 輕粉	42)
70	通草丸	通草 辛夷 細辛 甘遂 桂心 川芎 附子	51)
71	千金方	蟬皮	24)
72	春脚集	桃葉作枕	19)
73	"	瓜蒂 細辛 射香	19)
74	"	雄黃 白礬 丁香 梅肉	19)
75	"	鐵鎖磨石上末 猪脂 乾姜 蜜	19)
76	義方系編	礪砂 冰片	23)

處方名	構成藥物	參考文獻
①驗方新編	辛夷 射香 葱白	23)
②	胡蘆	21)23)
③	真松花粉	23)
④惠直堂經驗方	明礬 蓖麻仁 鹽梅	16)
	射香	16
⑤	輕粉 杏仁 雄黃 射香	16)
	蜜	
⑥	皂角 辛夷 石菖蒲	16)
⑦徐靈胎醫書	凌霄花 朴硝 津	25)
⑧	凌霄花 蜜陀僧	25)
⑨白黃散	白礬 雄黃 細辛 瓜蒂	3)10)
	狗膽汁	
⑩辛夷膏	辛夷 細辛 木通 木香 白芷 杏仁 羊髓 豬脂 永片	10)31)45)
	射香	11)
⑪神塞丸	射香 明礬 沈香 糯米	22)
⑫罔研散	芒硝 冰片 雄黃 細辛	5)
	射香 古本	
⑬川椒散	川椒 訶子 桂心 川芎	5)
	生薑 細辛 白朮	
⑭種杏仙方	百草霜	13)21)
⑮	枯礬	13)
⑯	雄黃 瓜蒂	13)
⑰	椿姑姑	13)
⑱雄黃圓	雄黃 瓜蒂 綠礬 射香	3)
⑲輕黃散	輕粉 杏仁 射香 雄黃	3)31)41)
⑳醫學入門	蒼耳根 苗 醋	41)
㉑	白牛尾毛 橙葉	40)41)
㉒外臺秘要	白礬 胡粉 羊脂	32)
㉓	白礬 通草 真珠	32)
㉔論症實驗醫譯	白鹽 水蛭 竹筒	1)

2. 構成藥物と頻度數

藥物	頻度	藥物	頻度
白礬	21	射香	15
細辛	17	瓜蒂	14

藥物	頻度	藥物	頻度
雄黃	12	百草霜	2
冰片	8	綠礬	2
豬脂	8	凌霄花	2
辛夷	8	朴硝	2
杏仁	6	螺殼	1
蓖麻仁	5	草烏	1
輕粉	5	翎砂	1
皂角	5	艾煙	1
蜜	5	長尾五穀蟲	1
燭砂	4	江魚子	1
通草	4	胡香	1
附子	4	葫蘆	1
白芷	4	燕脂	1
乾姜	4	燕核	1
川芎	4	薰草	1
桂心	4	當歸	1
梅	4	酒	1
甘遂	3	青蒿	1
漆	3	藜蘆	1
石首魚腦	3	石灰	1
川椒	3	新馬屎	1
葱	3	蟻	1
丁香	3	葡萄	1
白鴿翅	2	黃栢	1
覆香	2	梁塵	1
狗頭骨	2	蟾酥	1
菖蒲	2	龍骨	1
葛	2	琥珀	1
狗膽汁	2	白石脂	1
鐵鎚石末	2	朱砂	1
羊髓	2	不食草	1
吳茱萸	2	麻鞋	1
香油	2	芭蕉	1
地挺	2	全蠍	1
		白干	1

藥 物	頻 度	藥 物	頻 度
絲 綿	1	詞 子	1
蒜	1	椿 姑 姑	1
津	1	古 本	1
松 香	1	生 薑	1
大 棗	1	白 朮	1
蘭 香 葉	1	白 牛 尾 毛	2
銅 青	1	橙 葉	2
蝟 皮	1	蒼 耳 根	1
桃 葉	1	蒼 耳 苗	1
葫 蘆	1	醋	1
眞 松 花 粉	1	胡 粉	1
蜜 陀 僧	1	羊 脂	1
木 通	1	眞 珠	1
木 香	1	白 鹽	1
沈 香	1	水 蛭	1
糯 米	1	竹 筒	1

#### IV. 總括 및 考按

各 處方의 構成藥物中 頻度數가 높은 瓜蒂는 14回 나타나 있다.

瓜蒂는 그 藥力이 俊烈하여 많은 處方에서 君藥으로 되어 있으나 損氣될 憂慮가 있으므로 補氣하는 內服藥과 함께 併用하는 것이 바람직하다고 思料된다.

白礬은 21回로서 瓜礬散 白礬散 白黃散 및 其他 經驗方 等에 널리 쓰이고 있는데 이는 外用뿐만 아니라 內服時에도 去腐肉 生新肉하는 功效가 있으므로 鼻淵 鼻痔 鼻齧 等 뿐 아니라 諸般 九竅의 痔病이나 努肉瘡腫 等の 病에 널리 쓰이는 藥物이다.

그러므로 白礬은 이미 器質化한 病變이나 이미 생긴 膜 等を 除去하기 위하여 使用하고 있다고 思慮되며 특히 枯白礬이 使用되는 것은

白礬이 結晶水를 잃은 形態로서 보다 効能이 우수하기 때문이라고 思慮된다.

射香은 15回, 細辛은 17回 氷片과 辛夷는 各各 8回의 處方에 들어있어 비교적 널리 쓰이는 편이다.

이외에 一般的으로 널리 쓰여지고 있는 藥物中에서도 細辛이 19回, 射香이 15回, 氷片이 8回로서 辛香한 藥物이 많았다.

이는 辛香한 氣味로서 塞한 바를 通케 하는 것이 目的으로 大部分의 處方에 包含되어 있는데 이 역시 損氣의 憂慮가 있으므로 補助的으로 補氣하는 藥을 內服하는 것이 必要하다고 思慮된다.

雄黃은 12개 處方에 들어 있는 類用藥物로서 腐肉을 除去하는 効能 뿐 아니라 殺蟲 解毒하는 功效가 있으므로 널리 쓰여지고 있다.

類用藥物中의 하나로 猪脂가 8回로 나타났는데 이는 基劑로서 뿐이 아니라 生肌藥으로서의 意義가 있다고 생각된다.

香油 역시 같은 의미로 쓰여졌다고 보여진다. 礪砂 역시 腐肉을 去하는 効能이 強하나 損氣의 憂慮가 있으므로 使用에 注意가 必要하다고 思慮된다.

石首魚腦가 3回로 나타났는데 이는 鼻淵이 熱로 因한 경우가 많으므로 石首魚腦의 寒한 性으로서 清熱하기 위함이라고 思慮된다.

梅는 白梅肉 梅肉 鹽梅 等으로 4개의 處方에 들어 있는데 항상 白礬 等の 去瘀生新하는 藥物과 함께 쓰이는 것으로 나타났다. 이는 梅實의 收斂하는 性을 利用하여 去瘀生新의 効를 돕기 위한 것으로 思慮된다.

輕粉이 5回로 나타났는데 使用에 신중을 기해야 하겠다. 杏仁은 6回로 나타났는데 이는 그 자체의 藥效와 더불어 基劑로써 이용되고 있는 것 같다.

大棗와杏仁은徐放性基劑로서의가치가있다고思慮된다.狗膽汁이2개處方에이용되었는데이는苦寒한性味로써清熱하고腐肉을除去하는作用을이용했다고보여진다.

梅肉 이외에龍骨白石脂百草霜詞子等の收斂하는性味를가진藥物이보조적으로使用되고있는것을알수있다.

全蟲白干蠶水蛭等の祛風하거나通絡시키는藥物이각각一回로나타났다.硼砂(蓬砂)는1회사용된예가있는데腐肉을軟化시킴으로써白礬礶砂等の去瘀生新하는藥物의作用을돕는것으로思料된다.

그리고특이한것으로桃葉으로作枕하여使用한것이한경우가있었다.이외에특이한것으로古今醫案按選에나타난艾煙을密閉된室內에서씌는것으로이는治療效果與否를莫論하고매우危險하여實用성이없다고본다.그외에使用目的이確實치않거나求하기어려운藥物또는使用하기어려운藥物이여러種類있었으나그頻度數가적고少數의文獻에서만나타난경우가大部分이므로이들에관한것은상세히하지않았다.

### III. 結 論

以上과 같은方法으로鼻淵의外用方들을調査整理한結果는다음과같다.

1. 白礬이21회로가장높았고그외에瓜蒂細辛射香雄黃辛夷冰片등의藥物이가장頻用되었다.
2. 去瘀生新하는藥物과辛香한藥物이主가되는것으로나타났다.

### 參考文獻

1. 朴義洙：論症實驗醫訣，서울，p.227.
2. 尹吉榮：東醫方劑學，서울，高文社，1971，p.103.
3. 醫林撮要：서울，黑潮社，1968，p.320，321，322.
4. 李尙仁·安德均·辛民教：漢藥臨床應用，서울，成輔社，1982，p.559.
5. 李永春：春鑑錄，서울，p.229，230.
6. 丁若鏞：丁茶山小兒科秘方，서울，杏林出版社，1979，p.125.
7. 周命新：醫門寶鑑，서울，杏林書院，1971，p.205.
8. 蔡炳允：漢方眼耳鼻咽喉科學，서울，集文堂，1982.
9. 天德山人：四象金匱秘方，서울，杏林書院，1975，p.37.
10. 韓秉璉：醫方神鑑，서울，中卷，p.11，12.
11. 許浚：東醫寶鑑，서울，南山堂，1975，p.238.
12. 龔廷賢：魯府集方，珍本醫書集成中，臺北，世界書局，1971，p.65.
13. 龔廷賢：種杏仙方，臺北，新文豐出版社，1977，p.76，77.
14. 羅越峯：疑難急症簡方，臺北，世界書局，1971，p.111，112.
15. 龔新民：中國臨症備要，臺北，啓業書局有限公司，1981，p.59.
16. 商東亨：惠直堂經驗方，臺北，世界書局，1971，p.99.
17. 凌曉五：外科方外奇方，珍本醫書集成中，臺北，世界書局，1971，p.66.
18. 萬寶秘書：臺北，大方出版社，1976，p.269，270.
19. 孟文瑞：春脚集，珍本醫書集成中，臺北，世

- 界書局，1971，p.32，33，34.
20. 普濟方：醫部全書中，臺北，芸文印書館，p.3899.
  21. 謝觀：東洋醫學大辭典，서울，高文社，1980，p.973.
  22. 謝元慶：良方集腋，서울，正進社，1976，p.78.
  23. 善化鮑：驗方新編，臺北，大中國圖書公司，1974，p.16，17.
  24. 孫思邈：千金方，臺北，自由出版社，1958.
  25. 徐靈胎：徐靈胎醫書三十二種，서울，慶熙大學校 漢醫科大學，1974，p.79.
  26. 聖濟方：醫部全書中，臺北，芸文印書館，p.3900.
  27. 聖惠方：臺北，芸文印書館.
  28. 梁子村：不知醫必要，臺北，世界書局，1971，p.75.
  29. 吳謙：醫宗金鑑，臺北，文光圖書有限公司，1980，p.139.
  30. 吳近山：扶壽精力，珍本醫書集成中，臺北，世界書局，1971，p.31，32.
  31. 王肯堂：六科準繩，서울，翰成社，1982，p.451.
  32. 王燾：外臺秘要，서울，成輔社，1975，p.574，575，576.
  33. 王孟英：鷄鳴錄，臺北，世界書局，1971，p.38.
  34. 王孟英：古今醫案按選，臺北，世界書局，1971，p.78，79.
  35. 雲川道人：絳囊撮要，臺北，世界書局，1971，p.14.
  36. 喻嘉言：喻選古方試驗，臺北，世界書局，1971，p.24.
  37. 劉涓子：鬼遠方，珍本醫書集成中，臺北，世界書局，1971，p.74.
  38. 醫部全書：臺北，芸文印書館，p.3882，3883，3884，3885，3886，3887.
  39. 李時珍：本草綱目，서울，高文社，1975，p.168，169，170.
  40. 李用粹：證治彙補，臺北，萬葉出版社，p.247.
  41. 李廷：醫學入門，서울，大星文化社，1981，外集 卷二，p.42，43.
  42. 錢乙：小兒藥證直訣，서울，癸丑文化社，p.8，9.
  43. 趙竹泉：醫門補要，臺北，世界書局，1971，p.8.
  44. 曹孝忠等：聖濟總錄，臺北，新文豐出版社，1978，p.951.
  45. 朱震亨：丹溪心法，臺北，新文豐出版公司，1975.
  46. 陳樂天：回生集，珍本醫書集成中，臺北，世界書局，1971，p.8，9.
  47. 陳無擇：三因方，臺北，臺聯國風出版社，卷十六，p.11.
  48. 陳存仁：丸散膏丹成藥驗方，香港，震旦圖書公司，p.198.
  49. 戴龍笙：外治壽世方，臺北，世界書局，1971，p.62，63.
  50. 何惠川：文堂集驗方，臺北，世界書局，1971，p.84，85.
  51. 許滋微：本載方，醫部全書中，臺北，芸文印書館，p.3884.
  52. 祁坤：外科大成，臺北，文光圖書有限公司，p.234.