

- ◆... 만성호흡기질환이라고 하면 감기류
- ◆...의 일과성 세균성 상기도질환을 제
- ◆...외하고는 대부분의 호흡기질환이 포
- ◆...합되고 만성기관지염, 기관지천식, 폐
- ◆...기종, 기관지확장증등 기도질환과 폐
- ◆...간질(間質)성질환이나 심한 결핵을
- ◆...알고난 사람에서 나타나는 호흡기능
- ◆...부전등이 모두 만성호흡기질환에 속
- ◆...한다. 우리 주변에 가장 많은 만성
- ◆...호흡기질환은 폐기종과 같은 폐색성
- ◆...폐질환과 결핵을 알고난 사람에서나
- ◆...타나는 기능부전등으로 늘 숨이 차
- ◆...고 감기에 잘 걸리고 기침과 가래
- ◆...를 배출하고 있는 상태가 된 사람
- ◆...들이 많다. 보통사람도 일년에 한두

- 차례 감기류등「바이러스」라고 하는
- ◆...적은 세균에 의한 일과성기도질환에
- ◆...이환하게 마련인데 앞에서 열거한만
- ◆...성폐질환이 있는 사람에서는 이런감
- ◆...기류질환이 더 자주 걸리게 되고
- ◆...일단 걸리면 상당기간 오래 지속하
- ◆...거나 또 폐렴등 합병증이 생기는데
- ◆...우가 많다. 만성폐색성폐질환이라고하
- ◆...는 용어는 어떤 한종류의 병명이지
- ◆...칭하는 것이 아니고 숨을 내쉬는기
- ◆...능이 떨어진 모든 종류의 폐색성질
- ◆...환을 총칭하는 기능적 표현으로서만
- ◆...성폐색성폐질환에 속하는 대표적인병
- ◆...이 폐기종, 만성기관지염, 기관지천식,
- ◆...기관지확장증등이다.

후 속발증으로 발생하는 경우가 많아 소아기의 기도감염의 진단과 치료를 철저히 해야할 필요가 강조되고 있다. 기관지 확장증은 확진후 외과적으로 절제수술하는것이 최선의 방법이나 수술부위 및 범위의 결정 등 수술전에 확인해야할 많은 검사가 필요하다. 양쪽폐에 진행된 기관지확장증은 수술적요법으로도 치료가 어려워 못 고치는 경우가 있으므로 확장증의 범위가 적을때 철저한 진단과 치료를 하는것이 아주중요하다.

⑤폐결핵의 속발증

우리나라에는 80만명이상 달하는 폐결핵환자가 아직 우리 주변에 있고 결핵약제에 내성을 가진 결핵균주가 많이 범람하고 있어 결핵으로 인해서 만성폐질환으로 죽은 환자가 대



金建烈

(서울醫大내과교수)

측폐에 만성미만성병명을 가진 진행성의 폐질환을 의미하고 원인이 규명하는 경우보다 원인 불명인 경우가 더 많은 치료가 어려운 폐질환을 의미한다. 이 병은 폐암까지 치료가 어려운 만성질환으로서 정확한 진단을 위해서는 폐조직검사도 필요하고 해서 환자나 의사에게도 두 큰 부담을 주는 병이다. 원인이 불명한 경우가 많지만 생활 환경 오염이 주원인이 되어 증가추세를 보이고 있다.

⑦폐암

폐장의 암성질환도 그 발생과정부터 수년을 걸쳐 임상적으로 증상을 나타내지 않은채 성장하고 있다는것을 생각하면 만성폐질환에 속한다고 할수있다. 따라서 발생초기에 암이 싹트기 시작했다고 진단이 가능하다면 조기발견하여 수술적으로근치할수있는 최선의 방법이 열릴것이다. 그러나 불행히도 오늘날의 현대의학은 혈청검사나면역학적방법등 다른 방법으로 폐암을 조기발견하는 방법이 없어 흉부X-선검사등 영상진단에 의존하고 있어 병이 상당기간 진행되고난 후에야 진단되는 경우가 있어 만족할만한 폐암환자진료에 임하지 못하고 있다. 그리고 폐암에 관한한 조기자각증상이 없어 더욱 조기진단에 어려움을 가중시키고 있다. 이상 우리주변에서 문제가 되고있는 만성폐질환에 대해서 생각해 보았는데도 증병에 해당하는 공통점은 폐질환에 관한한 일단 발생하고 나면 상당정도의 기능부전증을 남기고 낫는다면가 혹은 비가역성질환으로 진행하여 못하고치는 병이 되는 경우가 많다는 것을 이해할 필요가 있다. 따라서 폐질환의 최선의 치료는 예방진료이며 초기에 질병을발견하여 더이상의 진전을 막고 폐질환을 일으킬수있는 원인물질 제거하는데 최선의 노력을 기울일 필요가 있다.

慢性호흡기질환

30代 이후흡연자 계속적喀痰배출시

만성氣管枝炎의심 診療반도록 해야

生活환경汚染제거가 豫防관리에 가장重要

「알파 원안티립신」이라고하는 특수혈청결핵증이 관계되고 또 일종의 연령증가에 따른폐장의 퇴행성장애를 겪고 있는 만성폐질환이다. 폐기종환자가 많은 경우 만성기관지염을 겸하고있어 만성기관지염환자에 준해서 질병예방수칙을 세워도 크게 다를바 없다. 다만 환자의 예후가 만성기관지염과는달리 비가역성퇴행성질환이어서일단 생긴 폐기종(늘어난 폐포와 세기관지)이 원상으로 회복시키기는 어려워 의사가 시술할수 있는 범위가 합병증에 방에 불과하다는 치료의학상의 한계점을 인식하고 질병예방차원에서 모두가 노력을 필요로 하는 어려운 질병이라고 할수 있다.

③기관지천식
이병은 기관지가 좁아지는것을 특징으로 하는 발작성호흡곤란을 나타내는 병으로서 폐기종과는 달리 가역성(可逆性)이라는 특징이 있다. 즉 아주 습관증상이 약물치료로서기

④기관지확장증
기관지확장증은 대량의 객담과 혈담을 배출하고 있는 만성적인 폐질환으로서 역시 일단 늘어나버린 기관지가 원인이 되며 또 일단 병적으로확장된 기관지는 원상으로 돌아가지 않은 비가역성만성폐질환에 속한다. 이병의 원인은 선천적소인도 물론 거론되고 있지만 가장 많은 원인은 어린 시절의 기관지염, 폐염, 폐결핵, 림파선결핵등 질환을알고난 이

⑥肺間質性질환
최근 증가추세를 보이고 있는 폐실질의 만성질환으로서이 병은 호흡곤란과 마른기침등을 주증상으로 하고 흉부X선상

①만성기관지염
만성기관지염이라는 病名은기도분비의 증가로 늘 가래를배출하는 사람에게 부치는 병명으로서 다른 특별한 폐질환이 없으면서 일년중 3개월이상(객담)을 배출하는것이 2년이상 계속되고 있을때는 다른 모든검사가 정상이라도 만성기관지염환자라고 정의하고 있다. 따라서 30대이후 흡연자가 늘 객담을 배출하고 있다면 이미 스스로 만성기관지염이라고 자각진단해도 확실하며 병이 더 이상 진전하는것을 막기위해서 금연등 원인물질을 즉각 중지할 필요가 있다. 만성기관지염의 원인은 대기오염, 흡연, 직업적인자(화학물질, 광산근로자 유독가스등) 등 외적인자의 영향이 크고 그의 내적인자로서 연령증가, 「알레르기」 소인, 반복되는 기도감염등이 원인이된다. 따라서 만성적으로 가래를 뱉고 있는 사람은 이상 열거한 원인을 스스로 제거하는데 노력할 필요가 있으며 우선금연을 하고 생활 작업환경의개선 및 기도감염증의 즉시치료를 할수있는 일을 선행시켜야한다

②폐기종
폐기종은 만성기관지염보다더 치료하기가 어려운 만성폐질환으로서 말초세기관지나 폐포벽이 이미 파괴되어 탄력성을 잃고 늘어나버린 상태가되어 폐장의 환기기능뿐만 아니라 산소섭취기능까지 저하되어 늘숨이차고 기침 가래를 뱉고있는 병을 말한다. 이병은 중년이후 남자에게 많이 발생되며 앞에서 거론된 만성기관지염의 원인이 모두 폐기종의 원인이되며 그 이외에 선천적소인이나

謹賀新年

<p>社 長 李 鍾 琰</p> <p>서울시동대문구회경동二五二 전화.. 24714775</p>	<p>社 長 鄭 漢 昇</p> <p>서울시성동구성수동一가一三一一二〇 전화.. 464105115</p>	<p>社 長 韓 光 鎬</p> <p>서울시용산구한강로三가四〇一八八三 전화.. 794163115</p>	<p>社 長 金 永 鐵</p> <p>서울시동대문구장안동一五九一一二 전화.. 24415003</p>	<p>社 長 李 廣 善</p> <p>서울시동작구신대방동六九八 전화.. 841127213</p>
---	--	--	--	--