傘下支部動靜

▲協會本部

지난 2월10일 농업기술자협회 주최인 영농지도자 교육계획중 약용작물 과정에 대한 출강교육 실시.

출강자 : 사부국장
시 간 : 120분
과 목 : 작용작물생산 및 유통현황과 전망.

◇88제1차 理事會 召集 : 88년3월8일(화)오후2시
◇88제19차 定期總會개최 계획 : 88년3월말 예정.
◇入山採取會員制度活用要望 : 生活餘件의 向上과 농촌젊은층 인구의 감소현상으로 自然 生藥材의 出荷量이 날로 감소추세에 있음으로 必要地域의 支部長 및 分事務所長은 可及的지역 入山採取會員을 많이 모집하여 부존자원 채취와 活用에 적극 힘써주시기 바랍니다.(4月中 입산채취회원총 신규발행 계획)

▲경북支部

경북支部산하 녹생회(지부장 안승관)는 올해들어처음으로 김천시소장 신현호氏 主管으로 지난1月31日 김천시에서 전체 녹생회를 소집하고 금년도 自體活性化 및 유대에 關한 자평을한 후 금년도 對內外 가장 모범이 되는 단체로 발전시키는데 團合協同해 나가자고 다짐하바 있다.

또한 최근 일천궁 매점매석 영향으로 인한 품귀현상에 대한 대책과 생약재 제품 표준화 자체 규정을 반영시키기 위한 本部支援對策등을광범위하게 討議하고 특히 19次 總會를 위한 發展的인 의안등을 作成하여 反映시키기로 意見을 모은바 있다.

▲경남支部

경남支部(支部長 김정만) 녹생회는 밀양군소장 이종수氏 主管으로 지난 2月3日 馬山市에서 開催하고 금년도 活性化를 위한 유대를 한층 強化한바 있다.

▲부산직할시支部

부산支部 녹생회에서는 支部長 박질부氏 主管으로月例녹생회를 지난 2月10日 召集하고 지역分事務所의 균형있는 정비와 지역特性을 고려한 出張所 擴張 문제등을 논의하고 本部에 건의하기로 하였다.

▲화성군 사무소

미개발 생약재배연구 및 전파를 目的으로 지난 2月3日 本會화성군 사무소장인 洪思光氏는 최근 自身이직접 경영하고 있는 東西민간외교협회의 기능활성화 일환으로 다음과 같은 민간외교 사업을 추진하고있음을 소개합니다.

方案과 本部支援對策등을광범위하게 討議하고 특히 19次 總會를 위한 發展的인 의안등을 作成하여 反映시키기로 意見을 모은바 있다.

▲경남支部

경남支部(支部長 김정만) 녹생회는 밀양군소장 이종수氏 主管으로 지난 2月3日 馬山市에서 開催하고 금년도 活性化를 위한 유대를 한층 強化한바 있다.

▲부산직할시支部

부산支部 녹생회에서는 支部長 박질부氏 主管으로月例녹생회를 지난 2月10日 召集하고 지역分事務所의균형있는 정비와 지역特性을 고려한 出張所 擴張 문제등을 논의하고 本部에 건의하기로 하였다.

▲화성군 사무소

미개발 생약재배연구 및 전파를 目的으로 지난 2月3日 本會화성군 사무소장인 洪思光氏는 최근 自身이직접 경영하고 있는 東西민간외교협회의 기능활성화 일환으로 다음과 같은 민간외교 사업을 추진하고있음을 소개합니다.

공산권 民間단체와도 交流

지난 15년간 순수 민간차원의 외교활동을 소분없이 벌여온 東西민간외교협회(회장·洪思光·35) 는86아시안게임때 외국인4백80명을, 작년도에 8백24명을 유치했던 경험을 바탕으로 서울올림픽이 열리는 올해는 대규모의 외국민간사절단들을 초월해 세계인들이 서로 만나 정감을 나누다보면 모두 친구가 됩니다. 이념이나 인종을 초월해 세계인들이 서로 오가는 일이 잦아질수록 전쟁의 공포가 그만큼 줄어들지 않겠읍니까.』 洪회장은 85년7월과 작년4월에 중공을 여행하면서 이같은 人間愛를 듬뿍 느꼈다고 말했다. 그가 만난 어느 중공인은 중공민항기가 한국에 불시착했을 때(83년5월) 서울을 구경했던 승객들의 얘기를 전해들었다며 한국인을 반겨 맞아주더라는것.

동서민간외교협회는 전국에 3천명의 회원을 갖고 있다. 회원들은 주로 협회를 찾아오는 외국인들의민박을 맡는다. 협회는 올해부터 국내회원들의 해외여행 사업도 펼친다.

美國「레틴—A」件에대한 소개

◎… 주름살 제거에 특효라는 美國「레틴—A」…◎
◎…에 對한 소개……。 …◎
◎… 〈안양시 사무소장 이봉선氏 제공〉 …◎

부노화방지제 주름살제거의 특효)

②美國 각병원및 연구기관 의사들 임상결과로 確認.

③참조=88년1월22일자 美의학협회誌(JAMA)에 게재(미시칸大學 연구논문)

主要內容。

※「레틴—A」는 피부세포를 생성하고 피부혈관을 확장시켜 혈액순환을 왕성하게 함으로 결과적으로피부노화를 방지하는 효과가 있음을 밝혀냄.

④기타자료=美펜실베이니아大學 피부과교수 엘버트 클리그만박사가원래는 여드름치료제로 개발한것이나특히 주름살제거 기능을 갖고 있음을 재발견함. 클리크만박사(72) 자신이 직접사용해봄으로서 50대후반의젊음을 유지하고 있다고 증언함.

※이상과 같은 학술및임상효과 공개이전에 허리우드 여배우들은 입에서 입으로 傳해진「레틴—A」의 소문을 듣고 이미 오래전부터 사용하고 있는것으로 밝혀짐.

白然生採取(연재)

활 = 活 (羌) 강

○과 명 : 미나리과
○속 명 : 강호리
○약용부 : 뿌리

1、기본 : 국내 각지 야에 자생하는 여러해살이 풀이다. 현재는 각지에서 재배하고 있다.

2、생장적지 : 경북 경기 강원 평북 함남북지방에 많이 자생하는 풀로서 특히 습기가 있는 곳이 더욱 잘자란다.

3、특징 : 키는 1m정도 자라며 잎은 깃모양으로 갈라지고 작은잎은 달걀꼴 또는 진달걀꼴이다. 꽃은 작은꽃이 모여 부리를 이루어 피고 그 빛은 담녹색이고 과실은 원추형이다.

4、채종 : 가을에 씨앗을 채집한다.

5、파종 : 씨앗은 10월하순경에 파종한다. 묘두번식도 한다.

6、채취 : 늦가을에 뿌리를 캐낸다.

7、조제 : 캐낸 뿌리는 물에 씻고 햇볕에 말린다.

8、이용 : 신경통 감기 구풍해열제로 사용한다.

만형자 = = (蔓荊子)

○과 명 : 마편초과
○속 명 : 순비나무
○약용부 : 열매

1、기본 : 해변가나 강변의 모래땅에 자생하는 소관목이다.

2、생장적지 : 해변 강변의 모래땅에 잘자라는 것이다. 현재는 정원수로도 많이 재배하고있다.

3、특징 : 나무의 키는 50cm정도 자라고 잎은두툼하고 잎뒷면에 잔솜털이 많이 나있는 관계로 회게 보인다. 꽃은 작고 색갈은 자색이다. 그 색갈은 가을에 달리며 흰색갈에 둥근열매이다.

4、채종 : 가을에 성숙한 열매에서 채집한다.

5、파종 : 씨앗으로 파종하거나 겪꽂이도 한다. 심는시기는 4월이나 9월이 적기이다.

6、채집 : 10월말경부터 열매를 채취한다.

7、조제 : 잘익은 과실을 따서 3~4일간 말려서 제품한것을 만형자라고 한다.

8、이용 : 신경통 눈병 등에 사용되나 최근에는 두통등에도 많이 쓰인다.

農漁民펀드 發賣

投信3社 올5천6백억규모

재무부는 농어민 주식투자가 급증하고 있는것과 관련, 직접투자로 인한 위험을 줄이기위한 방편으로 투자신탁에 「농어민주식형펀드」를 개발, 연내5천6백억원 규모를 환매토록할 방침이다.

재무부가 투자신탁 3社에 시달한 「상품한도운용지침」에 따르면 공무원연금공단·교원공제회등 면세법인들의 수익증권투자를 반환하고 농어민펀드로 대체하도록 하되 개인실명투자자에 한해 1인당 2백만원 범위내에서 판매토록 했다.

이에따라 韓國投信은 이번 주말께부터 「농어민복지주식」 9백억원, 大韓投信은 「희망주식2호」 9백억원의 판매에 들어갈 계획이며, 주식30%, 채권·기타에 70%를 운용하고 서울지역에서 30%, 나머지 70%를지방투자자에 판매키로 했으며 연간판매한도는 각각2천억원까지 확대할수 있다.

國民投信도 「알뜰주식」이라는 이름으로 최근에

除草劑「N—포스포노 메틸글리신염」

새 製造法 나와

제초제로 유익하게 쓰이는 포스포노 메틸글리신염의 새로운 제조방법이 개발됐다.

20일 韓國科學技術院에따르면 有機化學2연구실 金寅伍박사팀은 광범위한 제초기능을 가지면서도 잔류성이 적은 농약인 N—포스포노글리신염의 새로운제조방법을 개발, 特許(제24659호)를 획득했다.

이방법은 N—벤질—N—포스포노글리신과 알칼리를 1대1의 비율로 물을 함유하는 有機용매등에 가한 다음 상온·상압 상태에서 파라둘촉매존재아래 수소로 가수소분해반응을 시켜 合成토록 개발됐다.

〈2면에서 계속〉

이 1년에 윗거름으로人糞尿를 2~3회쯤 나누어주면 잘자라며 3년이상 자라게 되면 가을과이른봄에 포기주위를 15~18cm정도 깊게 하고堆肥, 탄똥등을 1포기당 4~8kg정도주고, 꽃이지고 난 2~3주일 후에 윗거름으로 잘썩은 人糞尿를 물에타서 포기주위를 넓고 얕게판 다음 5포기에 1통 정도로 2~3회 걸쳐 나누어 주면 結實이 잘된다.

㊥一般管理 : 아직까지病蟲害의 침해를 당하는것을 보지 못하였다. 3년이상 자라게 되면 가지가 무성하게 된다. 가지가너무 密生한 포기는 묵은가지를 남기고 햇가지의 徒長枝등을 剪定하여 通風과 햇볕이 잘쏘이게한다. 1~2年生의 모든 가지가 자랄을 따라 整枝를 잘해서 많은 가지가 생기도록 할것이다.

3、收穫·調製

9월하순~10월에 씨꼬투리가 黃青色으로 익는다. 이때 수확하여 陰乾한후 서늘한 곳에 저장할 것이다. 만약에 늦게 수확하면 씨꼬투리가 색갈이 검어지며 品質이 나빠진다. 收量은 보통 3年生에서 1株當 600g정도 생산된다.

祝 發展

社團法人 韓國生藥協會

◉경상북도 지부

지부장	안	승관
부지부장	박	재문
의성군 사무소장	박	종연
영풍군 〃	전	재성
영천군 〃	김	필진
영양군 〃	김	일진
상주군 〃	곽	해명
청송군 〃	강	은중
월성군 〃	조	원제
영주시 〃	류	복규
영덕군 〃	배	태환
김천시 〃	신	현호
군위군 〃	박	원섭
경산군 〃	배	성환
경주시 〃	최	상환
울릉군 〃	배	석태
영천시 〃	박	영태
문경군 〃	강	용대
고령군 〃	박	희태
안동군 〃	권	응화
안동시 〃	안	수범
포항시 〃	김	영식
상주시 〃	이	재문
금릉군 〃	제	명환
구미시 〃	이	춘호
예천군 〃	심	규수
울진군 〃	심	진수

1988년 2월 20일