

# 지상진료실

plaque type of lichen planus

서울치대 구강진단학교실

이승우 · 김연중

여기 소개된 사진은 45세 남자의 좌측 협점막에 나타난 plaque type의 lichen planus이다. 협점막 후방에는 전형적인 Wickham's striae가 보이며, 그 전방으로 homogeneous leukoplakia에서 보이는 것과 유사한 white plaque이 나타나 있다. 협점막의 전방에 Wickham's striae 보다 훨씬 가는 매우 섬세한 각화성 striae가 나타나 있는데 이는 환자가 흡연을 많이하고 있음을 암시한다. 실제로 환자는 하루에 25개피 정도의 담배를 피우고 있었다. Oral lichen planus의 51%가 plaque type

이었으며, 상습적인 흡연자의 경우 reticular type이나 atrophic type은 드문 반면, plaque type이 상당히 많다는 보고가 있다. 이 사실로 미루어 볼 때, 원래는 atrophic type이 나 reticular type이 있던 병소가 흡연에 의해 영향받아 plaque type으로 변화된다고 유추해 볼 수 있다. Lichen planus에 이환된 구강점막에 plaque type이 재차 이환된 경우, 과연 이것을 leukoplakia라고 인정할 수 있는가 라는 의문이 떠오른다.

