

## 月出山 漢藥資源植物의 分布 및 分類體系에 關한 基礎的 研究

尹 義 淚·李 鍾 一

順 天 大 學

### A Basic Study on Development of Medical Wild Plant Resources in Mt. Wol-chul

Eui Soo Yoon, Jong Il Lee

Suncheon National Univ. 315 Maegok-dong, Suncheon 540-070, Korea

#### Abstract

The plants medicinal resources of Mt. Wol-chul were investigated 8 times from July, 1988 to July 1990. In orther to analyze the vegetation of Wol-chul mountain area, medical wild plants structure and distribution. Medical wild plants of Wol-chul mountain consisted of 110 familis, 338 species in all. The resources of important herb drugs were Polypodiaceae, Graminea, Liliaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Apiaceae, Labiateae, Compositae.

Keywords: Mt. Wol-chul, Medical wild plants,

#### 緒 言

月出山은 海拔 808 m의 國立公園으로 全羅南道 靈岩郡의 영암읍과 郡西面, 그리고 康津郡 城田面一圓으로 드립된 殘丘의 山地로써 전체가 花崗岩이며, 岩石의 노출이 심한 岩山이다.

Uyeki(1941)는 이 지역을 온대(낙엽활엽수림대)로 구분하였으며 강수량이 약 1,500 mm로 비교적 다습한 지역이다.

月出山에 對한 植物相은 Uyeki(1941)외에는 없었으며 李等 3人(1989)이 최근 식물상을 보고 한바 있다. 이 조사 보고에서 月出山의 유관속식물은 126과 391 속 658 종으로 보고하여 실제로 상당히 많은 수 종이 분포하고 있음을 보고하였다. 또한 近郊의 山을 대상으로한 연구보고는 李(1988) 李와朴(1989) 朴과朴(1972) 등 몇편의 조사 보고가 있다. 月出山은 국립공원으로 지정됨에 따라 자연 파괴의 방지 및 보존을 위하여, 그리고 한약자원 식물의 개발을 위하여

그 자원의 실태와 조사 보존이 시급하다. 따라서 본 조사에서는 한약자원 식물들을 모집 및 분류하여 그 분포 및 분류체계 확립의 수단으로 하고자 하였다.

### 材料 및 方法

本調査研究는 1988年 7月부터 1990年 7月까지의 8차에 걸쳐 月出山一帶에 分布되어 있는 植物中에서 漢藥資源으로 利用할 수 있는 藥用植物들을 寶集하여 分類하였으며, 植物分類는 主로 李(1979)의 方法에 遵하였다. 都(1988), 陸(1986), 的研究方法과 白(1975)의 現代草本學을 參考하였다. 調査된 月出山의 位置는 全南 北緯  $34^{\circ}44'30'' \sim 34^{\circ}47'20''$  東經  $126^{\circ}37'30'' \sim 126^{\circ}44'10''$ 의範圍內에 位置하고 있다.

### 結果 및 考察

本地域內에서 寶集된 植物中 漢藥資源으로 確認된 植物은 草本類 62科 180屬 228種(表1), 木本類 50科 88屬 110種(表2), 총 110科 266屬 338種으로 이 中에서 Polypodiaceae, Gramineae, Liliaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Brassicaceae, Rosaceae, Apiaceae, Labiateae, Compositae等 10科가 全體의 40%를 차지하였다.

몇개의 科가 많은 比率를 차지하고 있는 點은 陸(1984), 李(1988), 李와 朴(1988)의 보고와 같으며 특히 尹(1989, 1990)의 報告와는 科別分布에 있어서 매우 類似하였다. 이는 月出山은 秋月山과 매우 비슷한 自然環境을 갖고 있다는 點에서 지리적 分布 및 생태적 관계에 매우 興味 있는 사설로 앞으로 인근 조계산, 백운산, 모후산 等의 약용식물 분포 및 식생과 아울러 더욱 研究되어져야 할 과제로 생각되어 진다.

다만, Uyeki(1933)는 이 지역을 온대(낙엽활엽수림대)로 분류하고 있으나 대부분이 온대성 식물이나 난대성인 동백나무가 분포하고 있는 것으로 보아 난대의 북한계선임을 시사하고 있다.

分布되어 있는 藥用植物資源도 산의 정상부가 대부분 암석지대로 많은 종은 없었다. 그러나 목본류가 군락을 형성하는 못하나 많은 종이 분포하고 있었다.

'1988年 6月 이곳 월출산이 국립공원으로 지정됨에 따라 앞으로 예상되어지는 인위적 피해의 방지와 현존식물의 보호를 위해 이 地域에 對한 生態系 및

植生環境과 藥用資源植物과의 관계에 對한 研究가 더욱 자세히 이루어져야 할 것으로 생각되어 진다.

藥用植物의 部位別로 使用되어 지는 種類를 보면, 全草를 利用하는 것으로 산일엽초, 쇠뜨기, 수크령, 조개풀, 바랭이, 강아지풀, 삿갓사초, 올챙이고랭이, 닭의장풀, 사마귀풀, 물달개비, 꿀풀, 비비추, 무릇, 석곡, 흘아비꽃대, 쇄기풀, 제비풀, 이삭여뀌, 며느리미씨깨, 마디풀, 개미자리, 장구채, 쇠별꽃, 미나리아재비, 냉이, 황새냉이, 개갓냉이, 기린초, 돌나물, 노루오줌, 바위떡풀, 짚신나물, 큰뱀무, 딱지꽃, 양지꽃고삼, 자운영, 차풀, 활나물, 여우팥, 토끼풀, 애기땅빈대, 팽이밥, 깨풀, 물봉선, 고추나물, 애기고추나물줄방제비꽃, 제비꽃, 호제비꽃, 바늘꽃, 선파막이, 가는개발나물, 큰까치수영, 좀가지풀, 자주쓴풀, 메꽃, 꽃마리, 조개나물, 배초향, 향유, 방아풀, 송장풀, 익모초, 들깨풀, 꿀풀, 깨쑥갓, 뽀리뱅이, 까마중이, 송이풀, 나도송이풀, 쥐꼬리망초, 쥐리풀, 질경이, 갈퀴덩굴, 계요동, 사철쑥, 제비쑥, 쑥부쟁이, 참취, 까실쑥부쟁이, 더위지기, 한련초, 개망초, 등골나물, 떡쑥, 지청개, 미역취, 수리취, 민들레, 뱀딸기, 명석딸기, 아카시아나무, 충꽃나무, 혈삼 등 98種으로 전체의 약 30%를 차지하며 거의 모두가 초본류였다. 莖葉을 이용하는 植物로는 바위손, 왕바랭이, 평의밥, 고마리, 쇠비름, 승마, 노루귀, 오이풀, 돌콩, 가위풀, 애기풀, 참나물, 민마삭줄, 광대나물, 배풍등, 주름잎, 도깨비바늘, 중대가리풀, 엉겅퀴, 쓴바귀, 비수리, 좀싸리, 노박덩굴, 단쟁이덩굴, 개다래, 좀목형 등 25種으로 역시 대부분이 초본류이다. 일엽초, 귀리, 왕대, 조릿대, 며느리배꼽, 텔여뀌, 명아주, 금꿩의다리, 은꿩의다리, 짚신나물, 자주꿩의다리, 자주현호색, 돌현호색, 수국자금우, 좀꿩의다리, 막은대쑥, 쑥, 이고들빼기, 솜방망이, 은행나무, 비자나무, 삼나무, 측백나무, 편백, 비슬나무, 느티나무, 무화과나무, 비파나무, 황매화, 꿀피나무, 참느릅나무, 뽕나무, 초피나무, 붉나무, 대팻집나무, 화살나무, 모새나무, 차나무, 텔인동, 딱총나무 등 43種은 葉을 사용하는 것으로 초본류와 목본류가 반반정도이며, 소엽맥문동, 열례지, 맥문동, 마, 참마, 좀깨잎나무, 꽂여뀌, 호장, 소리쟁이, 참소리쟁이, 쇠무릅, 석류풀, 분꽃, 대나물, 사위질빵, 그늘돌찌귀, 으아리, 노루귀, 고삼, 금낭화, 대극, 달맞이꽃, 구릿대, 바다나물, 어수리, 병풀, 기름나물, 앙초, 초풍담, 산해박, 광대수염, 꿀무꽃, 꼽두선이, 마티리, 뚝갈, 하늘타리, 모시대, 잔대, 더덕, 도라지, 개미취, 벌등골나물, 왕고들빼기, 이고들빼기, 청가시덩굴, 냉

Table 1. Distribution of the important medical herb plant in the orea surveyed

| Family name                         | Scientific name  | Korean name   | Name of herb medicine  | Usult Part                                    |
|-------------------------------------|--|---|--|---|
| Commeliaceae<br>닭의 장풀과              | <i>Acorus gramineus</i> SOLANDER<br><i>Commelina communis</i> L.   | 석 창 포<br>닭 의 장 풀  | 石 菖 (蒲)<br>鷄 路 草   | 根 莖<br>全 草                                    |
| Pentederiaceae<br>불옥잠과              | <i>Aneilema keisak</i> HASSK.<br><i>Monochoria vaginalis</i> var.<br><i>plantaginea</i> (ROXB.) SOLM.-LAUB.  | 사 마 귀 풀<br>물 달 개 비  | 水 竹 菜<br>鴨 舌 草   | 全 草<br>全 草                                    |
| Juncaceae<br>꼴풀과                    | <i>Juncus effusus</i> var. <i>decipens</i><br>BUCHEN.  | 꼴풀, 등심초   | 燈 心 草  | 全 草   |
| Liliaceae<br>백합과                    | <i>Luzula capitate</i> (MIQ.) MIQ.<br><i>Allium japonica</i> REGEL<br><i>Hemerocallis dumortieri</i> Morr.<br><i>H. fulva</i> var. <i>kwanso</i> REGEL<br><i>Hemerocallis aurantiaca</i> BAKER<br><i>Hemerocallis minor</i> MILL.<br><i>Hosta longipes</i> (FR. et SAV.) MATSUMURA | 꿩 의 밥<br>산 부 추<br>각시 원추리<br>왕 원 추 리<br>원 추 리<br>애기 원추리<br>비 비 추 | 地 楊 梅<br>一<br>萱 草 根<br>萱 草 -<br>萱 草 根<br>萱 草 根<br>柴 玉 簪        | 莖葉, 果實<br>鱗 莖<br>根, 嫩苗<br>塊 根<br>根, 嫩苗<br>全 草 |
|                                     | <i>Lilium distichum</i> NAKAI<br><i>Lilium lancifolium</i> THUNB.<br><i>Lilium leichtlinii</i> var. <i>tigrinum</i><br>NICHOLS   | 말 나 리<br>참 나 리<br>중 나 리   | 百 合<br>卷丹, 家百合<br>百 合  | 鱗 莖<br>鱗 莖<br>鱗 莖                             |
|                                     | <i>Lilium amabile</i> PALIBIN<br><i>Lilium tsingtauense</i> GILG.<br><i>Liriope platyphylla</i> WANG et TANG.<br><i>Ophiopogon japonicus</i> KER .<br><i>Erythronium japonicum</i> MAKINO<br><i>Polygonatum odoratum</i> var.<br><i>pluriflorum</i>                                | 털 중 나 리<br>하늘 말나리<br>맥 문 동<br>소엽 맥문동<br>얼 레 지<br>등글레, 괴불꽃       | 百 合<br>百 合<br>大 葉 麥 門 多<br>小 葉 麥 門 多<br>車前 葉, 片粟 粉<br>玉 竹, 委 蕤 | 鱗 莖<br>鱗 莖<br>根<br>根<br>根<br>根 莖              |
| Dioscoreaceae<br>마 과                | <i>Smilax japonica</i> BAKER.<br><i>Smilax nipponica</i> MIQ.<br><i>Veratrum mackii</i><br><i>Dioscorea batatas</i> DECA.<br><i>Dioscorea japonica</i> THUNB.<br><i>D. tenuipes</i> FR. et SAV.  | 무 릇<br>선 밀 나 물<br>여 로<br>마                                      | 線 蔷 兒<br>馬 尾 伸 筋<br>黑 藁 蘆 根<br>山 藥, 薯 薯<br>山 藥<br>"            | 全 草<br>根 莖<br>根 莖<br>根<br>根<br>根              |
| Iridaceae 吳萸과<br>생강과                | <i>Iris nertschinskia</i> LODD.  | 각 시 마   | 鳶 蕉 尾  | 根 莖   |
| Zingiberaceae<br>Orchidaceae<br>난초과 | <i>Zingiber migo</i> ROSCOE<br><i>Cymbidium goeringii</i> REICHB. fil.<br><i>Dendrobium moniliforme</i> SWARTZ   | 붓 양 보 춘 석   | 荷 花 春 石  | 根 莖<br>子 實, 皮<br>全 草                          |

| Family name                | Scientific name  | Korean name | Name of herb medicine | Usult Part |
|----------------------------|--|-------------|-----------------------|------------|
| Chloranthaceae<br>흘아비꽃대과   | <i>Chloranthus japonicus</i> SIEB.   | 흘아 비꽃대      | 銀錢草                   | 全草         |
| Melaceae<br>뽕나무과           | <i>Humulus japonicus</i> SIEB. et JUCC..   | 한삼덩굴        | 葎草                    | 果實, 苞      |
| Urticaceae<br>쐐기풀과         | <i>Boehmeria spicata</i> THUNB.  | 좀깨잎나무       | 小赤麻                   | 根          |
|                            | <i>Urtica thunbergiana</i> SIEB. et ZUCC.  | 쐐기풀         | 蕁麻                    | 皮, 全草      |
| Santalaceae<br>단향과         | <i>Thesium chinense</i> TURC.  | 제비풀         | 夏枯草, 百蕊草              | 全草         |
| Aristolochiaceae<br>쥐방울덩굴과 | <i>Asarum sieboldii</i> MIQ.   | 민족도리풀       | 細辛                    | 果皮         |
| Polygonaceae<br>마디풀과       | <i>Persicaria filiforme</i> NAKAI  | 이삭여뀌        | 金錢草                   | 全草         |
|                            | <i>Persicaria perfoliata</i> L.  | 며느리배꼽       | 杜板歸                   | 根莖, 葉      |
|                            | <i>Persicaria senticosa</i> GROSS  | 며느리미씨깨      | 刺                     | 全草         |
|                            | <i>Persicaria sieboldii</i> OHKI.  | 미꾸리낚시       | -                     | 根莖         |
|                            | <i>Polygonum aviculare</i> L.  | 마디풀         | 萹蓄                    | 全草         |
|                            | <i>Polygonum thunbergii</i> SIEB. et ZUCC.                                       | 고마리         | 苦蕎麥                   | 莖葉         |
|                            | <i>Reynoutria japonica</i> HOUTT.,<br><i>Polygonum cuspidatum</i> SIEB. et ZUCC. | 호장근         | 虎杖                    | 根          |
|                            | <i>Rumex acetosa</i> L.  | 수영          | 酸模                    | 根          |
|                            | <i>Rumex coreanus</i> NAKAI, R. <i>crispus</i> L.                                | 소리챙이        | 羊蹄                    | 根          |
| Chenopodiaceae<br>명아주과     | <i>Chenopodium album</i> L. var.<br><i>centrolubrum</i> MAKINO                   | 명아주         | 藜                     | 葉          |
|                            | <i>C. album</i> var. <i>spicatum</i> KOCK.                                       | 흰명아주        | 藜                     | 葉          |
|                            | <i>C. ficifolium</i> SMITH   | 좀명아주        | 藜                     | 葉          |
| Amarantaceae<br>비름과        | <i>Achyranthes japonica</i> NAKAI  | 쇠무릅         | 牛膝                    | 根          |
|                            | <i>Celosia cristata</i> L.   | 맨드라미        | 鷄冠花                   | 花, 種子      |
| Nyctaginaceae<br>분꽃과       | <i>Mirabilis jalava</i> L.   | 분꽃          | 紫茉莉, 白粉花              | 根          |
| Alismataceae<br>파랭이꽃과      | <i>Dianthus chinensis</i> L.   | 때랭이꽃        | 瞿麥                    | 種子         |
|                            | <i>Gypsophila oldhamiana</i> MIQ.  | 대나물         | 銀柴胡                   | 根          |
|                            | <i>Pseudostellaria heterophylla</i><br>(MIQ.) PAX.                               | 개별꽃         | 太子參                   | 塊根         |
|                            | <i>Sagina japonica</i> (SW.) OHWI.   | 개미자리        | 淡姑草                   | 全草         |
| Portulacaceae<br>쇠비름과      | <i>Portulaca oleracea</i> L.   | 쇠비름         | 馬齒莧                   | 莖葉         |
| Caryophyllaceae            | <i>Malandrium firmum</i> ROH.  | 장구채         | 玉不留行                  | 全草         |

| Family name           | Scientific name  | Korean name   | Name of herb medicine   | Usult Part  |
|-----------------------|--|---|---|---|
| 석죽과<br>Ranunculaceae  | <i>Stellaria aquatica</i> SCOP.<br><i>Aconitum uchiyamai</i> NAKAI   | 쇠 별 꽃<br>그늘들찌 귀   | 鵝兒腸<br>-  | 全草<br>根   |
| 미나리아재비과               | <i>Actaea asiatica</i> HARA<br><i>Cimicifuga heracleifolia</i> KOMA.<br><i>Clematis apiifolia</i> L.<br><i>Clematis mandshurica</i> RUPR.<br><i>Hepatica asitica</i> NAKAI<br><i>Ranunculus acris</i> L. var <i>japonica</i><br>f. <i>pleniflorus</i> MAKINO<br><i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.<br><i>Thalictrum actaeifolium</i> SIEB. et ZUCC. | 노 루 삼<br>승 마<br>사 위 질 땅<br>으 아 리<br>노 루 귀<br>미나리아재비<br>평 의 다리<br>은평의 다리 | 綠豆升麻<br>升麻<br>山萎<br>威靈仙<br>獐耳細辛, 三角草<br>莖葉, 根<br>毛茛<br>馬尾連<br>馬尾連 | 根莖<br>莖葉, 根<br>根<br>根<br>莖葉, 根<br>全草<br>根葉種子<br>根葉種子<br>" " " " |
| Papaveraceae<br>양귀비과  | <i>Chelidonium majus</i> L. var.<br><i>asiaticum</i> , <i>C. sinense</i> DC.<br><i>Corydalis incisa</i> PERS<br><i>C. ternata</i> Nakai  | 애 기 동 풀<br>자주현호색<br>들 현 호 색   | 白屈菜<br>地錦苗<br>地錦苗   | 全草<br>葉<br>葉  |
| Brassicaceae<br>심자화과  | <i>Dicentra spectabilis</i> (L.) LEM.<br><i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) MEDICUS.<br><i>Cardamine flexuosa</i> WITHER.,<br><i>C. hirsuta</i> V. var. <i>sylvatica</i><br>LINK.   | 금 낭 화<br>냉 이<br>황 새 냉 이   | 錦囊花<br>蕓<br>蓮   | 根<br>全草<br>全草   |
| Crassulaceae<br>돌나무과  | <i>Draba nemorosa</i> L. var. <i>hebecarpa</i><br><i>Lepidium apetalum</i> WILLD.<br><i>Nasturtium officinale</i> FR. et SAV.,<br><i>Rorippa sublyratum</i>  | 꽃 다 지<br>다 닥 냉 이<br>개 갓 냉 이   | 華歷子<br>華歷子<br>蓬   | 種子<br>種子<br>全草  |
| Saxifragaceae<br>범의귀과 | <i>Orostachys japonicus</i> A. BERGER<br><i>Sedum kamtschaticum</i> FISCH.<br><i>Sedum sarmentosum</i> BUNGE.<br><i>Astilbe chinensis</i> var. <i>davidii</i><br>FR.<br><i>Hydrangea macrophylla</i> var. <i>otaksa</i>  | 바 위 솔<br>기 린 초<br>들 나 물<br>노 루 오 줌<br>수 국                               | 瓦松<br>費指甲<br>石升麻<br>繡瓈花, 紫陽花                                      | 全草<br>全草<br>全草<br>全草, 根莖<br>葉                                   |

| Family name           | Scientific name   | Korean name | Name of herb medicine | Usult Part |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------|------------|
| Rosaceae<br>장미과       | <i>Saxifraga fortunei</i> var.<br><i>glabrescens</i>                                | 바위떡풀        | -                     | 全草         |
|                       | <i>Agrimonia pilosa</i> var. <i>japonica</i>  | 짚신나물        | 龍牙草                   | 葉, 全草      |
|                       | <i>Potentilla chiensis</i> SERINGE  | 딱지꽃         | 委陵菜                   | 全草         |
|                       | <i>Potentilla fragarioides</i> var. <i>major</i><br>MAX.                            | 양지꽃         | 雉子筵                   | 根, 全草      |
| Fabaceae<br>콩과        | <i>Sanguisorba officinalis</i> L.   | 오이풀         | 地榆                    | 莖葉         |
|                       | <i>Astragalus sinicus</i> L.  | 자운영         | 柴雲英                   | 全草         |
|                       | <i>Cassis mimosoides</i> L. var. <i>nomane</i> ,<br><i>C. nomane</i> SIEB. et ZUCC. | 차풀          | 山扁豆                   | 全草         |
|                       | <i>Sophora flavescens</i> AIT.  | 고삼          | 苦參                    | 根, 全草      |
|                       | <i>Dunbaria villosa</i> (THUNB.) MAKINO   | 여우팥         | 野扇豆                   | 全草         |
|                       | <i>Glycine soja</i> SIEB. et ZUCC.  | 돌콩          | 野科豆                   | 種子, 莖葉     |
|                       | <i>Kummerowia striata</i> (THUNB.)<br>SCHINDL.                                      | 가위풀, 매듭풀    | 鷄眼草                   | 莖葉         |
|                       | <i>Trifolium repens</i> L.  | 토끼풀         | 三消草                   | 全草         |
| Oxalidaceae<br>괭이밥과   | <i>Xanthoxalis corniculata</i> SAMLL.   | 팽이밥         | 酢漿草                   | 全草         |
| Polygalaceae<br>원자과   | <i>Polygala japonica</i> HOUTT.   | 애기풀         | 靈神草                   | 莖葉         |
| Acalyphaceac<br>깨풀과   | <i>Acalypha australis</i> L.  | 깨풀          | 鐵莧菜                   | 全草         |
| Euphorbiaceae<br>대극과  | <i>Galarheous sieboldianus</i> HARA.  | 개감수         | 甘遂                    | 根莖         |
|                       | <i>Euphorbia pekinensis</i> RUPR. var.<br><i>japonensis</i> MAKINO                  | 대극          | 大戟                    | 根          |
| Balsaminaceae<br>봉선화과 | <i>Chamaesyce maculata</i> SMALL  | 애기땅빈대       | -                     | 全草         |
| Guttiiferae<br>물레나물과  | <i>Impatiens textori</i> MIQ.   | 물봉선         | 野鳳仙                   | 全草         |
| Violaceae<br>제비꽃과     | <i>Hypericum erectum</i> THUNB.   | 고추나물        | 小連翹                   | 全草         |
|                       | <i>Hypericum japonicum</i> THUNB.   | 애기고추나물      | 地耳草                   | 全草         |
| Oenotheraceae<br>바늘꽃과 | <i>Viola acuminata</i> LEDEB.   | 졸방제비꽃       | 山地丁                   | 全草         |
|                       | <i>Viola mandshurica</i> W. BECKER.   | 제비꽃         | 堇堇菜, 紫花地              | 全草         |
|                       | <i>Viola patrinii</i> DC.   | 흰제비꽃        | 白花地丁                  | 全草         |
|                       | <i>Epilobium pyrricholophum</i> FR. et<br>SAV.                                      | 바늘꽃         | 心膽草                   | 全草         |
| Apiaceae<br>산형과       | <i>Oenothera odorata</i> JACOUL   | 달맞이꽃        | 待宵草                   | 根          |
|                       | <i>Angelica davurica</i> BENT et HOO.   | 구릿대         | 白芷                    | 根          |
|                       | <i>Angelica decursiva</i> FR. et SAV.   | 바디나물        | 前胡                    | 根          |
|                       | <i>Cryptotaenia japonica</i> HASSK.   | 참나물         | 莫草                    | 莖葉         |
|                       | <i>Hydrocotyle willfordii</i> MAX.  | 선피막이        | 遍地錦                   | 全草         |

| Family name                            | Scientific name   | Korean name   | Name of herb medicine | Usult Part |
|--|---|---------------|-----------------------|------------|
| Primulaceae<br>앵초과                     | <i>Peucedanum terebinthaceum</i> FISCH.<br><i>Sanicula elata</i> var. <i>chinensis</i> MAKINO | 기름나물<br>참반디나물 | 石防風<br>變豆菜            | 根<br>根莖    |
|  | <i>Centella asiatica</i>  | 병풀            | 壺草                    | 果實, 根      |
|  | <i>Torilis japonica</i> A.P. DECAN.   | 사상자           | 蛇床子                   | 果實         |
|  | <i>Torilis scabra</i> DC.   | 개사상자          | 蛇床子                   | 果實         |
|  | <i>Lysimachia japonica</i> THUNB  | 좀가지풀          | -                     | 全草         |
|  | <i>Lysimachia clethroides</i> LED.  | 큰까치수영         | 珍珠菜                   | 全草         |
|  | <i>Lysimachia davurica</i> LED.   | 좁쌀풀           | 黃連花                   | 全草         |
|  |   |               |                       |            |
|  |   |               |                       |            |
|  |   |               |                       |            |
| Myrsinaceae<br>자금우과                    | <i>Bladhia japonica</i> Thunberg  | 자금우           | 紫金牛                   | 葉, 根莖      |
| Gentianaceae<br>용담과                    | <i>Gentiana triflora</i> (MIQ.) MAX.  | 초용담, 파남풀      | 草龍膽藥                  | 根          |
|  | <i>Swertia chinensis</i> BUNGE.   | 자주쓴풀          | 當當藥                   | 全草         |
| Apocynaceae<br>협죽도과                    | <i>Trachelospermum asiaticum</i><br>NAKAI var. <i>intermedium</i> NAKAI                       | 마삭줄           | 石絡                    | 根皮, 根樹皮    |
| Asclepiadaceae<br>박주가리과                | <i>Cynanchum paniculatum</i> KITAGAWA<br><i>Cynanchum wilfordii</i> MAX.                      | 산해박           | 白花落                   | 根          |
|  | <i>Metaplexis japonica</i> MAKINO   | 큰조롱           | 白何首烏                  | 塊根         |
| Convolvulaceae<br>메꽃과                  | <i>Calystegia japonica</i> (THUNB.)<br>CHOI.  | 박주가리          | 蘿麻, 羊角菜               | 種子, 葉      |
|  | <i>Cuscuta chinensis</i> L.   | 메꽃            | 施花                    | 根莖, 全草     |
| Boraginaceae<br>지치과<br>Labiatae<br>꿀풀과 | <i>Cuscuta japonica</i> CHOI.   | 실새삼           | 菟絲子                   | 種子         |
|  | <i>Trigonotis peduncularis</i> BENTH.   | 새새삼           | 菟絲子                   | 種子         |
|  | <i>Ajuga multiflora</i> BUNGE.  | 꽃마리           | 附地菜                   | 全草         |
|  | <i>Agastache rugosa</i> O. KUNTZE.  | 조개나물          | 白夏草                   | 全草         |
|  | <i>Ajuga decumbens</i> THUNB.   | 배초향           | 排草香                   | 全草         |
|  | <i>Clinopodium chinense</i> var. <i>vulgare</i><br>(KUDO) HARA                                | 금창초           | 金瘡草                   | 葉          |
|  | <i>Elscholtzia cristata</i> WILLD.,<br>E. patrini GURCKE                                      | 충총이꽃          | 風輪菜                   | 莖, 花葉      |
|  | <i>Isodon japonicus</i> (BURM) HARA   | 향유            | 香薷                    | 全草         |
|  | <i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i>   | 방아풀, 회채화      | 回榮花, 延命草              | 全草         |
|  | <i>Leonurus macranthus</i> MAX.   | 광대수염          | 續斷                    | 根          |
| <i>Leonurus sibiricus</i> L.           | <i>Orthodon punctulatum</i> , <i>Mosla</i>  | 송장풀, 개속관      | -                     | 全草         |
|  | <i>Punctulata</i> MAX.  | 의모초           | 益母草                   | 全草, 種子     |
|  |   | 들깨풀           | 石薺草                   | 全草         |

| Family name            | Scientific name   | Korean name | Name of herb medicine | Usult Part |
|------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|
|                        | <i>Phlomis umbrosa</i> TURCZ.                               | 속           | 續                     | 根          |
|                        | <i>Prunella vulgaris</i> L.                                 | 꿀           | 枯                     | 莖          |
|                        | <i>Scutellaria indica</i> L.                                | 글           | 韓信草                   | 全草, 果種     |
| Solanaceae             | <i>Solanum lyratum</i> THUNB.                               | 배           | 蜀羊                    | 根          |
| 가지과                    | <i>Solanum nigrum</i> L.                                    | 까마          | 龍通                    | 莖葉         |
| Scrophulariaceae       | <i>Mazus japonicus</i> (THUNB.) O. KUNTZ                    | 주름          | 泉                     | 全草         |
| 현삼파                    | <i>Pedicularis resupinata</i> L.                            | 송이          | 馬先蒿                   | 全草         |
|                        | <i>Phtheirospermum japonicum</i> (THUNB.) KANITZ.           | 나도송이        | 松                     | 全草         |
| Acanthaceae<br>쥐꼬리망초과  | <i>Justicia procumbens</i> L.                               | 쥐꼬리망초       | 狀                     | 全草         |
| Phrymaceae<br>파리풀과     | <i>Phryma leptostachya</i> L.                               | 파리풀         | 青草                    | 全草         |
| Plantaginaceae<br>질경이파 | <i>Plantago major</i> L. var. <i>asiatica</i>               | 질경이         | 前子                    | 全草, 種子     |
| Rubiaceae              | <i>Galium aparine</i> L.                                    | 갈퀴덩굴        | 人仙草                   | 全草         |
| 꼭두서니과                  | <i>Paederia scandens</i> (LOUR.) MEER.                      | 계요등         | 雞屎藤                   | 全草         |
|                        | <i>Rubia akane</i> NAKAI                                    | 꼭두서니        | 茜草                    | 根          |
| Valerianaceae<br>마타리파  | <i>Patrinia scabiosaeifolia</i> FISH.                       | 마타리         | 敗醬, 女郎花               | 根          |
| Ourcubitaceae<br>박파    | <i>Patrinia villosa</i> (THUNB.) JUSS.                      | 똑갈          | 敗醬                    | 根          |
| Companulaceae<br>초롱꽃과  | <i>Trichosanthes kirilowii</i> MAXI.                        | 하늘타리        | 天瓜, 枯櫻                | 根          |
| Compositae<br>국화과      | <i>Adenophora remotiflora</i> (SIEB. et ZUCC.) MIQ.         | 모시대         | 茺蔚                    | 根          |
|                        | <i>Adenophora triphylla</i> var. <i>japonica</i> HARA       | 잔대          | 茺蔚, 沙蓼                | 根          |
|                        | <i>Codonopsis lanceolata</i> BENTHAM                        | 더덕          | 洋梗                    | 根          |
|                        | <i>Platycodon glaucum</i> NAKAI                             | 도라지         | 枯梗                    | 根          |
|                        | <i>Artemisia capillaris</i> THUNB.                          | 사철쑥         | 陳蒿                    | 全草         |
|                        | <i>Artemisia japonica</i> THUNB.                            | 제비쑥         | 杜蒿                    | 全草         |
|                        | <i>Artemisia keiskeana</i> MIQ.                             | 맑은대쑥        | 拘乳花, 蒼蒿               | 種子, 葉      |
|                        | <i>Aster scabra</i> THUNB.                                  | 참취          | 東風菜                   | 全草         |
|                        | <i>Artemisia vulgaris</i> L. var. <i>vulgatissima</i> BESS. | 쑥           | 艾, 艾蒿, 蓬              | 葉          |
|                        | <i>Aster indicus</i> L., <i>A. lautureanus</i> FR.          | 쑥부쟁이        | 鷄兒腸, 嫁菜               | 全草         |
|                        | <i>Artemisia iwayomogi</i> KITAMURA                         | 더위지기        | 韓菌                    | 全草         |
|                        | <i>Aster tataricus</i> L.                                   | 개미취         | 陳莞                    | 根          |
|                        | <i>Aster trinervius</i> var. <i>congestus</i> .             | 까실쑥부쟁이      | 山白菊, 馬蘭               | 全草         |

| Family name | Scientific name   | Korean name    | Name of herb medicine | Usual Part |
|-------------|---|----------------|-----------------------|------------|
|             | <i>Atractylodes japonica</i> KOIZUMI                          | 삼주             | 蒼朮, 白朮                | 根莖         |
|             | <i>Bidens bipinnata</i> L.                                    | 도깨비마늘          | 鬼針菜, 鬼鍼鍼              | 莖葉         |
|             | <i>Carpesium abrotanoides</i> L.                              | 담배풀            | 鶴虱                    | 果實, 葉      |
|             | <i>Centipeda minuta</i> KUNTZ                                 | 중대가리풀          | -                     | 莖葉         |
|             | <i>Chrysanthemum lavandulifolium</i>                          | 산국             | 山菊                    | 花          |
|             | <i>Cirsium maackii</i> MAX.                                   | 엉겅퀴, 가시나물, 향가새 | 大薊                    | 莖葉         |
|             | <i>Eclipta prostrata</i> L.                                   | 한련초            | 旱蓮草                   | 全草         |
|             | <i>Erigeron annus</i> (L.) PERS.                              | 개망초            | 一年蓬                   | 全草         |
|             | <i>Erigeron canadensis</i> L.                                 | 망초             | 小飛蓬                   | 全草         |
|             | <i>Eupatorium chinens</i> var.<br><i>simplicifolium</i> KITA. | 등골나물           | 澤蘭                    | 全草         |
|             | <i>Eupatorium fortunei</i> TURCZ.                             | 별등골나물          | 蘭草                    | 根          |
|             | <i>Gnaphalium affine</i> D. DON.                              | 떡쑥             | 鼠麴草                   | 全草         |
|             | <i>Hemistepta lyrata</i> BUNGE                                | 지청개            | 泥胡菜                   | 全草         |
|             | <i>Senecio vulgaris</i> L.                                    | 개쑥갓            | 劉寄如草                  | 全草         |
|             | <i>Lactuca dentata</i> var. <i>thunbergii</i> .               | 笞巴귀            | 苦菜, 黃瓜菜               | 莖草         |
|             | <i>Lactuca dentifolata</i> var. <i>typica</i> .               | 이고들빼기          | 苦賈菜                   | 根          |
|             | <i>Lactuca indica</i> var. <i>Laciata</i><br>(OKUNTZE) HARA   | 왕고들빼기          | 白龍頭                   | 根          |
|             | <i>Petasites japonicas</i> MAXI                               | 머위             | 蕗                     | 花亭, 根莖     |
|             | <i>Senecio campestris</i> DC.                                 | 송방망이           | 蕗                     | 葉          |
|             | <i>Siegesbeckia glabrescens</i> MAKINO                        | 진득찰            | 蕎                     | 果實, 葉      |
|             | <i>Solidago virgaurea</i> L.                                  | 미역취            | 黃花                    | 全草         |
|             | <i>Synurus palmatopinnatifolia</i> var.<br><i>indivisus</i> . | 수리취            | -                     | 全草         |
|             | <i>Taraxacum platycarpum</i> H. DAHL                          | 민들레            | 蒲公英                   | 全草, 根      |
|             | <i>Taraxacum officinale</i> WEBER                             | 서양민들레          | 蒲公英                   | 全草, 根      |
|             | <i>Youngia japonica</i> (L.) DC.                              | 뽀리뱅이           | 黃花菜                   | 全草         |

맹이덩굴, 땅비싸리, 싸리나무, 개머루, 박쥐나무, 두릅나무, 노린재나무, 거지덩굴, 누리장나무 등 54種은 根을 사용하는 것으로 거의가 초본류이다. 根莖을 사용하는 것은 관중, 비늘고사리, 고사리, 고비, 가래, 띠, 참억새, 억새, 갈대, 용등굴레, 죽대, 등굴레, 선밀나물, 여로, 개감수, 머위, 봇꽃, 양파, 머느리배꼽, 미꾸리낚시, 노루삼, 참반디나물, 속단, 삽주, 조뱅이 등 25種으로 전부 草本類이며 특히 양치類와 외떡잎식물이 많았다. 塊莖을 사용하는 것으로는 천남성, 큰천남성, 원추리, 개별꽃, 등 4種으로 천남성과의 대부

분을 포함하는 草本類였다. 鞭莖을 이용하는 것은 산부추 텔중나리, 말나리, 참나리, 중나리, 하늘말나리 등 6種으로 전부 백합과 였다. 화분을 이용하는 것으로는 부들, 花를 이용하는 것으로는 자귀풀, 총총이꽃, 산국, 맨드라미, 황매화, 밤나무, 참동, 합박꽃나무, 진달래, 텔인동, 딱총나무등 11種, 內皮 또는 中皮를 이용하는 것은 왕대 1種, 根皮를 사용하는 것은 산뽕나무, 으름, 가죽나무, 참죽나무, 멀구슬나무 엄나무, 무화과나무, 마삭줄 등 8種으로 전부 木本類이며, 樹皮 또는 莖皮를 사용하는 것은 쐐기풀, 오

리나무, 떡갈나무, 신갈나무, 비슬나무, 참느릅나무, 꾸지뽕나무, 뽕나무, 박태기나무, 꽁꽁나무, 사철나무, 피나무, 벚나무, 자귀나무, 싸리나무, 소태나무, 사람주나무, 대팻집나무, 말오줌대, 신나무, 갈매나무, 두릅나무, 물푸레나무, 마삭줄, 등 25種으로 거의 대부분 木本類이다.

渗出液을 사용하는 것은 소나무, 은행나무는 종자심립, 굴피나무는 嫩茅, 팽나무, 소태나무, 차나무는 木部, 생강나무는 幼竽, 주염나무는 刺, 붉나무는 蟲蠻, 개옻나무는 樹脂, 무화과나무는 擬果, 감나무는 粵片, 누리장무나는 枝條, 보춘화와 쪽은 子實, 애기원추리는 嫩苗, 삼은 未熟果, 한삼덩굴은 苞, 꿀풀은 果穗등을 사용한다. 果皮를 이용하는 것은 민족도리풀, 산초나무, 민산초, 根枝를 이용하는 것은 으름, 種子를 사용하는 것은 개피, 맨드라미, 패랭이꽃, 꿩의다리, 금, 은 평의다리, 꽃다지, 다팔냉이, 돌콩, 박주가리, 실새삼, 새삼, 미치광이, 맑은대쑥, 가래나무, 개비자나무, 비자나무, 상수리나무, 초피나무, 참빛쌀나무, 개살구나무, 말오줌대, 좀목형 등 23種, 果實을 사용하는 것은 평의 밤, 병풀, 마름, 담배풀, 은행나무, 노간주나무, 깃벼들, 오리나무, 밤나무, 멱구슬나무, 팽나무, 비파나무, 모파나무, 뽕나무, 생강나무, 개살구나무, 아그배나무, 비슬나무, 철레나무, 수리딸기, 복분자딸기, 느리나무, 주염나무, 초피나무, 소태나무, 사람주나무, 붉나무, 대팻집나무, 허깨나무, 개암나무등 31종으로 거의 木本類이다.

草本類는 주로 全草와 根, 塊根, 등을 사용하며, 木本類는 葉, 根皮, 樹皮, 果實등을 사용하고, 根莖은 주로 외떡잎식물과 양치類에서 많이 사용되고, 鳞莖을 사용하는 것은 전부 백합과 식물을 이용하는 것은 尹(1989)의 笠岩山의 보고와 같은 경향이었다.

## 摘要

月出山 地域에 分布되어 있는 漢藥 資源植物을 莽集 分類하여 利用體系 確立의 手段으로 삼고자 이 地域의 藥用植物의 種類를 調査한 結果는 다음과 같다.

1. 月出山에 分布되어 있는 藥用資源植物은 110科, 266屬, 338種이었다.

2. 分布樹種中 草本類는 62科, 180屬, 228種, 木本類는 50科, 88屬, 110種이었다.

3. 草本類는 主로 全草 또는 根을, 木本類는 樹皮 果實이 漢藥材料로 많이 使用되어지는 것이었다.

Table 2. Distribution of the important medical woody plant in the area surveyed.

| Family name             | Scientific name  | Korean name                        | Name of herb medicine | Usual Part         |
|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Ginkgoaceae<br>은행나무과    | <i>Ginkgo biloba</i> L.  | 은행나무                               | 銀杏, 白果, 白仁            | 果實, 葉<br>種子心林      |
| Taxaceae<br>주목과         | <i>Cephalotxus drupacea</i> SIEB. et ZUCC.<br><i>Taxus cuspidata</i> SIEB. & ZUCC.   | 개비자나무<br>주목                        | 粗榧<br>一一位             | 榧<br>葉             |
| Pinaceae<br>소나무과        | <i>Torreya nucifera</i> SIEB. et ZUCC.<br><i>Pinus densiflora</i> SIEB. et ZUCC.<br><i>Pinus koraiensis</i> SIEB. et ZUCC. | 비자나무<br>소나무<br>잣나무                 | 榧實<br>赤松<br>柏海松, 支那子  | 種子, 葉<br>滲出液<br>種子 |
| Cryptomeriaceae<br>낙우송과 | <i>Cryptomeria japonica</i> D. DEN.,<br><i>Biota orientalis</i> ENDL.,<br><i>Thuja orientalis</i> L.                       | 삼나무<br>측백나무<br>Thuja orientalis L. | 杉, 倭木<br>柏子仁<br>叢柏    | 葉<br>葉<br>葉        |
| Cupressaceae<br>측백나무과   | <i>Chamaecyparis obtusa</i> SIEB. et ZUCC.   | 편백                                 | 檜扁柏                   | 葉                  |

| Family name                     | Scientific name  | Korean name                              | Name of herb medicine        | Usult part                 |
|---------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|
| <i>Juniperaceae</i><br>향나무과     | <i>Juniperus rigida</i> SIEB. et ZUCC.<br><i>Juniperus Chinensis</i> L.  | 노 간 주 나 무<br>향 나 무                       | 杜 松 實<br>香 木 葉               | 果 實<br>葉                   |
| <i>Liliaceae</i><br>백합과         | <i>Smilax china</i> L.<br><i>Smilax sieboldii</i> MIQ  | 청 미 래 뎅 굴<br>청 가 시 뎅 굴                   | 土 苣 苓<br>粘 魚 須               | 根 茎<br>根                   |
| <i>Salicaceae</i><br>버드나무과      | <i>Populus monilifera</i> AIT.<br><i>Salix gracilistyla</i> MIQ<br><i>Populus davidiana</i> DODE   | 미 류<br>갯 벼 들<br>사 시 나 무                  | -<br>滿 柳 , 水 楊<br>-<br>化 香 樹 | 樹 枝<br>果 實 皮<br>樹 皮        |
| <i>Juglandaceae</i><br>가래나무과    | <i>Platycarya strobilacea</i> SIEB et ZUCC.<br><i>Juglans mandshurica</i> MAXI.  | 글 피 나 무                                  | 嫩芽, 葉                        |                            |
| <i>Betulaceae</i><br>자작나무과      | <i>Corylus sieboldiana</i> var. <i>mandshurica</i> (MAX.) C.K. SCHNEID.<br><i>Corylus heterophylla</i> var. <i>thunbergii</i> BLUME.           | 가 래 나 무<br>물 개 암 나 무<br>개 암 나 무          | 楸 木 子<br>榛 子<br>榛 山 白 果      | 種 子<br>種 子<br>果 實          |
| <i>Fagaceae</i><br>참나무과         | <i>Castanea crenata</i> SIEB. et ZUCC.<br><i>Quercus acutissima</i> CARRU.<br><i>Quercus dentata</i> THUNB.<br><i>Quercus mongolica</i> FISCH. | 밤 나 무<br>상 수 리 나 무<br>떡 갈 나 무<br>신 갈 나 무 | 栗 木<br>土骨皮, 木樂<br>槲 皮<br>柞 皮 | 果實, 花<br>種 子<br>皮 皮<br>皮 皮 |
| <i>Ulmaceae</i><br>느릅나무과        | <i>Celtis sinensis</i> PERS. var. <i>japonica</i><br><i>Ulmus progingua</i> var. <i>japonica</i><br><i>Zelkova serrata</i> MAKINO              | 팽 나 무<br>비 술 나 무<br>느 티 나 무              | 朴樹, 加條木<br>野 榆<br>野 榆        | 木部, 葉<br>果 實<br>樹皮實        |
| <i>Molaceae</i><br>뽕나무과         | <i>Ulmus parvifolia</i> JACQ.<br><i>Ficus carica</i> L.<br><i>Curdaria tricuspidata</i> BURE.  | 참 느 릅 나 무<br>무 화 과 나 무<br>꾸 지 뽕 나 무      | 榆 皮, 葉<br>花 果<br>柘 木         | 樹皮, 葉<br>葉, 櫻果             |
| <i>Lardizabalaceae</i><br>으름덩굴과 | <i>Morus alba</i> L.<br><i>Morus bombycis</i> KOITZUMI<br><i>Akebia quinata</i> DEENE.   | 뽕 나 무<br>산 뽕 나 무<br>으 름                  | 桑 葉<br>桑 白<br>木 通            | 樹皮<br>果 實<br>根 枝           |
| <i>Menispermaceae</i><br>방기과    | <i>Cocculus trilobus</i> DC.   | 댕 맹 이 덩 굴                                | 防 己                          | 根                          |
| <i>Magnoliaceae</i><br>목련과      | <i>Magnolia sieboldii</i> KOCH.  | 합 박 꽃 나 무                                | 花 女                          | 花                          |
| <i>Lauraceae</i><br>동나무과        | <i>Benzoin obtusilobum</i> LIND  | 생 강 나 무                                  | 梅 木                          | 小枝, 果 實, 幼 荚               |
| <i>Spiraeaceae</i><br>조팝나무과     | <i>Spiraea prunifolia</i> var. <i>simpliciflora</i>  | 조 팜 나 무                                  | 常 山                          | 根                          |
| <i>Ponaceae</i>                 | <i>Malus sieboldii</i> REHDER.   | 아 그 배 나 무                                | 棠 梨                          | 果 實                        |
| 배나무과                            | <i>Chaenomeles sinensis</i> KOEHNNE  | 모 과 나 무                                  | 木 瓜 花 梨 木                    | 果 實                        |

| Family name              | Scientific name   | Korean name | Name of herb medicine | Usult Part |
|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|
| Rosaceae<br>장미과          | <i>Eriobotrya japonica</i> LINDEL                           | 비파나무        | 枇杷葉                   | 葉, 種仁      |
|                          | <i>Duchesnea indica</i> FOCK.                               | 뱀딸기         | 蛇莓                    | 全草         |
|                          | <i>Rosa polyantha</i> var. <i>genuina</i>                   | 젤레나무        | 野薔薇營實薔薇               | 果實         |
|                          | <i>Rubus corchorifolius</i> L. fil                          | 수리딸기        | 懸鈎子                   | 果實         |
|                          | <i>Rubus coreanum</i> MIQ.                                  | 복분자딸기       | 覆盆子                   | 果實         |
|                          | <i>Rubus pravifolius</i> L.                                 | 명석딸기        | 芽莓                    | 全株         |
| Drupaceae<br>앵도나무과       | <i>Kerria japonica</i> (L.) DC.                             | 황매화         | 棣棠花                   | 花, 枝葉      |
|                          | <i>Prunus serrulata</i> var. <i>spontanea</i> (MAX.) WILS   | 벗나무         | 樺皮                    | 樹皮         |
|                          | <i>Prunus manshurica</i> KOEHNE                             | 개살구나무       | 拘杏                    | 果實種子       |
| Fabaceae<br>콩과           | <i>Albizia julibrissin</i> DVRAZZ.                          | 자귀나무        | 合觀皮                   | 樹皮         |
|                          | <i>Gleditschia japonica</i> var. <i>koraiensis</i>          | 주염나무        | 阜莢, 阜角樹               | 果實, 刺      |
|                          | <i>Wistaria floribunda</i> DC.                              | 참등          | 紫藤                    | 花          |
| Rutaceae<br>운향과          | <i>Indigofera kirilowii</i> MAXI.                           | 땅비싸리        | 山豆根                   | 根          |
|                          | <i>Lespedeza bicolor</i> var. <i>japonica</i>               | 싸리나무        | 山萩, 胡枝子               | 根, 樹皮      |
|                          | <i>Lespedeza cuneata</i> G. DON.                            | 비수리         | 鉢搗簪, 著萩               | 莖葉         |
|                          | 531. <i>Cercis chinensis</i> BUNGE                          | 박태기꽃나무      | 紫荆                    | 皮部         |
|                          | 549. <i>Lespedeza virgata</i> DC.                           | 啻arsi       | 繪萩                    | 莖葉         |
|                          | <i>Pueraria hirsuta</i> MATSUM.                             | 풀싸리         | 葛根                    | 根          |
|                          | <i>Robinia pseudo-acacia</i> L.                             | 아카시아나무      | 刺檉                    | 葉, 全草      |
|                          | <i>Orixa japonica</i> THUNBERG                              | 송장나무        | 和常山                   | 根葉         |
|                          | <i>Zanthoxylum schinifolium</i> var. <i>inermis</i> T. LEE. | 민산초         | 山椒                    | 果皮         |
|                          | <i>Zanthoxylum piperitum</i> DC.                            | 초피나무        | 川椒, 山椒                | 種子, 果實, 葉  |
| Simarubaceae<br>소태나무과    | <i>Ailanthus altissima</i> SWINGLE                          | 가죽나무        | 假僧木                   | 根皮         |
|                          | <i>Picrasma quassoides</i> BENN.                            | 소태나무        | 苦僧木                   | 樹皮, 果實, 木部 |
| Meliacee<br>멸구슬나무과       | <i>Cedrela sinensis</i> JUSS.                               | 참죽나무        | 真僧木                   | 新芽         |
|                          | <i>Melia azedarach</i> L. var. <i>japonica</i>              | 멸구슬나무       | 苦棟木                   | 根皮, 果實, 樹皮 |
| Phyllanthaceae<br>여우주머니과 | <i>Securinega suffruticosa</i> REHDON.                      | 광대싸리        | 一葉萩黃荆                 | 全草         |
|                          | <i>Mallotus japonicus</i> UNELL.                            | 예덕나무        | 野洞, 橄樹                | 葉          |
| Euphorbiaceae<br>대극과     | <i>Triadica japonica</i> BAIL.                              | 사람주나무       | -                     | 木部, 果實, 樹皮 |
|                          | <i>Rhus chinensis</i> L., <i>R. japonica</i> L.             | 曷나무         | 五倍子                   | 葉, 果實      |
| Anacardiaceae<br>옻나무과    | <i>Rhus verniciflua</i> STOKES.                             | 옻나무         | 漆樹                    | 蟲膠, 新乳     |
|                          |   |             |                       | 芽液         |

| Family name                   | Scientific name   | Korean name           | Name of herb medicine | Usult Part            |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Aquifoliaceae</i><br>김탕나무과 | <i>Ilex macropoda</i> MIQ.<br><i>Ilex crenata</i> THUNB.  | 대팻집나무<br>꽝꽝나무         | -<br>假黃楊              | 果實, 樹葉, 葉皮            |
| <i>Celastraceae</i><br>노박덩굴과  | <i>Celastrus orbiculatus</i> THUNB.<br><i>Euonymus striata</i> loes. var.<br><i>alatus</i><br><i>Masakia japonica</i> | 노박덩굴<br>화살나무          | 南蛇藤<br>衛矛鬼箭           | 莖葉                    |
| <i>Staphyleaceae</i><br>고추나무과 | <i>Euonymus sieboldianus</i> BLUME.<br><i>Euscaphis japonica</i> (THUNB.)<br>KANTZ.                                   | 사철나무<br>참빛쌀나무<br>말오줌대 | 和杜沖<br>桃葉衛矛<br>野鴉椿    | 樹皮, 葉種子<br>種子, 葉根, 樹皮 |
| <i>Aceraceae</i><br>단풍나무과     | <i>Acer ginnala</i> MAXI.   | 신나무                   | 色木楓樹                  | 樹皮                    |
| <i>Rhamnaceae</i><br>갈매나무과    | <i>Hovenia dulcis</i> var. <i>glabra</i> KANTZ.<br><i>Rhamnus davurica</i> PALLAS.                                    | 허깨나무<br>갈매나무          | 枳棋                    | 果實果柄                  |
| <i>Buxaceae</i><br>회양목과       | <i>Buxus koreana</i> Nakai  | 회양목                   | 黃楊                    | 枝葉                    |
| <i>Malvaceae</i><br>아욱과       | <i>Hibiscus syriacus</i> L.   | 무궁화나무                 | 木謹, 舜花                | 花, 根皮                 |
| <i>Tiliaceae</i><br>庇나무과      | <i>Tilia amurensis</i> Rupr. var.<br><i>barbigera</i>   | 庇나무                   | -                     | 果實<br>樹皮, 莖           |
| <i>Vitaceae</i><br>포도과        | <i>Ampelopsis heterophylla</i> SIEB.<br>et ZUCC.  | 개머루                   | 蛇葡萄                   | 根                     |
|                               | <i>Cissus japonica</i> MERR.<br><i>Parthenocissus thunbergii</i> NAKAI  | 거지덩굴                  | 烏莓                    | 根                     |
|                               | <i>Vitis amurensis</i> RUPR.  | 담쟁이덩굴                 | 葛棉                    | 莖葉                    |
| <i>Dilleniaceae</i><br>다래나무과  | <i>Actinidia arguta</i> PLANCH<br><i>Actinidia polygama</i> (SIEB. et<br>ZUCC.)                                       | 왕며루<br>다래나무<br>개다래    | 朝鮮葡萄<br>獮猴木天蓼         | 果實<br>果實莖皮<br>果實      |
| <i>Ternstroemiacae</i>        | <i>Thea sinensis</i> L.   | 차나무                   | 茶茗, 茶葉                | 枝果葉, 實材               |
| 차나무과                          | <i>Camellia japonica</i> L.   | 동백나무                  | 山茶木                   | 種子                    |
| <i>Elaeagnaceae</i><br>보리수과   | <i>Elaeagnus umbellata</i> THUNB.   | 보리수나무                 | 牛奶奶子                  | 果實                    |
| <i>Araliaceae</i>             | <i>Aralia elata</i> SEEM.   | 두릅나무                  | 櫟木, 木頭茶               | 根, 果實皮                |
| 두릅나무과                         | <i>Hedera rhombea</i> BEAN.   | 송악                    | 常春藤                   | 莖葉                    |
| <i>Alangiaceae</i><br>박쥐나무과   | <i>Marlea platanifolia</i>  | 박쥐나무                  | 瓜木                    | 根                     |
| <i>Cornaceae</i><br>총총나무과     | <i>Cornus controversa</i> Hems1.  | 충충나무                  | 燈臺木, 涼子木              | 葉, 樹皮                 |
| <i>Ericaceae</i>              | <i>Rhododendron mucronulatum</i><br>TURCZ.  | 진달래                   | 杜鵑花                   | 花                     |

| Family name            | Scientific name  | Korean name                   | Name of herb medicine      | Usult Part       |
|------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| Symplocaceae<br>노린재나무과 | <i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.<br><i>Symplocos chinensis</i> for. <i>pilosa</i> (NAK.) OHWI.                       | 모 새 나 무<br>노린재 나 무            | 南 燭<br>華 山 鑾               | 葉<br>小枝, 根       |
| Styracaceae<br>때죽나무과   | <i>Styrax obassia</i> SIEB. et ZUCC.<br><i>Styrax japonica</i> SIEB. et ZUCC.  | 쪽 동 백<br>때 죽 나 무              | 玉 鈴 花<br>齊 嫩 果             | 果 實<br>實 實       |
| Ebenaceae<br>감나무과      | <i>Diospyros kaki</i> var. <i>domestica</i> D. KAKI TH.<br><i>Diospyros lotus</i> L.                                   | 감 나 무<br>고 음 나 무              | 柿<br>小 柿                   | 果 實<br>實 片       |
| Oleacea<br>물푸레나무과      | <i>Forsythia koreana</i> NAKAI<br><i>Fraxinus rhynchophylla</i> HANCE.<br><i>Ligustrum obtusifolium</i> SIEB. et ZUCC. | 개 나 리<br>물 푸 레 나 무<br>쥐 똥 나 무 | 連<br>水 倉 木, 水 拐 柳<br>水 蟻 果 | 果 實<br>皮 皮       |
| Apocynaceae<br>엽죽나무과   | <i>Trachelospermum asiaticum</i> NAKAI   | 마 쑥 줄                         | 絡 石, 白 花 落                 | 根, 皮             |
| Verbenaceae<br>마면초과    | <i>Clerodendron trichotomum</i> THUNB.<br><i>Vitex negundo</i> var. <i>incisa</i> (LAM.) C.B. CLARKE                   | 누 리 장 나 무<br>좀 목 형            | 海 州 常 山<br>牧 荆             | 根, 樹 皮<br>枝 條, 根 |
| Caprifoliaceae<br>인동파  | <i>Lonicera japonica</i> TH. var. <i>repens</i><br><i>Sambucus willianisii</i> MANCE var. <i>coreana</i> NAKAI         | 털 인 동<br>딱 총 나 무              | 金 銀 花, 忍 冬<br>高 麗 接 骨 木    | 枝 葉<br>花 , 葉     |

## 参考文献

- 都象學, 1988. 한국의 약용식물 자원. 天然物科學. 서  
울대학교 出版部. p. 259 ~ 314.
- 朴仁鉉, 1976. 藥草植物栽培. 先進文化社.  
p. 226 ~ 249.
- 白允基, 1975. 現代草本學. 高文社. p. 649 ~ 650.
- 李鍾一, 1988. 全南地域 漢藥資源植物 蒐集分類 및 利用體系에 關한 研究. III. 曹溪山  
漢藥資源植物 分布 調查. 東洋資源植物學會  
誌. 1: 93 ~ 116.

- 李昌福, 1989. 大韓植物 圖鑑. 鄉文社.
- 洪種夏, 1966. 東醫寶鑑. 豊年社. 1195.
- 朴萬奎·朴弘惠, 1972. 海南大屯山의 植物相. 海南大  
屯山 綜合學術報告書, pp. 151 ~ 178.
- Uyeki. H., 1941, On the Northern Limit of  
the Evergreen Broad leaved Forest  
Belt in Korea, Acta Phytotax. et,  
Geobot. Vol. 10: 89 ~ 93.