

## 일부 도시지역 부인의 장기 피임실시에 관한 실태조사

공중보건잡지, vol. 10, No. 1, pp. 17~26, 1973.

이 봉 우

가족계획을 실시하기 위하여 1967년 68년 69년 3년간에 걸쳐 강원도 원주시 보건소에 등록된 가족계획 피임실시자 2,083명중 등록일로부터 2년간 피임방법을 계속 사용하여 온 764명을 대상으로 이들의 실태를 등록상담기록부를 통하여 조사한 바 다음과 같은 결과를 얻었다.

1. 1967년에서 1969년까지 가족계획을 실시하기 위하여 보건소에 등록된 부인의 63.9%가 1년내에 퇴락하였으며 19.7%가 2년이상 계속 등록하고 있었다.
2. 자의로 보건소를 방문하고 등록한 부인은 지도원이 부락현지에서 등록시킨 부인들 보다 장기피임을 실시하는 비율이 훨씬 높았다.
3. 연차적으로 30세 미만의 부인들의 장기피임실시율이 높아지는 경향이 있으며 40세 이상 부인의 장기피임실시율이 점차 감소하는 경향이 있었다.
4. 고졸학력이하의 부인에서는 학력이 낮은 부인일수록 장기피임 실시율이 높았으며 대졸학력 소지부인에서는 중고졸 부인군보다 장기피임 실시율이 높았다.
5. 연도별로 점차 현존여자수가 적은 부인들의 장기피임실시 참여율이 높아지고 있었다.
6. 등록이전에 피임방법을 사용한 경험이 없었던 부인이 피임방법의 경험이 있었던 부인에 비해 장기피임을 실시하는 율이 높았다.
7. 등록이전에 인공유산의 경험이 없는 부인이 인공유산의 경험이 있는 부인에 비해 장기피임을 실시하는 율이 높았다.

## 부산 송도지역 주민의 모자보건에 관한 실태조사

중앙의학 25권 4호, 1973.

조 성 희