

4. 가족과 보건간호사 상호실현성이 있는 간호목표를 설정하고 시행방침을 정리한다.
5. 가족과 함께 간호에 필요한 지역사회 자원에 대해 알아본다.
6. 활동계획을 작성한다.
7. 가족건강 문제의 해결에 대한 간호의 효과를 측정한다.

농촌에 있어서의 모자보건 실태 현황 — 경기도 광주군 초월면 서하리를 중심으로 —

최신의학 18권 2호, pp. 237~245, 1975.

조희숙 · 이나미

본 연구의 주요목적은 우리나라 일부농촌지역에 있어서 모자보건에 관한 실태를 파악하여 우리나라 모자보건사업의 발전에 기여하고자 하는데 있다.

본 조사는 1974년 7월 23일부터 15일간에 걸쳐 자매부락인 경기도 광주군 초월면 서하리 지역을 중심으로 여자 1명 이상을 가진 부인 174명을 대상으로 사전교육을 받은 조사원(경희간호전문학교학생) 16명이 미리 작성된 질문지에 의거 가정방문을 실시한 바 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 조사대상자의 특성

대상부인 174명의 일반적특성을 살펴보면 다음과 같다.

연령, 교육, 생활정도

대상부인의 연령구조는 35~39세군이 35.6%로 가장 많고 평균연령은 38.0세였으며 남편과의 연령차이는 5세이하가 72.4%로 대부분이었다. 교육수준은 국민학교 학력군이 75.8%로 낮은 교육수준을 보였다. 또 조사자 자신의 평가에 의한 생활정도는 중류가 54.0%로 비교적 높은 생활수준이었다.

2. 결혼 및 임신, 결혼기간

1) 결혼연령 및 초산연령

부인의 결혼연령은 19~20세가 27.5%로 가장 많고 평균연령은 19.4%였다.

부인의 결혼기간은 15~19년이 21.8%로 가장 많고 20~23세에 출산을 경험한 부인이 전체의 46.5%이며 평균초산연령은 22.2세였다.

2) 임신횟수 및 현존자녀수

임신경험횟수는 6회의 경험이 15.0%로 가장 높고 평균 임신횟수는 5.4회였다.

현존자녀수는 자녀 4명을 가진부인이 28.1%로 가장 많고 평균자녀수는 4.1명이었다.

3. 분만환경

분만장소는 가정분만이 95.4%로 대부분이며 제대절단방법을 알아보면 가위 사용이 97.8%로, 소독을 하지 않고 사용한 예가 89.6%이다. 분만시산포로서는 세멘푸대가 44.2%로 가장 많았다.

4. 가족계획에 대한 태도 및 실천

가족계획에 대한 찬성율은 95.0%이었으나 가족계획에 대한 실천율은 42.6%가 현재실시중에 있으며 연령별로는 35~39세군이 21.8%로 가장 높은 실시율을 보여주고 있다. 이상적자녀수는 4명이 38.5%, 3명이 36.2%로 대부분이 3~4명의자녀를 원하고 있다.

5. 영유아 보건

1) 모유를 사용하고 있는 것이 98.8%로 대부분을 차지하며 2%만이 우유로서 양육을 하였다.

2) 이유기에 있어 먼저 이유란 용어의 어의를 주식으로 3분지 2가 모유나 우유가 아닌 다른음식에 의해서 양육되는 것을 이유라 규정하고 2년이상 60%로 대부분이며 1년까지는 40%를 보였다.

3) 예방접종상황을 보면 전혀 예방접종을 받은 일이 없는 아이는 11.4% 한가지이상 접종을 받은 아이는 15.2%, 보사부에서 규정한 법적 예방접종의 전종류를 완전히 실시한 아이는 34.2%였다.

폐결핵환자 가정간호에 관한 일 사례 연구

대한간호, Vol. 14, No. 3, pp. 56~62, 1975.

차 정 순

1974년 2월 25일부터 1975년 4월 20일까지 통원치료를 받는 폐결핵환자의 가족을 대상으로 폐결핵환자의 생리와 심리를 파악하며, 환자교육으로 폐결핵에 대한 올바른 지식을 가지고 회복을 도우며, 가족에게는 전염을 예방하고 환자의 요구와 문제중심의 상황을 관찰하며, 문제해결의 간호계획을 세워 가정간호를 하였다. 관찰된 결과는 다음과 같은 결론을 얻었다.