

1. 환자와 가족에게 교육을 실시하여 결핵을 이해하고 개인위생과 가족위생의 올바른 가정간호를 시행하여 가족에게 전염을 예방하게 되었다.
2. 환자의 심리적인 불안제거는 가족이 환자에게 친절하게 위로와 용기를 주어서 환자의 불안한 마음은 안정되고 해소되었다.
3. 충분한 영양섭취로 체중은 4kg나 증가되었다.

## 인천시 일부 모성의 산후안정일수에 대한 조사연구

경기간호전문학교 논문집, Vol. 7, pp. 69~91, 1976.

김 경 속

저자는 1975년 5월 20일부터 6월 20일까지 인천시내거주모성 332명에 대하여 분만후의 안정일수와 산욕후 제 신체증상을 모성의 특성별 사항(연령, 교육수준, 출산력, 가족구조)과 비교 조사하여 통계적으로 검토한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 모성의 분만후 안정일수분포는 2주이하군, 3~4주군, 5주이하군에 각각 41.6%, 30.4%, 28.0% 였다.
2. 안정일수가 2주이하군에서 산욕기에 안정을 하지 못한 이유로는 71.0%가 집안일을 도울사람이 없어서 였다.
3. 산욕부의 평균안정일수는 19.1일이었으며 연령별로 비교하여 볼 때 유의적 차가 없었다.
4. 모성의 특성사항중 교육수준을 제외한 연령, 출산력, 가족구조별로 본 안정일수 분포에는 유의한 관계가 없다.
5. 교육수준별 모성의 안정일수분포는 교육수준이 높을수록 많아 유의한 관계가 있었으며 안정일수가 2주이하군에는 국졸이 많았고 5주이상에는 고졸이상이 많았다. (p < 0.01)
6. <표 7>에서 산전진찰을 받은 군이 많음에도 불구하고 임신중 일반위생은 제대로 알고 있지 않으므로 각 의료기관은 진료활동만 할 것이 아니라 교육기관으로서의 역할이 시급히 요구된다.