

또한 유산후 공중목욕탕 이용시기로는 15일 이후가 전응답자의 44.7%를 보였고 기혼녀에서는 56.5%, 미혼녀에서는 1.7%로 적은 율을 보인 것으로 보아 특히 경험이 적은 미혼녀에 대하여 유산후 몸가짐에 대한 건강교육이 절실함을 알수 있다.

⑥ 유산후 합병증이 있을 때 치료방법은 수술한 병원외사의 치료를 받은 응답자가 전대상자의 60.5%를 보였고 기혼녀에서는 71.8%, 미혼녀에서는 19.1%를 보였다.

⑦ 혼전 여성의 성 경험을 보는 관점은 전응답자의 71.5%가 옳지않다고 보고 있으며 기혼녀에서는 74.3%, 미혼녀는 61.0%를 보였다. 경험있는 것이 좋다는 응답자도 전응답자의 1.2%를 보였으며 기혼녀에서만 7예로 나타났다.

본 연구의 결과 다음과 같은 몇가지를 제언하고자 한다.

① 인공유산이 광범위하게 합법화되어 건강을 해치게 되는 음성적인 방법으로 시술되지 않고 수술후의 건강관리에 대한 세밀한 계몽교육이 이루어져야 하겠고 수술후의 위험성에 대비하여 예방도 철저히 시행되도록 유도하여야 한다.

② 인공유산을 행하고 있는 모든 의료기관에서는 수술경험자중 기혼녀에게는 가족 계획 및 자기에게 알맞는 피임방법에 대한 계몽교육 및 시술을 권장하여야겠고 미혼녀에게는 범죄유산으로 인한 육체적, 정신적, 사회적 도덕윤리에 미치는 영향을 이해시키고 미혼여성이 가져야 할 몸가짐과 올바른 이성관에 대한 교육을 실시할 수 있는 혼전상담이 강화되어야 하겠다.

③ 산부인과 외래진찰소에서나 산부인과 개인병원에서는 “여성건강 상담실”을 설치하여 특별히 인공유산을 시행하는 여성들에게 수술후의 몸가짐이나 건강관리 및 범죄유산에 대한 예방의 중요성을 인식시켜 모자보건 사업증진에 기여토록 해야 할 것이다.

## 서울시 일부 보건소 결핵환자의 지식태도 실천에 관한 조사

대한간호, Vol. 15, No. 1, pp. 43~57, 1976.

### 박 신 애

보건소에 등록하여 결핵치료를 받고 있는 환자를 대상으로 결핵관리에 필요한 예방과 치료에 관한 지식 태도 실천 등에 관한 사항을 파악하기 위한 설문에 대하여 서울특별시내에 있는 3개 보건소의 결핵관리실에 등록된 환자중 274명이 응답하였다. 이들 응답자에 대하여 1975년 4월 1일부터 10월 30일까지 7개월 동안에 훈련된 40명의 면담자가 면담 기록하여 조사 분석한 결과는 다음과 같다.

### 1. 예방에 관한 지식 태도 및 실천

① 80.3%만이 결핵이 전염병이라고 알고 있었다.

② 객담처리에 관한 지식면에서는 기침이나 재채기시 휴지로 코와 입을 막아야 한다는 지식을 갖고 있는 군은 77.7%이었다. 태도면에서는 소각해야 좋다는 점을 알고 있는 군은 46.4%이었으나 쓰레기통에 버려도 좋다는 군이 27.0%나 되었다. 실천면에서는 소각한다는 군은 3.1%밖에 안되었고 쓰레기통에 버린다가 58.8%로 수위였으며 다음이 변소에 버린다고 11.7%이었다.

③ 일반성인에게 흉부검사(X-ray) 필요성 유무에 대한 지식면을 보면 필요하다고 응답한 군은 62.9%이었고 그 빈도를 알고 있는 군은 29.9%이었으며 환자 이외의 가족에게 흉부검사(X-ray)를 실시한 실천도는 43.3%이었다. 또한 어린이의 결핵 감염여부 확인방법을 알고 있는 군은 50.0%였다.

④ 결핵예방주사(BCG) 접종에 대한 지식면을 보면 56.9%가 BCG 예방주사를 알고 있다고 응답하였으나 실천면은 다소 낮아 37.6%였다.

### 2. 치료에 관한 지식

① 치료의 전진과정을 파악하기 위하여 가장 중요한 방법은 흉부검사(X-ray)와 객담검사라고 응답한 군은 38.7%이고 자신의 증세만으로 안다가 32.1%나 되었다.

② 치료중 가장 중요한 것은 규칙적이고 충분한 기간 동안의 약복용이라고 응답한 군이 67.5%이었다.

③ 약의 복용기간에 대해 47.1%가 1년 이상이라고 응답했고 24.1%만이 2년간이라고 응답하였다.

### 3. 결핵에 대한 지식의 파악경로 및 제사항

① 결핵에 대한 지식은 주로 개인면담을 통해서 얻었다는 군이 66.0%로 가장 많았고 책자를 통해서 얻었다는 군은 10.2%에 불과했다. 등록기간별로 보면 주로 개인면담을 통해서 얻었다는 군이 1년 6개월 군에서 가장 많았다.

② 지식을 주로 습득한 장소는 보건소 및 방문간호사를 통해서 지식을 얻었다가 57.9%였고 5.4%가 약국을 통해서 얻었다고 나타났다.

③ 의료시설을 통해서 받은 면접내용에 대한 만족도는 충족하다고 응답한 군은 36.2%이었다. 또한 각 응답자의 결핵관리에 있어 예방면과 치료면에 대한 지식 태도 실천면을 교육정도 등록기간 현재 질병상태 및 성별 등 각 변수와의 관계를 비교해 보면 교육변수에 의해서만 지식과 태도면에 차이를 가져오고 보건소 등록기간이나 질병 정도에 따라서는 거의 뚜렷한 차이를 나타내지 않았다. 그리고 실천면에서는 교육변수가 미미한 차이를 보이거나 보건소 등록기간이나 현재 질병 상태에 따라서는 현저한 차이를 볼 수 있다.