

으로 13.6% 를 차지하여 차위이며 의사(12.8%), 남편(11.3%), 조산원(10.2%)의 순이다.

현존자녀수는 2명이 33.7% 로 수위이고 3명이 25.5% 로 차위이며 평균자녀수는 2.6명이다. 전 여아수가 전남아수보다 많고 평균터울 수는 2.9년이다.

4. 가족계획의 피임수술율은 44.9% 이며 이중 먹는 피임약을 사용하는 군이 17.3% 로 수위이고 루프가 14.3% 로 차위이며 전혀 시행하지 않는 군이 55.1% 이다.

연령별 시행율은 40~44세군이 가장 많이 시행하고 있고(62.5%), 30~39세군이 50% 의 시행율을 보여 차위이다. 가장 저조한 군은 20~24세군이다.

학력별 시행율은 고졸이 60% 로 가장 많고, 국졸이 3.5% 로 가장 하위이다.

현존자녀 수별 시행율은 3명인 사람의 60% 가 시행하고 있고 4명인 사람이 58.3% 로 차위이며, 1명인 사람은 10.0% 로 가장 하위이다.

농촌 일부지역 주민의 건강상태와 의료이용에 관한 조사

원주간호전문학교 학술논총 제4집, pp. 59~71, 1978.

임 선 옥

1977년 7월 10일부터 7월 25일까지 15일간에 걸쳐서 경남 밀양군 내에 거주하는 주민중 500명을 대상으로 조사대상의 특성, 활상태, 건강관리(식습관, 흡연, 음주 및 수면관계), 건강상태(질병력, 의료기관이용, 상병계속일수, 의료비, 질병의 종류 및 입원관계)에 관하여 조사하여 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

1. 대상자의 특성

- a) 조사대상의 대부분이 20~59세로서 74.0% 였다.
- b) 무학력군이 42.8% 로 가장 많았으며 다음은 국민학교 학력군으로 38% 였다.
- c) 대상자가 거의 모두가 농업에 종사자였다(81.0%).

2. 생활상태

- a) 기혼자가 71.4% 였으며 미혼자는 28.6% 였다.
- b) 자가 95.2% 이며 셋집은 3.6% 였다.

3. 건강관리

- a) 음식의 종류를 가리지 않는 경우가 67.8% 로서 가장 많았으며 다음은 보통 먹는 편이 18.8% 였다.
- b) 흡연관계
 - (i) 500명중 흡연자가 46.6% 였다.

- (ii) 흡연시작연령은 20~24세군이 44.5%로 가장 많았으며 다음은 15~19세군과 30~34세 군이었다.
 - (iii) 1일흡연량은 평균 10개피였다.
 - (iv) 흡연기간은 20~30년이 20.2%로 가장 많았으며 다음은 10~20년군 19.7%와 30~40년군 19.7%였다.
- c) 음주관계
전혀 못하는 사람이 45.2%였으며, 음주자 중에는 약간 하는 사람이 38.4%로 가장 많았으며 다음은 많은 량의 음주자가 12.8%였다. 매일 음주자도 1.6%(8명)이었다.
- d) 수면관계
수면은 대부분의 사람이 잘한다고 하였다. 수면시간은 평균 7.22시간이었다. 수면 습관은 일직 자고 일찍 일어나는 사람이 59.0%로 가장 많았다.
4. 건강상태
- a) 조사당시 이전 6개월 동안에 질병이환율은 37.6%였다.
 - b) 상병 계속일수는 4일만이 39.4%로 가장 많았다.
 - c) 병의원치료가 60.2%였다.
 - d) 질병의 종류는 신경계가 28.2%로 가장 많았으며 다음은 소화기가 21.2%, 순환기가 11.3%, 종합진단이 11.2% 등의 순이다.
 - e) 1만원 미만의 의료비가 35.2%로 가장 많았으며 1~4만원군이 29.6%로 다음이었다.
 - f) 질환자중 입원한 경험이 있는 사람이 28.2%였다.
 - g) 입원기간은 10~19일이 35.0%로 가장 많았으며 다음은 20~29일군이 25.2%, 5~9일군이 20.0%였다.

일부 도시 모성의 모자보건 지식 및 실천에 관한 조사

춘천 간호전문대학 논문집 제8집, pp. 217~247, 1978.

주 채 복

1978년 10월 5일부터 11월 10일까지 35일간 춘천시 보건소모자보건실에 등록된 영유아중 무작위 추출한 250명을 대상으로 모자보건에 대한 지식과 지식에 대한 실천상황을 조사 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.