

부부가 자녀수를 조절할 수 있다는 의견은 87.9%이며, 평균 소자녀 수는 1.3명, 다자녀 수는 4.2명이었다.

4. 지 식

자녀를 적당히 조절해서 낳아야 한다는 생각을 가지고 피임방법이나 구독 또는 시술처를 정확히 알고 있는 지식상태는 84.7%이며 이 지식에 영향을 미치는 요인은 연령, 교육정도, 결혼연령이었다.

5. 실 천

현재 가족계획을 실천하는 율은 45.3%, 무경험은 43.3%이며 실천에 영향을 미치는 요인은 연령이었고, 종교와 교육정도는 실천과 관계가 없었다.

출산을 저하를 위한 피임위주로서의 가족계획의 지식수준이 높은데에도 불구하고 실천율이 낮은 점을 미루어 볼 때 적극적으로 가족계획에 참여하고 피임 실천율을 높이기 위해서는 첫째, 피임보급위주에 의한 출산력 조절사업을 계속 강화시켜 나감과 동시에 교육과정에서 인구문제 및 가족계획에 대한 교육내용이 보다 더 강화되어야 한다. 둘째, 소자녀 가치관과 함께 여성의 사회적인 지위 향상을 도모하여 남아 선호사상을 타파하려는 등의 사회제도적 지원 정책이 필요하다.

일부지역 보건간호사의 지역사회 보건자원 이용에 영향을 주는 요인에 관한 연구

— 전북도내 보건간호원을 중심으로 —

대한간호, Vol. 20, No. 3, pp. 58~64, 1981.

정 영 숙

전북도내 보건간호사들을 대상으로 설문지를 통해 보건간호사업 수행시 보건자원의 이용에 관한 내용을 조사함으로써 앞으로의 보건간호사업 수행에 효율적으로 활용하기 위한 기초자료를 제공하고자 본 조사를 실시한 바 다음과 같이 통계적으로 유의한 결과를 얻었기에 보고하는 바이다.

1. 보건자원 이용은 기혼자, 보건사업 종사기간이 긴 경험자, 참고서류철을 비치한 자에서 이용도가 높았다($p < 0.05$).
2. 보건자원 이용은 성격, 앞으로의 보건사업 종사계획, 연령과는 무관하였다($p > 0.05$).
3. 보건자원 이용에 있어 인적자원은 산부인과, 소아과 개업의가 제일 많이 이용되었으며 기관자원은 동사무소(46.0%)가 제일 많이 이용되었고 전문보건기관 이용은 4.8%이었다.
4. 보건자원 이용시 기관 및 인적자원의 반응은 대부분이 협조적인 반응을 나타

냈다.

5. 보건자원 이용시 어려운 점은 경제문제(32.4%)가 제일 컸으며 교통문제도 30.6%를 나타냈다.

이에 필자는 다음과 같은 몇 가지 제언을 하고자 한다.

1. 보건간호사업의 효율성을 높이기 위해서는 보건간호 인력관리상 기혼자 및 보건사업 종사기간이 긴 유경험자에 대한 지속적인 격려와 지지가 있어야겠다.

2. 보건자원 이용에 필요한 참고서류철을 비롯하여 적극 활용토록 하는 것이 바람직하겠다.

3. 보건자원 이용에 있어 어려운 점인 경제문제와 교통문제가 해결이 되도록 행정적인 배려가 있어야 하겠다.

일부지역에 있어서 어머니들의 예방접종에 대한 지식과 실시에 관한 조사연구

순천간전논문집, Vol. 7, pp. 155~184, 1981.

최오남

1981년 6월10일부터 8월 10일까지 전남 순천 일부지역에 거주하는 2세 이상의 자녀를 가진 187가구의 어머니를 대상으로 예방접종의 지식과 실시에 관하여 조사한 결과 다음과 같은 결론이 얻었다.

1. 예방접종에 있어서 질병과 시기에 대한 지식은 홍역이 각각 76.5%, 74.3%로 가장 높았으며 B. C. G, D. P. T, 소아마비의 순으로 알고 있었고, 추가접종에 대한 지식이 37.4%로 가장 낮았다. 그리고 교육수준이 높을수록 종류와 시기에 대해 많이 알고 있었고 연령별로도 별차이가 없었다.

2. 예방접종의 실시는 소아마비가 73.7%로 가장 높았고 D. P. T가 59%, 홍역 62.6, B. C. G 52.9% 그리고 추가 D. P. T와 추가 소아마비가 각기 44.4%였다. 교육수준에 따른 실시는 D. P. T와 소아마비, 홍역이 교육수준이 높을수록 실시율이 높은것으로 나타났고 그외 무학군에서 실시율이 가장 낮은 분포를 보였다. 연령에 따른 실시율은 예방접종 대상자의 자녀를 가진 연령층이 실시율이 높았다.

3. 실시장소는 개인병원이 가장 많았고 보건소, 종합병원, 동사무소의 순이었다. 실시장소에 따른 이유는 개인병원에서는 “다니던 병원이므로”가 가장 큰 이유였고 보건소는 “나와서 맞추라니까” 종합병원은 “안심이되므로”이며 동회에서는 “나와서 맞추라니까”가 큰 이유로 나타났다. 또한 적절한 시기에 예방접종을 실시하지 못한 이유는 “어린이가 자주 아파서”가 가장 큰 이유이고, “접종내용과 장소를 몰라서”, “접종안해도 건강하니까”, “무관심해서”의 순이었다.