

보건의료사업의 일부인 보건소를 중심으로 특히 결핵관리와 가족계획이 심각한 문제로 대두되고 있으며 보건소 이용에 대한 올바른 인식과 적극적 이용을 위해 본연구는 일부지역에 위치한 결핵관리실과 가족계획실의 이용실태를 1979년 1월1일부터 1981년12월31일까지 3년간에 걸쳐 기존 자료를 통하여 분석하여 조사한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1) 결핵예방접종 상황에서는 B. C. G. 접종이 46.12%로 다른 예방접종에 비해 높게 나타나고 있다.

2) 연도별 결핵검사 상황에서는 객담검진은 매년 점차적으로 감소현상을 보이나 결핵균 발견은 증가현상을 보이고 있다.

에스선 검진은 매년 증가현상을 나타내고 있으나 결핵발견은 감소현상을 보이고 있다.

3) 연도별 약물투여 상황은 초치료 약물 투여에서는 전체적으로 I + E가 32.33%로 수위였고 그 다음은 INH가 28.37%로 차위였다.

재치료 약물투여는 전체적으로 E + P + R이 45.62%로 가장 높게 나타났다.

4) 결핵등록 환자 동태 증가 상황에서는 전체적으로 보면 엑스선이(84.04%) 수위로 증가현상을 보였으며 감소현상은 완치(29.44%) 중단(13.26%) 사망(2.51%) 순위로 감소현상을 보인다.

5) 가족계획 방법은 전체적으로 보면 먹는 약이(46.4%) 수위였으며 콘돔(36.25%), 루우프(8.10%) 수위며 정관불임술은 0.88%로 가장 하위로 나타났다.

지역사회 보건개발사업을 위한 지역사회 건강진단의 일 연구

전북의대부속 간호전문대학 논문집 제7권 pp. 103~109, 1982

정영숙

본 연구는 전북 전주시 변방지역인 전미동 전당리 지역사회를 대상으로 1981년 1월 12일에서 6월30일까지의 조사기간 동안 기존 자료와 면담 실시 등의 자료수집 방법에 의하여 수집된 자료를 분석하였다. 일 지역사회의 건강진단에 필요되는 지역사회 건강수준과 환경 보건에 관련되는 지표 지역사회 건강자원, 지역사회 건강과 관련되는 제반 요인을 분석하므로써 지역사회 보건사업 계획에 기초 자료를 제공하고자 지역사회 건강 진단을 조사 연구한 것이다.

본 연구에서 조사된 결과를 근거로하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 지역사회 일반적 건강 수준은 연령분포, 결혼상태, 부양 지수(48.5%), 직업, 교육 정도, 출생율(5.62), 사망 실태, 결핵 유병율(3.08%) 등의 자료로 볼 때 건강 관리에 있어 전국의 실태와 비교하여 취약성이 높은 것으로 나타났다.
2. 환경보건 상태는 식수는 주로 사용되고 있는 간이상수도에 대한 정기적인 염소처리가 필요시 되고 있으며 새마을 공동작업으로 하수 처리가 긴급히 요구되는 것으로 나타났다.
3. 기존 지역사회 조직을 활성화 하여 건강 사업에 이용할 수 있음이 나타났다.

B. 제 언

본 연구를 기반으로 하여 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

1. 지역사회 개발 사업을 효과적으로 실시하기 위해서는 연구와 사업이 동시에 계속 진행되어야 하는 것이 필요하다.
2. 인접된 지역사회의 보건의료 자원을 활용할 수 있는 보건정보 시스템이 필요하다.
3. 사회환경 중 지역사회 기존 조직망을 활성화시켜 보건사업에 적극 활용함이 요구되는 것으로 타났다.
4. 지역사회 건강 자원은 연구대상 지역사회 내에서는 보건의료시설이나 보건의료요원이 전혀 없는 상태이므로 마을 건강요원과 통·반장등 공식적 교육시켜 지역사회 자체 내의 자조 능력을 기르도록 함이 요구되는 것으로 나타났다.
3. 수량적인 자료와 아울러 질적 양사에 대한 자료도 함께 조사됨이 필요하다.

지역사회 간호학 실습교육 개선을 위한 기초연구조사

대한간호, Vol. 21, No. 5, pp. 56~64, 1982.

정 영 속

결론 및 제언

본 연구는 전국 간호교육기관의 간호학 담당교수를 대상으로 지역사회의 간호학 실습교육의 운영, 실습지도, 실습교육의 문제점, 이상적 실습기간, 이상적인 1팀학생수, 지도교수의 실무경험과 현지도간격과의 관계등을 설문지를 이용하여 조사하였다.

본 연구의 결과를 근거로 하여 다음과 같은 결론을 얻었다.