

J시의 가임부가 원하는 자녀수 및 성의 선호태도에 관한 연구

경남간전 논문집, Vol. 10, pp. 123~131, 1983.

우 선 혜

요약

J시의 유배우 가임여성을 대상으로 인구와 사회특성 및 자녀수와 성선택 태도를 관찰하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 조사대상자의 연령구성은 20~29세가 53.17%, 30~39세가 37.04%, 40~49세는 9.26%로 20~29세군이 가장 많았다.
2. 조사대상자의 학력은 중졸이하가 74.01% 직업은 대부분 무직과 주부였고 종교는 불교가 45.37% 그외 42.59%가 종교를 갖지 않았다.
3. 연령별 원하는 자녀수의 성선택 및 선호태도는 연령에 관계없이 모두 높게 나타났다. 특히 40~49세 군은 높은 남아선호태도를 보였다.
4. 연령별 학력과 자녀수선호태도에서 20~29세군에서 영향미치는 것으로 나타나고 종교와 직업의 자녀수선호태도에 영향을 미치는 군은 40~49세군에서였다.
5. 연령별 원하는 자녀수 및 성의 선호태도간의 비교에서는 전체 연령군에서 유의한 차이가 없었다.

보건소에 등록된 영아의 건강관리 상태에 관한 조사 연구

최신의학 26(12), pp. 197~206, 1983.

이 영 자 外2인

본 조사연구는 영유아실에 등록된 영아의 어머니의 특성과 영아의 보건상태와의 관계를 조사하여 효율적인 영유아 보건사업을 수행하는데 참고자료로 이용되고자 하였다. 1982년 12월 1일부터 동년 12월 28일까지의 기간 동안에 중구 보건소 영유아실에

등록된 204명의 영아를 대상으로 준비된 설문지를 가지고 어머니와의 면담과 영유가 기록부를 통해 자료수집을 하였다. 수집된 자료는 전산처리하였으며 자료분석에는 빈도와 백분율을 이용하였고 X^2 test로 통계적 유의성을 검증하였다. 결과는 다음과 같다.

1. 영아의 수유는 모유가 62.6%, 인공우유 15.3%, 혼합영양이 22.2%였고 엄마의 연령, 교육정도, 영아의 출생순위 등과는 관계가 없는 것으로 나타났다.

2. 영아의 이유식을 하고 있는 경우는 41.4% 이유를 하지 않는 영아는 58.9%였고 이유 실시자중 시기는 2~3개월이 4.2%, 4~5개월이 16.8%, 6~7개월이 14.1%, 8개월 이후 6.3%였고 엄마의 연령, 출생순위, 아버지의 직업과는 관계가 없는 것으로 나타났고 엄마의 교육정도가 높은 경우가 낮은 학력군보다 비실시자가 많은 것으로 나타났다. ($P < 0.01$).

3. D. P. T 접종율은 1차 대상자 중 접종율 94.2%, 2차 접종대상자중 접종율 90.1% 3차 접종대상자중 접종율 64.9%였다. 소아마비 접종율은 1차 대상자중 접종율 93.7%, 2차 접종 대상자중 접종율 90.1%, 3차 접종대상자중 접종율 61.7%였다.

D. P. T와 소아마비 예방접종율은 엄마의 연령, 교육정도, 출생순위가 관계가 없는 것으로 나타났다.

이상과 같은 결과를 통해 영아의 영양에 대한 지도와 예방접종 시기에 대한 보건교육이 강화되어야 하겠다. 특히 산전관리시부터 영아의 영양에 대한 준비가 영향을 주는 요인에 대한 연구와 성장 발육에 어떠한 영향을 미치는가에 대한 연구가 이루어져야 할 것이다.

서울특별시 일부 보건소 결핵환자 가족들의 결핵에 대한 지식과 실천에 관한 조사

최신의학 26(6) pp. 173~190, 1983.

조경자

보건소에 등록되어 결핵치료를 받고 있는 환자의 가족을 대상으로 결핵관리에 필요한 예방과 치료에 관한 지식, 실천등에 관한 사항을 파악하기 위한 설문문에 대해 서울특별시에 있는 1개 보건소의 결핵관리실에 등록된 환자중 그중 159명의 환자가족이 응답하였다. 예를 응답자에 대하여 1982년 4월 12일부터 6월 26일까지 약 3개월동안 훈련된 면담자가 면담 기록하여 조사 분석한 결과는 다음과 같았다.