

호소율이 높았다.

8. 신체적 호소율을 보인 항목은 조금 일하면 고단해짐 71.9%, 눈의 피로 69.9%로 피로감의 호소율이 높았고, 요통 66.7%, 두통 57.0%, 현기증 54.6%, 어깨근육경직 54.1%의 순이었으며 열감은 43.4%, 손발에 쥐가 남 48.0%, 저림 46.8% 이었다.

9. 정신적 고호소율을 보인 항목은 분노항목이 72.3%로 가장 높았으며 민감항목 67.8%, 부적응 59.4%, 불안증 51.2%, 우울증 34.5%의 순이었다.

#### 제언 :

1. 중년기에서 직업여성이 일반 가정주부보다는 건강하다는 본 연구결과의 일반화를 위해 수입이 동일한 수준에서 중년기의 직업여성과 가정주부의 건강상태를 비교하는 반복연구를 제언한다.

2. 중년여성들의 건강관리를 위하여 유휴인력을 활용할 수 있는 작업을 개발하여 사회에 기여할 수 있도록 하는 것이 요청된다.

## 일부지역 미혼여성과 기혼여성의 가족계획에 대한 지식 및 태도에 관한 조사연구

중앙의학, 46권 제2호, pp. 153~160, 1984.

### 조길자

1984년 1월 1일부터 1월 15일까지 약 15일간에 걸쳐 광주시내에 거주하는 미혼여성 212명과 기혼여성 212명을 대상으로 가족계획에 대한 지식 및 태도를 비교조사하였던 바 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 생리적 변화는(초경) 미혼여성군이 평균 15.1세 이었고, 기혼여성군은 평균 15.3세이었다.

2. 가족계획에 대한 지식경로는 미혼여성군에서 방송매체(50.5%), 정부나 보건소 발행의 책자(17.5%), 보건요원(10.8%)등의 순이었고, 기혼여성군으로 보건요원(42.5%), 방송매체(24.5%)의 순이었으며 통계적으로 매우 유의한 차이를 볼 수 있었다. ( $P < 0.01$ ).

3. 가족계획 용어에 대한 인식도는 자녀수와 터울조절이란 용어를 인식한 수가 미혼여성군이 기혼여성군보다 높으며(미혼여성 45.3%, 기혼여성 25.0%) 도합 35.1% 이었다

4. 가족계획에 대한 찬성율은 미혼여성군은 85.5% 기혼여성군은 97.2% 이었고 통계적으로 유의한 차이를 보였다. ( $p < 0.01$ ).

5. 이상적 결혼연령은 미혼여성군은 25세(71.7%), 기혼여성군은 24세(47.2%)로 나타났으며 이상적 배우자와의 연령차이는 남성이 3~4세(62.3%) 더 많은 것을 원하고 있었다.

6. 자녀의 성에 대한 관념은 미혼여성의 66.0%가 동등하다 했고 기혼여성군에서는 55.2%가 아들이 소중하다고 했다.

아들을 소중히 여기는 이유로는 미혼여성군의 경우는 가문계승(69.8%)이 가장 많았고 기혼여성군의 경우는 노후의탁하기 위해서(48.7%)라고 했다.

7. 이상적 자녀수에 대해서는 미혼여성군에서 1남 1녀(41.5%) 아들딸 관계없이 1명(22.6%), 기혼여성군에서 1남 1녀(46.2%), 2남1녀(20.8%)였고 통계적으로 유의한 차이를 보였다. ( $P < 0.01$ )

8. 이상적 출산간격은 미혼여성군에서 3년(54.7%)이었고 기혼여성군에서도 3년(59.4%)이었다. 통계적으로 유의한 차를 보지 못했다. ( $P < 0.05$ )

9. 피임방법의 채택희망율은 미혼여성군에서 모른다.(45.3%), 남성불임술(15.1%), 루프(20.2%)로 나타났다. 통계적으로 유의한 차이를 보지 못했다. ( $P > 0.1$ ).

10. 이상적 가족계획 권장방법으로 미혼여성군은 강연회 및 교육(64.2%), 영화 및 환동기, 가정방문이 공히 15.1% 이었고, 기혼여성군은 강연회 및 교육이 45.3%, 영화 및 환동기(32.1%)이었다. 통계적으로 유의한 차이를 보였다. ( $P < 0.01$ ).

11. 두자녀 결혼생활의 반응은 미혼여성군은 불완전하다 47.2% 이었고, 기혼여성군은 87.3% 이었다. 통계적으로 유의한 차를 보였다. ( $P < 0.01$ ).

12. 교육받기를 희망하는가에 대해서는 미혼군의 90.1% 가, 기혼군에서는 75.5% 가 교육을 원하고 있으며 미혼군에서는 25.7% 가 의사에게, 기혼군에서는 37.5% 가 보건요원에게 교육받기를 희망하고 있었다. 이들간에 통계적으로 유의한 차이를 보였다. ( $P < 0.01$ ).

## 일부지역 폐결핵환자의 환자역할 행위 이행에 영향을 미치는 요인에 관한 조사 연구

원주전문대학 학술논총 제10집, pp. 245~275, 1985.

### 소 애 영

#### 1. 결론

본 연구는 환자역할행위 이행에 영향을 미치는 요인을 조사 분석하여 폐결핵 환자의 중단탈락율을 감소시키기 위한 효율적인 결핵환자 관리 방안을 모색하고자 시도되었다.