

보건진료원 역할에 대한 면보건요원들의 인지에 관한 조사연구

서울대 보건대학원 석사학위논문 1981.

홍 영 상

보건진료원의 역할에 면보건요원들이 인지정도를 파악하기 위하여 1981년 10월 21일부터 11월 16일까지, 경기, 경북, 전남, 충북의 4개도의 700개 보건지소에서 근무하고 있는 700명의 면보건요원을 대상으로 700부의 설문지를 700개 보건지소에 우송하여 562부의 응답을 받았다. 이 중 527부를 분석한 결과는 다음과 같다.

1. 보건진료원의 모성보건업무활동에 대한 면보건요원들의 인지정도에서, 체중측정항목에 95.4%가 혈압측정항목에 95.3%가 인지하였다. 고위험임신부 관리의 업무중 전치태반의 관리항목에 14.1%, 자궁외기관의 파열관리업무항목에 10.2%가 인지하고 있었다.

2. 보건진료원의 영유아 보건업무활동에 대한 면보건요원들의 인지정도에 있어서, 영유아의 예방접종업무에 95.2%가, 영유아식이와 영양지도의 업무에 대하여 93.9%가 인지하고 있었다. 흔한 질병인 질적황달의 관리업무에 31.7%가 탈복관리의 업무항목에 대하여 20.3%가 인지하고 있었다.

3. 보건진료원의 가족계획업무활동에 대한 면보건요원들의 인지정도에 있어서는 콘돔보급의 업무항목에 대하여 93.7%, 경구피임약 보급의 항목에 대하여 93.0%가 인지하고 있었다. 자궁내 장치삽입의 업무에 대하여 64.1%가 인지하고 있었다.

4. 보건진료원의 영양관리 업무활동에 대한 면보건요원들의 인지정도에 있어서는, 지역주민이 영양상태 파악의 업무에 84.1%가, 지역주민에 대한 영양교육 및 상담의 업무에 92.4%가 인지하고 있었다.

5. 보건진료원의 기초 진료업무 활동에 대한 면보건요원들의 인지 정도에 있어서는, 추후 관리의 업무에 87.1%가 만성질환 관리의 결핵 요양지도의 항목에 대하여 87.5%가 인지하고 있었다. 임상검사 업무의 뇨단백검사, 혈액형 검사의 항목에 36.6%가, 대변, 가래, 질분비물채취검사의 항목에 34.5%가 인지하고 있었다.

6. 보건진료원의 지역사회조직, 행정 및 기타 보건사업업무활동에 대한 인지정도에 있어서, 지역사회 기존 조직활동을 통한 보건사업에 대하여 응답자의 92.8%가, 보건진료소사업 및 운영의 업무에 대하여 71.0%가 인지하고 있었다.

7. 보건진료원의 업무활동에 대한 면보건요원들의 자격 및 면허소지 상태별 인지정도를 보면 영유아 보건의 업무활동 중 흔한 질환의 관리와 급성전염질환의 관리를 제외한 거의 모든 항목에서 간호원, 보조원이 간호보조원보다 많이 인지하고 있었다.

8. 보건진료원에 대한 면보건요원들의 의견에 있어서는 보건진료원과의 상호협조에 대한 의견에서 86.2%가 협조적으로 운영할 수 있다고 하였으며, 면주민건강관리에 보건진료원이 도움이 될 것이다에 92.4%가 답하였으며, 면보건요원의 사업수행에 보건진료원이 도움이 될 것이다에 90.7%가 답하였다.

보건진료원의 역할인식과 역할수행 빈도간의 상관연구

중앙의학 제43권 제4호, pp. 229~237, 1982.

김 선 희

1. 보건진료원에 대한 대우에 관한 만족도는 일반간호원에 대한 선행연구의 결과와 비교해 볼 때 '불만족 한다'는 경향으로 나타났다.
2. 모자보건: 1차진료, 지역사회 보건지도 및 예방업무에서의 역할인식정도는 인식 평점 척도의 분포가 3.71~4.53으로 나타났으며, 모자보건, 1차진료, 지도 및 예방 업무 순으로 역할인식정도가 높게 나타났다.
3. 역할수행빈도는 수행평점 척도의 분포가 1.35~3.57로 모자보건, 1차진료, 지도 및 예방 업무 순으로 수행빈도가 높게 나타났으나 각 업무별 인식정도에 비해 수행빈도가 낮게 나타났고 특히 지도 및 예방업무에서는 전반적으로 수행빈도가 낮게 나타나 보건진료원의 활동이 일부분야에 치중되고 있음을 나타내고 있었다.
4. 보건진료원의 역할 인식정도와 일반적 특성과의 관계에서 보건진료원이 되기전 간호활동 경력, 보건자원 이용 두 변수만이 유의한 차가 있었다. 간호활동 경력이 많을수록, 보건자원 이용도가 높을수록 역할인식정도가 높게 나타났다.
5. 보건진료원의 대우에 대한 만족도가 높을 수록, 보건자원을 이용할수록 역할 수행빈도가 높게 나타났다.
6. 역할인식정도가 높을 수록 역할수행빈도가 높게 나타났다.

보건진료원 및 보건진료요원과 보건요원의 업무활동분석 — 홍천 및 횡성지역 보건요원 대상으로 —

대한간호 제6권 제2호, pp. 43~63, 1982.

김 진 순