

에 관한 견해는 501~1,500명이다가 68%로 가장 높았다. 연간 이용 인원의 경우 501~2,999명이 34.3%로 가장 많았고 이용건수로는 500건 이하의 경우가 5.3%로 가장 적었다.

5. 보건의료자원

기존 보건의료자원으로서 45.5%가 약방 및 약종상이었고 지역주민이 1-2-3순위로 이용한다는 의료자원은 보건진료소 약국 및 약방의원 순이었다. 원하는 감독체계는 보건소장을 원하는 경우가 65.6%로 가장 많았고 전문간호감독요원에 의한 기술지도 및 감독의 견해는 54.6%가 찬성했다. 많이 이용하는 의뢰기관은 병원 및 의원이 78.2%로 가장 많이 응답되었다.

6. 보건의료자원과의 협조관계

보건소와의 협조관계는 높게(55.6%), 보건지소와의 협조관계는 낮게(27.2%) 나타났다.

7. 업무 영역별 수행정도

통상질환 관리가 가장 높았고 사회계획수립 영역이 가장 낮았다.

이상의 내용을 종합하자면 보건진료원 배출 연혁이 길어감으로서 그들의 평균연령이 높아지며 기혼자가 많아지고 있다. 또한 보건진료원은 아직 그들의 보수체계에 관한 지식이 결여되어 있으며 운영협의회 수당은 지역에 따라 일관성없이 지불되고 있는 실정이다. 감독체계로서는 보건소, 보건소장과의 협조가 잘되는 것으로 보여졌고 전문간호감독요원에 관한 찬성의 견해도 높게 나타나 앞으로 감독체계도 지양되어져야 할 것 같다. 보건진료원의 업무는 아직 진료영역에 편중되어 있어서 1차 보건의료사업을 균형있게 수행하지 못하는 것으로 나타났다. 앞으로 대상자들이 “어떤 종류의 건강관리를 필요로 하는가”라는 항구적인 질문에 대처해 나가기 위한 그들의 사업내용에 관한 수용도, 만족도도 보다 깊이있게 조사되어져야겠다.

또한 본 연구의 계속으로서

- 1) 일반적 특성과 보건의료 관련기관 및 업무 수행정도와의 관계
- 2) 기타 관련 변수와 업무수행정도와의 관계
- 3) 업무 수행정도에 대한 직무내용간의 상관관계에 관한 분석이 시행될 계획이다.

보건진료원의 업무분석에 관한 연구(Ⅱ)

조선의대 논문집 제3권 제1호, pp. 97~110, 1987.

손인아 · 강혜영 · 정 영

전 세계적으로 80 % 이상의 인구가 의료자원의 도시집중 및 의료비 상승 등의 이유로 기본적인 의료 혜택을 받지 못하고 있으며 심지어는 동일 국가 내에서조차 보건의료 자원의 편중 현상으로 인하여 모든 주민의 균등한 혜택을 누리지 못하고 있기에 지구상의 모든 인류에게 적기에 가까운 의료혜택을 주기 위한 목적과 방법으로서 일차보건의료라는 개념이 대두하였고 우리나라에서도 이와 같은 목적으로 1981년 부터 보건진료원이라는 새로운 인력을 훈련, 배치시켜 1986년 7월에 목표를 달성함으로써 전국의 보건의료 취약지를 없애는데 성공하였다.

이러한 이 때 보건진료원의 업무 수행 정도를 파악하고 어떤 변수가 이들의 성공적 업무수행에 영향을 미치는 가를 파악함으로써 보건의료 전달의 질적 향상을 도모하는데 도움이 될 기초자료를 제시하기 위해 본 연구를 시도 하였다.

본 연구의 대상은 전라남도에서 업무 수행중에 있는 전체 보건진료원을 대상으로 하였고, 자료수집기간은 1986년 11월 11일부터 12월 30일 까지로서 보건사회부가 실시하는 보수교육 기간을 이용하여 동 교육담당자에게 연구 목적을 설명한 후 질문지를 배부하여 기입토록 한 후 곧 회수하였고 불참자에게는 2회에 걸쳐 우편을 이용하여 수집하였다. 총 회수 매수는 207였으며 자료분석은 S. P. S. S. Programm 을 이용하여 백분율, 평균값, 단계적 중회귀 분석을 구하였다.

본 연구를 통하여 얻은 결과는 다음과 같다.

1. 보건진료원의 업무 수행 정도에 가장 큰 영향을 준 변수는 단계적 중회귀 분석 결과 호봉과 학력으로서 9.96 %의 설명력을 갖고 있었다.
2. 지역사회 조직 및 개발사업에 영향을 미친 변수의 서열은 단계적 중회귀 분석 결과 결혼상태, 근무지역 조건, 호봉, 보건진료소, 시설상태, 연령순으로써 22.051 %의 설명력을 갖고 있었다.
3. 보건사업 계획에 영향을 미친 변수의 서열은 단계적 중회귀 분석 결과 결혼상태, 근무지역 조건, 호봉, 보건진료소 시설 상태, 연령 순으로써 22.192 %의 설명력을 갖고 있었다.
4. 지역사회 보건관리에 영향을 미친 변수는 단계적 중회귀 분석 결과 결혼 상태, 근무지역 조건, 호봉, 보건진료소 시설 상태, 연령 순으로써 21.923 %의 설명력을 갖고 있었다.
5. 모자 보건 및 가족계획에 영향을 미친 변수는 단계적 중회귀 분석 결과 결혼 상태, 근무지역 조건, 호봉, 보건진료소 시설 상태, 연령 순으로 20.124 %의 설명력을 있었다.
6. 통상 질환 관리에 영향을 미친 변수는, 단계적 중회귀 분석 결과 결혼 상태, 호봉, 근무지역 조건, 보건진료소 시설 상태, 경력순으로 22.664 %의 설명력을 갖고 있었다.
7. 보건사업 운영관리 및 지도에 영향을 미친변수는 단계적 중회귀 분석 결과 근무 지역조건, 결혼 상태, 호봉 순으로써, 18.706 %의 설명력을 갖고 있었다.
8. 보건 정보 체계 수립에 영향을 미친 변수는 단계적 중회귀 분석 결과 결혼상태,

근무지역 조건, 호봉, 보건진료소 시설 상태, 연령 순으로써 20.168%의 설명력을 갖고 있었다.

9. 보건진료원의 업무 수행 정도를 Likert 5점 척도로 측정한 결과 가장 큰 영향을 미친 변수는 호봉으로서 호봉이 높을 수록 업무 수행을 잘 하고 있는 것으로 나타난 데 비해 시간 소비량 조사에서는 시간, 사건, 호봉 순으로써 즉, 독신자일수록, 근무지역이 양호할수록, 고호봉일수록, 업무 수행에 보다 많은 시간을 소비하는 것으로 분석되었다.

경남지역 보건진료원의 업무와 관련된 요인 분석

복음간호전문대학 논문집 제5집, pp. 129~145. 1987

윤선옥 · 신유신 · 강영실

본 연구는 지역사회간호학회가 실시하는 전국의 보건진료원의 인력조사 연구의 일환으로 경상남도 지역의 전체 보건진료원 259명의 일반적 상황 및 업무수행 정도를 파악하기 위하여 1986년 8월 25일부터 11월 25일 사이에 설문조사한 결과 자료수집이 가능한 195명의 설문지를 분석하였다.

대상자 195명의 진료원의 회신한 자료의 분석은 총점, 평균치, 표준편차, 백분율 및 범위로 분석하였으며 업무수행소요시간과의 관련은 Pearson 상관계수로 분석한 연구 결과는 다음과 같다.

1. 보건진료원의 일반적 특성과 업무에 관련된 배경
 - 1) 보건진료원의 평균연령은 31.5세로 20~40세 미만이 87.1%로 나타났다.
 - 2) 결혼상태는 미혼이 60%, 기혼이 36.4%로 미혼이 기혼자보다 많이 나타났다. 현가족과 동거인 경우는 68%로 나타났다.
 - 3) 학력은 3년제 간호전문대학과정 졸업자가 82%로 나타났다.
 - 4) 종교는 갖지 않은 사람이 28.7%로 나타났다.
 - 5) 근무지역은 감지 40.5%, 읍지 46.7%, 병지 12.8%로 나타났다.
 - 6) 보건진료소의 시설은 신축된 건물이 69.1%, 기존건물 이용이 30.9%로 나타났다.
 - 7) 보건진료소의 시설상태는 좋다 30.3%, 나쁘다 34.1%로 나타났다.